

# 위장약 카베진코와S에스정

카베진코와S(에스)정은 소중한 위 건강을 위한 양배추 추출물 중의 항산화성 궤양인자로 알려진 메틸메티오닌설포늄염화물(MMSC)의 함유로 상처 난 위의 점막을 수복하고, 손상된 위 표면을 재생시킵니다. 위 운동 촉진을 위한 창출건조엑스와 당약의 건위생약성분은 약해진 위 건강 회복을 돕고, 3종의 제산제와 스코폴리아엑스3배산의 진경작용, 복합소화효소제 리파제AP12와 비오디아스타제2000의 함유로 빠른 소화를 도와 위부불쾌감, 위부팽만감 및 위산과다로 인한 속쓰림, 신트림, 소화불량 등의 증상을 개선 시켜 주는 종합위장약입니다.

※ 메틸메티오닌설포늄염화물(MMSC)은 양배추 추출물 중의 항산화성궤양인자로서 발견된 성분으로, 비타민U라고도 하며 위점막 수복작용을 합니다.

## [제품명] 카베진코와에스정

[원료약품 및 그 분량] 이 약 1정(600mg) 중,

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 메틸메티오닌설포늄염화물(KPC)         | 25mg      |
| 창출건조엑스(10→1)(별규)          | 8,3333mg  |
| 당약가루(JP)                  | 5mg       |
| (스웨르티아마린으로서 0.23mg)       |           |
| 수산화마그네슘(별규)               | 16,6667mg |
| 탄산수소나트륨(JP)               | 150mg     |
| 침강탄산칼슘(JP)                | 200mg     |
| 스코폴리아엑스3배산(별규)            | 15mg      |
| (히오스시아민(아트로핀)으로서 0.043mg) |           |
| 비오디아스타제2000(별규)           | 4mg       |
| 리파제AP12(별규)               | 2.5mg     |

## [성 상] 담황갈색의 유행정

## [효능·효과]

위부불쾌감, 위부팽만감, 위통, 위산과다, 속쓰림, 신트림, 과식, 체한, 소화불량, 소화촉진, 식욕부진, 구역, 구토

## [용법·용량]

성인(15세 이상) : 1회 2정 1일 3회 식후 복용  
8세 이상~15세 미만 : 1회 1정 1일 3회 식후 복용

## [사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것  
만 7세 이하의 어린이
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것  
1) 위장진통·진경(경련완화)제  
2) 테트라사이클린계 항생제
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것  
수유중인 사람은 이 약을 복용하지 말거나 이 약을 복용하는 경우에는 수유를 피할 것(모유로 이행하여 유아의 맥(맥박)이 빨라질 수 있다.)
- 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것  
1) 의사의 치료를 받고 있는 사람  
2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성  
3) 신장장애 환자, 심장장애 환자, 녹내장(눈의 통증, 눈의 침침함 등) 또는 배뇨(소변을 누)장애 환자, 허약자 또는 고령자  
4) 고마그네슘혈증 환자

- 5) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
- 6) 약으로 알레르기 증상(발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 7) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
5. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨  
부문서를 소지할 것
  - 1) 이 약을 복용하는 동안 다음의 증상이 나타난 경우: 알레르기 증상(발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움 등), 입이 마  
름, 변비 또는 설사의 증상, 두통, 안면(얼굴)홍조, 눈부심, 배뇨(소변을 누)장애
  - 2) 2주일 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우
6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
  - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
  - 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독 하에 투여할 것.
  - 3) 다량의 우유, 칼슘제제와 병용시 우유 알칼리 증후군(고칼슘혈증, 고질소혈증, 알칼리증 등)이 나타날 수  
있으므로 충분히 관찰하고 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지할 것.
  - 4) 이 약의 복용으로 인하여 모유의 분비가 힘들어질 수 있다.
  - 5) 이 약에는 메틸메티오닐설폰아미드화물이 배합되어 있어 특유의 냄새가 있다.
7. 저장상의 주의사항
  - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
  - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
  - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.
  - 4) 수분이 정제에 닿으면 성분 변화의 원인이 되므로, 물을 떨어뜨리거나 젖은 손으로 만지지 말 것. 잘못하여  
정제가 젖은 경우에는 젖은 정제를 폐기할 것.
  - 5) 용기 속에 채워 넣은 비닐은 운송 중에 정제의 손상을 방지하기 위한 것이므로 개봉 후에는 버릴 것.
  - 6) 용기의 뚜껑이 완전히 닫히지 않은 경우, 습기 등에 의하여 품질에 영향을 줄 수 있으므로 복용 후 반드시  
뚜껑을 잘 닫을 것.
  - 7) 사용기한이 지난 제품은 복용하지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 100정/병

[사용기간] 제조일로부터 36개월

- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고 의약품과 함께 보관하여 주십시오.
- ※ 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 유통과정 중 변질, 변색, 오염되었거나 손상된 의약품은 약국개설자 및  
의약품 판매업자에 한하여 교환하여 드립니다.
- ※ 최종 개정연월일 이후 변경된 내용은 한국코와주식회사 홈페이지([www.kowakorea.com](http://www.kowakorea.com))나 식품의약품안전처  
의약품 전자민원창구([ezdrug.mfds.go.kr](http://ezdrug.mfds.go.kr)) 의약품 정보란에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 복용 전 사용설명서를 자세히 읽어주십시오.
- ※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

제조사 Kowa Company, Ltd., 6-29 Nishiki 3-chome, Naka-ku, Nagoya, Japan  
Kowa Company, Ltd., Fuji Factory, 332-1, Ohnoshinden, Fuji City, Shizuoka Pref., Japan

수입판매자 **Kowa 한국코와주식회사** / 서울특별시 강남구 영동대로 302 7층

본 제품은 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 의거하여 소비자의 정당한 피해에 대해 보상  
받을 수 있습니다.  
전화번호 (소비자상담) 02-6930-4888 (수신자 부담) 080-851-4800

※ 복용하시기 전에 설명서를 주의 깊게 읽어보시고, 반드시 제품과 함께 보관하십시오.

작성연월일 : 2014년 1월 29일  
최종 개정연월일 : 2014년 1월 29일(제1판)