

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것. 1) 일부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 2) 디페닐메탄계 약물 (디펜하이드라민, 염산페클리진, 염산부클리진 등) 에 과민증 환자 3) 혈우병성 뇌내장 환자 4) 전립선비대 등 배뇨(소변)을 능률에 환자 5) 12세 이하의 소아 6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로 갈락토오스 불내증(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소결핍증(lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에는 신중히 투여한다.
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것. 1) 천식환자, 2) 이 약은 황색5호(신약물로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
3. 부작용: 1) 정신신경계: 때때로 졸음 등이 나타날 수 있다. 2) 소화기계: 때때로 위부불쾌감이 나타날 수 있다. 3) 눈: 때때로 시력불선명 등 시각장애가 나타날 수 있다. 4) 과민증: 발진 등이 나타날 수 있으므로 이런 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다. 5) 비뇨기계: 배뇨장애가 나타날 수 있다. 6) 기타: 때때로 구갈(구마름), 피로가 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의: 이 약을 투여중인 환자는 졸음이 나타날 수 있으므로 자동차 운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.
5. 상호작용: 1) 다음 약물과 병용하는 경우 이 약의 중추신경억제작용이 증강될 수 있다. : 바르비탈계 약물, 알코올, 정신안정제, 진정제 등 중추신경억제제 2) MAO제제에는 이 약의 항콜린 작용을 연장시켜 약효를 증강시킬 수 있다.

6. 소아에 대한 투여: 다른 항히스타민제와 같이 소아에서 과잉흥분을 일으킬 수 있다.
 7. 고령자에 대한 투여: 일반적으로 고려되는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.
- [저장방법]** 일매용기: 실온(1~30℃)보관 / **[포장단위]** 10정
[제조업체] 콜마파마 (주) / 충청북도 제천시 바이오밸리2로 93
[제조자] (주) 한국파비스제약 / 경기도 안산시 단원구 신당로 93번길 127
[제품문의] 02-2176-7700

- ※ 본 의약품은 우수약품제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질관리를 발한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오염되거나 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 자비한 의약품 정보는 온라인약도서관(druginfo.go.kr)의 의약품 검색란을 통해 확인하실 수 있습니다.
- ※ 의약품을 사용하기 전에 사용지에는 설명서를 주의 깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

분류번호:235

바코드 공간

[용법·용량]

1. 말미에 의한 구역, 구토, 어지러움 성인: 메클리진염산염 수화물로서 1일 1회 25~50mg을 승차 1시간전후에 경구투여한다.(먹는다. 복용한다.) 여행기간중 24시간마다 반복투여할 수 있다.

2. 미로염(나이염/속귀염), 메니에르증후군, 방사선 속취에 의한 구역, 구토, 어지러움 성인: 메클리진염산염수화물로서 1회 25mg 1일 2~3회 경구투여한다.(먹는다. 복용한다.) 원칙적으로 1일 75mg(3정)을 초과하지 않는다. 연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

구역,구토,어지러움

kolmar
콜마파마

엠클리진[®] 정 Mclizine[®] Tab.

미로염(나이염/속귀염) · 메니에르증후군 · 방사선 속취에 의한 구역, 구토, 어지러움
 말미에 의한 구역, 구토, 어지러움에 효과가 있습니다.

일반의약품 | 10정

[원료약품 및 분량] 1정 중

- 메클리진염산염수화물(K)¹)..... 25mg
 첨가제(보존제): 파라옥시벤조산부틸(K)²) 0.03mg
 첨가제(타르색소): 황색5호
[성상] 옅은 주황색의 클로버형 정제

[효능·효과] 1. 주효능·효과: 말미에 의한 구역·구토·어지러움.

2. 다음 질환에도 사용할 수 있다. : 미로염(나이염/속귀염), 메니에르증후군·방사선 속취에 따르는 구역, 구토, 어지러움
콜마파마(주) 충북 제천시 바이오밸리2로 93
www.kolmarpharma.com

