

항산화제 + 고단위 비타민B군 100mg 고함량 기능성 비타민

트리빅정

활성비타민 함유

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

니코틴산아미드(KP)	100.0mg
제피아스코르브산(KPC) (아스코르브산으로서 95.96mg)	100.0mg
리보플라빈(KP)	100.0mg
폴산(KP)	100.0mg
판토텐산칼슘(KP)	108.7mg
시아노코발라민1000배산(KPC) (시아노코발라민으로서 100μg)	100.0mg
비오틴(USP)	100.0μg
콜린타르타르산염(DAB)	100.0mg
피리독신염산염(KP)	100.0mg
이노시톨(KP)	100.0mg
티아민질산염(KP)	95.0mg
푸르셀티아민(KPC)	5.0mg
γ-오리자놀(KPC)	10.0mg
산화아연(KP) (아연으로서 25mg)	31.2mg

첨가제(타르색소) : 청색1호, 적색40호, 황색203호
첨가제(동물유래) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)

[성상] 갈색의 장방형 필름코팅정

[효능·효과]

1. 다음경우의 비타민 B₁, B₂, B₆, C의 보급
 - 육체피로 - 임신·수유기
 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
 - 각기 - 눈의피로
3. 아연의 보급

[용법·용량] 12세 이상 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정 식후 복용

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
 - 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 3) 만 12개월 미만의 젖먹이
 - 4) 신장결석 환자
 - 5) 심한 증상의 신부전 환자
 - 6) 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
 - 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
 - 2) 레보도파
3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
 - 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 4) 심장·순환기계기능 장애 환자
 - 5) 신장장애 환자

- 6) 저단백혈증 환자
- 7) 강심배당체를 투여 중인 환자
- 8) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
 - 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 구내염(입안염), 식욕부진, 복부팽만감, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 폐부종
 - 2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
 - 3) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
 - 4) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
 - 5) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
 - 6) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
 - 7) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있습니다.
 - 8) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용)투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
 - 9) 우발적으로 과량복용 한 경우
 - 10) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오.
 - 2) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
 - 3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사에 영향을 줄 수 있습니다.
 - 4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.
6. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관하십시오.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 60정, 120정

[제조외의자] 슈넬생명과학(주) / 경기도 화성시 양감면 두머리길 16

[제조자] 한국프라임제약(주) / 전북 완주군 동동읍 완주산단9로 100

[판매자] (주)대웅생명과학 / 서울특별시 강동구 강동대로 189

* 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품판매업자에게만 바꾸실 수 있습니다.

* 이 첨부문서 작성일자(2014년 09월 15일) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 '의약품검색'에서 확인할 수 있습니다.

* 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.

☎ 소비자 상담실 (02)561-4011

첨부문서 최종 개정 연월일 : 2014.09.15