



네버콜에이 캡슐

기침 가래 콧물 두통 인후통

중·합·감·기·약

본 약은 사용하기 전에 본 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 본 첨부문서를 본 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

주성분: 아세트아미노펜(KP)	150.0mg
주성분: 클로르페니라민말산염(KP)	1.25mg
주성분: 수도에페드린염산염(USP)	15.0mg
주성분: 리소지염산염(KP)	10.0mg
주성분: 티아민질산염(KP)	4.0mg
주성분: 리보플라빈(KP)	2.0mg
주성분: 제피아스코르브산(별규)	20.83mg
(아스코르브산으로서 20.0mg)	
주성분: 갈근탕엑스(10-1)(성규)	100.0mg
주성분: 클로페라스타틴염산염(KP)	8.0mg
주성분: 카페인무수물(KP)	10.0mg
착색제(타르색소): 황색 203호, 녹색 3호	

【특성】 갈색 및 흰색의 분말 또는 과립이 들어있는 상·하부 녹색의 경질캡슐

【효능·효과】 감기의 증상(코막힘, 코막힘, 재채기, 인후통, 기침, 가래, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

【용법·용량】 성인(만 15세 이상): 1회 2캡슐, 어린이(만 8세~만 15세 미만): 1회 1캡슐, 1일 3회 식후 30분에 복용합니다.

【사용상의 주의사항】

- 경고
매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있습니다
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
 - 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
 - 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 전신을 일으킨 적이 있는 사람
 - 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)
 - MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
 - 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당) 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것
진해(기침을 그치게 함)거담제(가래약), 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염(코염)용 경구제, 멸미약, 알레르기용약)
- 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 행위를 하지 말 것
이 약에는 아세트아미노펜이 함유되어 있다. 다른 아세트아미노펜 제품과 함께 복용하여 일일 최대용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용해서는 안 된다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것
 - 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(갓난아기) 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이중후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의할 것)
 - 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경우라도 2세 미만의 영아(갓난아기)·유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이 약을 복용시키지 않도록 한다. 만 2세 미만 영아(갓난아기)·유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터링해야 한다.
 - 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
 - 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람

- 간질질환, 신장(콩팥)질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 부종, 위십이지장장애, 녹내장(예: 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨(소변을 누)곤란 등이 있는 사람, 고령자(노인), 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 속쓰림, 위부(상복부)불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈문제를 가지고 있는 사람
- 입부 또는 인강에 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 의사 또는 치과 의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여받고 있는 사람)
- 다음과 같은 기침이 있는 사람: 흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성기침, 발열, 발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것
 - 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 변비, 부종(부기), 배뇨(소변을 누)곤란, 목마름(지속적이거나 심한), 어지러움, 불안, 떨림, 불면
 - 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증(심한 증상) 증상이 나타난 경우
 - 속(아나필락시스): 복통 후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다.
 - 피부점막만종후군(스티븐스-존슨증후군): 중증표피괴사성질환(리얼증후군): 고열을 동반하고, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈점막에 나타날 수 있다.
 - 천식
 - 간기능장애: 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띠게 됨)등이 나타날 수 있다.
 - 간질성폐렴: 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타난다.
 - 위알도스테론증: 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아 지거나 두통 등이 나타날 수 있다.(1일 최대 복용량이 감소해서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류, 부종, 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.)
 - 근병증: 저칼륨혈증의 결과로서 근병증이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.
- 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우
- 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
 - 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
 - 장기간 계속 복용하지 말 것
 - 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것
 - 복용시에는 음식하지 말 것
 - 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것
 - 바르비탈계약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소 되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다.
 - 칼륨함유제제, 칼슘함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프제 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드제 이뇨제(트리클로로메타이아지드)와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것
 - 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것
 - 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

※ 어린이 안전용기(Hard push foil)를 사용한 제품입니다.
개봉시, 제품 파손이 우려되므로 뒷면의 은박(foil)부분을 손톱으로 눌러(금속적 제품의 중앙부분을 피하여) 개봉합니다.

【주의】 이상반응
【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)
【사용기간】 제조일로부터 36개월
【포장단위】 10캡슐

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회 고시 "품목별 소비자 분쟁 해결기준"에 의거 정당한 피해에 보상하여 드립니다.

이 첨부문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 동성제약 홈페이지(www.dongsung-pharm.co.kr) 및 식품의약품 안전처 온라인의약품도서관(http://drug.mds.go.kr/)의 해당 제품정보란에서 확인할 수 있습니다.

제조 및 판매원
동성제약주식회사
http://www.dongsung-pharm.co.kr

DS-1501-01
소비자 상담전화: 080-001-0921
공 장 : 충남 아산시 둔포면 관대길 45
본 사 : 서울시 도봉구 도봉로 683