

항산화제보강 + 고단위 비타민B군 100mg

빅스타민[®]

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

벤토타민(KPC)(티아민염산염으로서 36.15mg)	50.0mg
니코틴아미드(KP)	100.0mg
제피아스코르빈(KPC)(아스코르빈으로서 95.96mg)	100.0mg
리보플라빈(KP)	100.0mg
폴산(KP)	100.0μg
판토텐산칼슘(KP)	108.7mg
시아노코발라민1000배산(KPC)(시아노코발라민으로서 100μg) ...	100.0mg
비오틴(USP)	100.0μg
클린타르타르산염(DAB)	100.0mg
피리독신염산염(KP)	100.0mg
이노시톨(KP)	100.0mg
유비데카레논(KP)	5.0mg
γ-오리자놀(KPC)	10.0mg
산화아연(KP)(아연으로서 25mg)	31.2mg

첨가제(타르색소): 청색1호, 적색40호, 황색203호

첨가제(동물유래): 유당수화물(기원동물: 소, 사용부위: 우유)

[성상] 갈색의 장방형 필름코팅정

[효능·효과]

1. 다음경우의 비타민 B1, B2, B6, C의 보급

- 육체피로 - 임신·수유기

- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시

2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.

- 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(오목, 어깨결림 등),

구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

- 각기 - 눈의피로

3. 아연의 보급

[용법·용량] 12세 이상 및 성인: 1일 1회, 1회 1정 식후 복용

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

1) 고칼슘혈증(hypercalcemia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유육종증(sarcoidosis: 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자

2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자

3) 만 12개월 미만의 젖먹이

4) 신장결석 환자

5) 심한 증상의 신부전 환자

6) 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

1) 안염, 갈습염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제

2) 레노도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오.

1) 의사의 치료를 받고 있는 환자

2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria: 요중에 과량의 옥살산이 배설되는 상태)

3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아

4) 심장·순환기계 기능 장애 환자

5) 신장장애 환자

6) 저단백혈증 환자

7) 강심배당제를 투여 중인 환자

8) 동통증 또는 신경결석에 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우

: 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 구내염(입안염), 식욕부진, 복부팽만감, 변비, 저혈압, 얼굴종아름, 심박동불규칙, 피부발진, 위장관장애, 소화장애, 상복부부종, 폐부종

2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.

3) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.

4) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.

5) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간소상을 일으킬 수 있습니다.

6) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 우울심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.

7) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있습니다.

8) 할랄도스테로이드, 트리암테렌과 병용(함께 복용)투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.

9) 우발적으로 과량복용 한 경우

10) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜하십시오.

2) 각종 오점사이에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.

3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.

4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

2) 서시공전을 피하고 될 수 있는 한 습기(적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관하십시오.

3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 60정, 120정

[제조외곽지] 수일생명과학(주) / 경기도 화성시 양명면 두머리길 16

[제조자] 한국코프라이제약(주) / 전북 완주군 봉동읍 원주산단9로 100

[판매자] (주)대웅생명과학 / 서울시 강동구 강동대로 189

* 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품판매업자에게만 바꾸실 수 있습니다.

* 이 첨부문서 작성일(2014년 09월 15일) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 장관의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr/>)의 '의약품검색'에서 확인할 수 있습니다.

* 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.

☎ 소비자 상담실 (02)561-4011

첨부문서 최종 개정 연월일: 2014.09.15