

메가우루백정

육체피로, 눈의피로, 구내염, 신경통, 근육통

고함량비타민B군

UDCA 30mg

일반의약품	
분류번호	319

DS

육체피로, 눈의피로, 구내염, 신경통, 근육통 MEGAUR00100

본 약은 사용하기 전에 본 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 본 첨부문서를 본 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

주성분 : 폴린타르타르산염(USP).....	100mg
티아민염산염(KP).....	100mg
리보플라빈(KP).....	100mg
피리독신염산염(KP).....	100mg
시아노코발라민1000배산(KP).....	100mg
(시아노코발라민으로서 100μg)	
니코틴산아미드(KP).....	100mg
폴산(KP).....	0.1mg
d-비오틴(EP).....	0.1mg
판토텐산칼슘(KP).....	108.7mg
이노시톨 (KP).....	100mg
우르소데옥시콜산(KP).....	30mg

착색제 (타르색소) : 황색 4호 알루미늄레이크,
황색 5호 알루미늄레이크

[성상] 주황색의 장방형 필름코팅정

[효능·효과] ▶ 다음경우의 비타민 B₁, B₂, B₆, B₁₂의 보급

- 육체피로 - 임신·수유기 - 병중·병후
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
 - 각기 · 눈의피로

[용법·용량] 성인 : 1일 1회 1정을 복용한다.

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 만 3개월 미만의 젖먹이
 - 이 약은 유당수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - 레보도파

- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
 - 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - 구역, 구토, 묽은 변
 - 피리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
 - 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
 - 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
 - 우발적으로 과량복용 한 경우
 - 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
 - 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 요를 황색으로 변화하게 하여 임상검사지에 영향을 줄 수 있다.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
 - 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기간] 제조일로부터 36개월

[포장단위] 45정, 90정

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회 고시"품목별 소비자 분쟁해결기준"에 의거 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

DS-1501-01

첨부문서 최초 작성년월일 2014. 08. 18

첨부문서 최종 개정년월일 2015. 01. 21

이 첨부문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 동성제약 홈페이지(www.dongsung-pharm.co.kr) 및 식품의약품안전처 홈페이지 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 해당 제품정보란에서 확인할 수 있습니다.

[제조외국지]

 **동성제약주식회사**

[본 사] 서울시 도봉구 도봉로 683

[공 장] 충남 아산시 둔포면 관대안길 45

[소비자 상담번호] 080-001-0921

[사이트] www.dongsung-pharm.co.kr

[제조자]

 **(주)마더스제약**

경북 경산시 진량읍 공단6로 24길 18