

어린이 콧물감기엔

바로노즈 시럽

분류번호 : 114 일반의약품

복용하기 전에 설명서를 주의깊게 읽어보시고, 반드시 제품과 함께 보관하십시오.

【제품명】 바로노즈시럽

【원료약품 및 그 분량】 이 약 100 mL 중

아세트아미노펜(ASP).....	1000 mg
클로르페니라민말레산염(KP).....	9 mg
수도에페드린염산염(KP).....	110 mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸(KP).....	90 mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산프로필(KP).....	10 mg

【성상】 포도향이 나는 단맛의 무색 또는 미황색의 투명한 시럽제

【효능·효과】 감기의 증상(여러증상) : 콧물, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 오한(열)과 떨리는 증상, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

【용법·용량】 다음의 1회 용량을 1일 3~4회, 식후 30분 및 필요할 경우 취침 시에 복용한다. 복용 간격은 4시간으로 한다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간 손상이 유발될 수 있다

2. 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 행위를 하지 말 것

이 약에는 아세트아미노펜이 함유되어 있다. 다른 아세트아미노펜 제품과 함께 복용하여 일일 최대 용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용해서는 안 된다.

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 천식을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)
- 4) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람

4. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것

진해(기침을 그치게 함)거담제(가래약), 다른 감기약, 해열 진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염) 용경구제, 말미약, 알레르기용약)

5. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것

- 1) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(갓난아기) 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구도를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이중후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의할 것)
- 2) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 3) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 4) 간장질환, 신장(콩팥)질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 위십이지장염, 녹내장(눈의

연령(나이)	1회 복용량
만 15세 이상	20 mL
만 11세 이상 ~ 만 15세 미만	13.4 mL
만 7세 이상 ~ 만 11세 미만	10 mL
만 3세 이상 ~ 만 7세 미만	6.7 mL
만 2세 이상 ~ 만 3세 미만	5 mL
만 2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다	

통증, 눈이 침침함 등), 배뇨(소변을 누)곤란 등이 있는 사람, 고령자(노인), 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람

5) 속쓰림, 위부(상복부)불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈문제를 가지고 있는 사람

6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부

7) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고있는 사람(당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)

8) 다음과 같은 기침이 있는 사람 : 흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

6. 소아에 대한 투여

만 2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다

7. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것(상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것)

1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우 : 발진발적(출혈되어 붉어짐), 가려움, 구역구토, 식욕부진, 변비, 부종(부기), 배뇨(소변을 누)곤란, 목마름(지속적이거나 심한), 어지러움, 불안, 떨림, 불면

2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증(심한 증상)이 나타난 경우

① 속(아나필락시스) : 복용후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다.

② 피부정맥만종후군(스티븐스-존슨중후군), 중증표피괴괴사후(리얼중후군) : 고열을 동반하고, 발진·발적(출혈되어 붉어짐), 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈 점막에 나타날 수 있다.

③ 천식

④ 간기능장애 : 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨) 등이 나타날 수 있다.

⑤ 간질성폐렴 : 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타난다.

3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

8. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법용량을 잘 지킬 것
- 2) 장기간 계속 복용하지 말 것
- 3) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도·감독하에 복용시킬 것
- 4) 복용시에는 음주하지 말 것
- 5) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것
- 6) 바르비탈계 약물, 삼한계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다.

9. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것
- 3) 오염(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 자사포장단위(외부포장에 표기)

【제조자】 한국맥네티타추 총판 천안시 서북구 성환읍 읍3길 46

【제조회사】 경남제약(주) 총판 아산시 신창면 서부남로790번길 49

* 기타 주의

1. 허가된 효능 효과와 다른 용도로 사용시에는 예상하지 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.
2. 사용기한이 지난 제품은 변질의 우려가 있으므로 복용을 금하시기 바랍니다.
- * 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사 및 자사 소비자 상담실로 문의하시기 바랍니다. 소비자 상담전화 : 080-232-8600, www.kyungnampharm.co.kr
- * 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오염된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회 고시 "소비자분쟁 해결기준"에 의거 구입한 곳에서 교환 또는 환불받을 수 있습니다.
- * 약품의 용어설명 및 기타 자세한 약품 정보는 온라인의약품도서관 <http://drug.mfds.go.kr> → '약품품 검색'을 참조하시기 바랍니다.