

알지톤액

(알긴산나트륨)

- 성분·함량 : 이 약 100mL중
- | | |
|--------------------------|--------|
| 알긴산나트륨(NF) | 5.0g |
| 첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸(KP) | 0.005g |
| 파라옥시벤조산프로필(KP) | 0.005g |

- 성 상 : 초록색의 점성이 있는 액제

■ 효능·효과

1. 다음 질환의 지혈 및 자각증상의 개선: 위 십이지장궤양, 미란성위염
2. 역류성식도염의 자각증상 개선
3. 위 생검 출혈시의 지혈

■ 용법·용량

1. 위 십이지장궤양 및 미란성위염의 지혈 및 자각증상 개선과 역류성 식도염의 자각증상 개선 : 알긴산나트륨으로서 보통 1회 1~3g(이 약 20~60mL)을 1일 3~4회 공복에 경구투여한다. 경구 투여가 불가능한 경우에는 코 존데(sonde)를 이용한 경비투여를 한다.
2. 위 생검 출혈시의 지혈 : 이 약으로서 보통 1회 0.5~1.5g(이 약 10~30mL)을 내시경적으로 투여하고 1회 1.5g(이 약 30mL)을 경구투여한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
때때로 설사, 변비 등의 증상이 나타날 수 있다.
2. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
위산결핍증에서는 겔화(gelation)가 이루어지지 않아 이 약의 효과가 떨어진다.

■ 포장단위 : 20mL X 20포

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

- * 본품을 구입할 때 사용기한이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- * 본제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
- * 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

<이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 www.seoulpharma.com이나 (080)780-1931에서 확인할 수 있습니다.>

작성일자 : 2015. 01. 27
I ALG 20 R01

- 제 조 자 : 셀티스팜(주) : 충청북도 충주시 대소원면 첨단산업1로 120
■ 제조의뢰자 : (주)서울제약 : 경기도 시흥시 경제로 59



마음까지 건강하게
(주)서울제약