

- 이 약을 복용하시기 전에 사용설명서를 자세히 읽어주십시오.
- 본 사용설명서를 잘 보관하시고, 필요시 다시 한번 읽어 주십시오.
- 사용기한이 지난 제품은 복용하지 마십시오.

사용설명서



현대약품은 제약업계 최초로
CCM 인증 기업으로서
소비자 중심 경영을 실천합니다.

효과 빠른 액상 종합감기약

라피
콜드
Lapin Cold

해설

114

일반의약품

KGMP

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

아세트아미노펜(KP)	150mg
dl-메틸에페드린염산염(KP)	10mg
클로르페니라민말레산염(KP)	1.25mg
카페인무수물(KP)	8.33mg
참가제(타르색소) : 적색40호	

【성상】 흰색의 유상 내용물을 함유한 붉은색의 타원형 연질캡슐

【효능·효과】 감기의 제증상(여러증상)(콧물, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 기침, 가래, 오한(춥고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

【용법·용량】 만 15세 이상 및 성인 : 1일 3회, 1회 2캡슐 식후 30분에 복용

【사용상의 주의사항】

1. 경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분:에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
 - 2) 이 약 및 이 약의 구성성분: 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 신전을 일으킨 적이 있는 사람
 - 3) 만 3개월 미만의 영아(간접가아)
 - 4) MAO 억제제(히우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
- 진해(기침을 그치게 함)기름제(가래약), 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항소스타민제를 함유하는 내복약(비염약(코약)을 경구제, 멸미약, 알레르기용약).
- 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 약을 함하지 말 것.
- 1) 약에는 아세트티아미노펜이 함유되어 있다. 다른 아세트티아미노펜 제품과 함께 복용하여 일일 최대 용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 아세트티아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용해서는 안 된다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것.

- 1) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(갓난아기) 및 만 15세 미만의 어린이 (구역단위)
교토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이중후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상담
의사환자
- 2) 만 37살을 미치지 않은 영아(갓난아기)는 복통을 하고 난 3개월 이상인 경우도 만 2세 미만의 영아(갓난아기).
유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이 약을 복용하지 않도록 한다. 만 2세 미만
영아(갓난아기), 유아에게 이 약을 투여할 경우 보충제에 해당 조건의 경우 2주 이하에 한도.

- 3) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉화피부염, 기면간지진, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 4) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상이: 발열, 발진, 관절염, 가려움증 등을 일으킨 적이 있는 사람
- 5) 간질성염, 신장(콩팥)질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 임신이장장애, 녹내장(예: 눈의 농주, 눈이 침침함), 폐보조기관을 옮긴 적이 있는 사람, 고령자(노년), 폐이 약한 사람 또는 고령이 있는 사람
- 6) 속쓰림, 위부불쾌감, 위통 등이 있는 위장장애가 혹은 혹은 재발되거나 궤양, 출혈성질환을 가지고 있는 사람
- 7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 8) 의사 또는 치과직사의 치료를 받고 있는 사람(발모약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)
- 9) 다음과 같은 기침이 있는 사람
 출름, 천식, 만성 기관지진, 폐기종, 기도환 개라가 동반되는 기침, 1주 이상 지속되는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열, 발진이나 호흡적인 동통이 동반되는 기침
6. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉시 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
 발진·발적(홍합)이 붉어짐, 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 변비, 부종(붓음), 배뇨(소변을 볼)곤란, 목마름(소식적
 이거나 심한), 어지러움, 불안, 떨림, 불안
- 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증(심한 증상) 증상이 나타난 경우
 ① 이차발작(과민성피부증) : 복통을 배로 두드리기, 부종(붓음), 기습발작 등과 함께 안색이 창백해지고, 손발이
 차고, 식욕, 습기가 곤란할 등이 나타날 수 있다. ② 피부발진(발진) : 붉어짐(붉은진주) : 붉어짐과 같이 물집이 생기는
 중증종괴피부자해(레버라중증) : 고열을 동반하고, 발진·발적(홍합)이 불어짐, 화상과 같이 물집이 생기는
 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈주위에 나타날 수 있다. ③ 천식 ④ 긴가경련에 : 전신의 나른함, 창달(피부
 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 될)등이 나타날 수 있다. ⑤ 간질성사별 : 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란,
 발열 등이 나타날다.
- 3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우
7. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
- ① 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. ② 장기간 계속 복용하지 말 것. ③ 복용시에는 음주하지 말 것.
 ④ 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으면 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것.
- ⑤ 비록발작 약물, 심한게 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 에스테미다노펜을 대사시키는 능력이
 감소되어 에스테미다노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다.
8. 주의사항의 제대
- ① 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.
- ② 의약품등을 피하고 싶을 때는 약이 적은 서늘한 곳에(발열약) 보관할 것.
- ③ 오작동(잘 못)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 10캡슐

- * 이 책은 물과 함께 복음화합니다. * 만민이의 신도 될 것이니 모든 곳에 보편하여 주시옵소서. * 이 책을 통해 오로지 일러두기 없이 불타는 열매(총합되어 불타), 개미들이 나타나는 경우에는 짐승으로 취급하고 악사 또는 의사의 소심 하십시오. * 강요(강박 사용)를 막고, 품질을 보호 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오. * 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변색 또는 소손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환여야 합니다. * 이 제품의 대에는 대한 모든 구입자는 사용설명서에 포함된 제품보증서로 문의하십시오. * 이 사용설명서 개정판(2015년 3월) 이후 변경된 내용은 현대약품(주) 홈페이지 (<http://www.hyundapharm.co.kr>) 제품문헌([1666-9979](tel:1666-9979))에서 확인하실 수 있습니다.

♣ 제품문의처 : ☎ 1666-9979 ♣ 사용설명서 개정년월 : 2015. 3.

제조의뢰자 : 현대약품주식회사 충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55

제 조 자 : 주식회사알피코프 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7
주식회사대웅제약 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-14

