

근육경련 및 혈액순환개선제 마그트윈

Magtwin Soft Cap.

일반의약품

KGM02제조자격을

분류번호:03160

연질
캡슐

[성분 · 함량]

토코페롤아세테이트(KP).....	500.0mg
(비타민E로서 500I.U.)	
산화마그네슘(KP).....	250.0mg
(마그네슘으로서 150mg)	
피리독신염산염(KP).....	55.0mg
티아민질산염(KP).....	50.0mg
γ-오리자놀(KP).....	10.0mg
첨가제(KPTaCS): 적색 40호, 황색 5호, 청색 1호	
첨가제(동물유래성분): 젤라틴(소, 가축), 숙신산젤라틴(소, 가축)	
첨가제(식물유래성분): 대두유(콩기름)	

[성상] 회백색 유상물질(기름상태물질)이 들어있는 적갈색의 장방형 연질캡슐

[효능 · 효과]

1. 다음경우의 비타민 E, B₁, B₆의 보급

- 육체피로 - 임신 · 수유기
- 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
- 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다.
- 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화: 어깨 · 목결림, 수족저림 · 수족냉증(손발이 차가움)
- 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
- 각기
- 논의피로

2. 마그네슘결핍으로 인한 근육경련

[용법 · 용량] 만 12세 이상 및 성인: 1회 1캡슐, 1일 2회 복용한다.

[사용상주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 만 12개월 미만의 적막이
- 3) 심한 증상의 신부전 환자
- 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 황장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- 2) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 2) 레보도파

4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- 3) 심장 · 순환기계기능 장애 환자
- 4) 신장(콩팥)장애 환자
- 5) 저단백혈증 환자
- 6) 임부

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은 변

, 식욕부진, 복부(배부분)팽만감, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하

2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.

3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막 형성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있다.

4) 피라독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy): 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적 변화)이 나타날 수 있다.

5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증(hypermnatremia): 혈액 중에 나트륨이 과잉으로 존재하는 상태, 울혈심부전(CHF: 심장기능 저하로 신체조직이나 기관에 혈액을 공급할 수 없는 상태, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.

6) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용(사용))투여시 고칼륨혈증(hyperkalemia: 혈중의 칼륨농도가 정상 이상으로 과도하게 높아지고 있는 상태를 일으킬 수 있으므로 주의할 것.

7) 우발적으로 과량복용 한 경우

8) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 일반적 주의

- 1) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체내배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정중용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

7. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여할 것.
- 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

8. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기간] 제조일로부터 24개월

[포장단위] 자사포장단위

[판매원]  동국대  경주제약

본사 · 공장: 충청남도 아산시 실곡로 174(실곡동 345-6)
서울사무소: 서울특별시 서대문구 충정로 8(충정로3가 368)

[제조자] 한국프라이머제약(주)

전북 완주군 봉동읍 완주산단9로 100

[소비자상담실] 080-700-8487

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품이며, 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 첨부문서 개정일자 이후 변경된 내용은 식약처 온라인 의약품서관(<http://drug.mfds.go.kr/>)의 '의약품등 정보란'을 참조하시기 바랍니다.

※ 유효기간 또는 사용기한이 지난 의약품은 사용하지하면 안 되며, 의약품은 사용하시기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

개정일자 2015. 06. 01