

ALFOMIN

알포민

(콜린알포세레이트)

※ 제품의 효과적인 사용을 위해, 첨부문서를 주의깊게 읽어 주시고,
첨부문서는 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

전문의약품 분류번호 : 119

원료약품 및 분량

이 약 1정 중
콜린알포세레이트(KP) 400mg
첨가제(타르색소) : 황색 4호, 적색 4호
동물유래성분(유당수화물 : 소, 우유)

성상

담황색의 장방형 필름코팅정

효능 · 효과

- 뇌혈관 결손에 의한 2차 증상 및 변성 또는 퇴행성 뇌기질성 정신증후군 : 기억력저하와 착란, 의욕 및 자발성저하로 인한 방향감각장애, 의욕 및 자발성 저하, 집중력감소
- 감정 및 행동변화 : 정서불안, 자극과민성, 주위무관심
- 노인성 가성우울증

용법 · 용량

콜린알포세레이트로서 1회 400mg을 1일 2~3회 경구 투여한다.
증상에 따라 적절히 증감한다.

사용상의 주의사항

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응 환자
 - 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
 - 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해 효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 이상반응
 - 1) 2차적인 도파민 작용에 기인한다고 추정되는 구역이

- 1) 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량 투여한다.
- 2) 소화기계 : 위염, 위질환
- 3) 정신신경계 : 졸음, 불면, 적개심, 신경질, 경련, 운동과다
4. 보관 및 취급상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위

자사포장단위

※ 본 제품은 인습성이 있으므로 PTP포장상태로 보관하시고, 복용할 때 개봉하십시오.

※ 본 의약품은 KGMP 적격업체에서 생산하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과 되었거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 의약품은 구입한 약국 및 의약품 판매자를 통하여 교환하여 드립니다. 제품에 관한 문의 및 이 첨부문서의 작성일자(2015년 05월 19 일)이후 변경된 내용의 확인은 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 또는 홈페이지(www.yuyu.co.kr)나 크로마서비스(수신자 요금부담)080-900-0066으로 하시기 바랍니다.

제조의뢰자

yuyu (주)유유제약

서울사무소 : 서울시 중구 동호로 197 유유빌딩
본사 · 공장 : 충북 제천시 바이오밸리 1로 94
www.yuyu.co.kr

제조사

한국프라임제약(주)

전북 완주군 봉동읍 완주산단9로 100

LT1053-01