

넬슨 세레콕시브 캔솔 200mg
(세레콕시브)

[원료약품 및 분량] 이 약 1캡슐 중
세레크시브(USP) 200mg
첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(기원동물:소, 사용부위:우유)

[성상] 흰색 내지 미황색의 분말이 든 흰색의 불투명한 경질캡슐제

[효능·효과]

1. 골관절염(퇴행관절염)의 증상이나 징후의 완화
2. 류마티스관절염의 증상이나 징후의 완화
3. 강직척추염의 증상 및 징후의 완화
4. 성인의 급성 통풍 완화(수술후, 발치후 진통)
5. 원발원경동

[음표 · 음량]

- **시험의 최소 권장량**은 환자에 따라 조제되어 양과, 식재료 및 개념에 따라 다르다.
- **신상:**
- 1. **권장량 (비행권량):** ▶ 세제비료비료 200mg/L 1개, 또는 1회 100 mg을 1회 2회로 나누어 복용한다.
 - 2. **권장량 (안정제):** ▶ 세제비료비료 1회 100mg 또는 200mg을 1회 2회로 나누어 복용한다.
 - 3. **권장량 (안정제):** ▶ 세제비료비료 200mg을 1회, 또는 1회 100mg/L 1회 2회로 나누어 복용한다. 6 주 후에 효과가 관찰되지 않으면, 1회 400mg까지 투여할 수 있다. 1회 400mg 투여까지 6 주 후에 효과가 관찰되지 않으면, 다른 치료 방법을 고려해야 한다.
 - 4. **권장량 (안정제):** ▶ 초기 권장량인 세제비료비료 400mg/L이 필요시 투여할 때 200mg을 추가로 투여한다.
 - 5. **권장량 (안정제):** ▶ 세제비료비료 200mg을 1회 200mg/L 1회 2회로 복용한다.
- **간접에 따라:** ▶ 중독증의 2차에 (Chug-Pugh Scale) 환자 측에서는 용량 1회 권장량의 약 50% 감소시켜 준다.

[사용상의 주의사항]

- ## 제 2 장
- ① 매일 아침 기상 전거정보를 숙을 마시는 사람이 약이나 다른 영양보충제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의
한다. 이러한 사람은 의약 관련 분야에 대한 특별한 교육 없이도 위험성을 인지할 수 있다.
- ② 심혈관계 위험: 의사는 종종 다양한 질환이 동반된 환자, 고령증상 및 뇌졸중의 위험을 증가시킬 수 있으며, 이는 치명적일 수
있다. 모든 비의료인으로서 소아전통적 약물에 대해 환자를 위한 위험이 발생할 수도 있다. 특히 기구, 투여 용량, 투여 시간과 위험 인
자에 따라 이러한 위험이 증가될 수 있다. 심혈관 질환은 일반적으로는 환자에게서 더 위험할 수도 있다. 이 이유로 치료받은 환자에서
심 혈관계에 어떤 변화든 나타낸 진단적 실험결과가 위해 조치 후 유용할지 또는 가능한 최단기간 동안 사용해야 하는지와, 미친
환자나 이러한 실험 결과 중상의 위험에 대하여 신중한 모니터링을 포함하여, 이는 심혈관계 질환의 병력이 있는 경우에는 더욱
정확히 적용된다. 현재는 종합한 심혈관계 검사의 질적 양과 의료진은 종종 심 이러한 증상(기침, 숨찬, 식욕, 불규칙한 발음)이
발현되는 경우 위험을 평가하는데 사전에 교육이 있어야 한다.
- ③ 위장관계 위험: 의약품 포함하는 비의료인으로서 소아전통적 약물은 위트, 소화 장애, 설사, 구강 및 천공을 포함한 잠재적 위장
관계 이상행동의 위험을 증가시킬 수 있으며 이는 치명적일 수도 있다. 이러한 이상행동을 유발 할 경우 진단적 검사 증상을 의심
할 수 있다. 그러므로 종종 한 위장관계 이상행동의 위험이 더 클 수 있다.
- ④ 투여 기간: 길어질수록 증대한 위장관계 이상행동과 심혈관의 발생 가능성이 증가할 수 있으나 단기 투여시 이러한 위험이 완전히 배
제되지는 것은 아니다. 이 목적을 통해, 위장관계 이상행동에 개입되는 모든 종류의 증상 및 징후에 대해서 신중하게 확인하여 하며,
영양의 손상, 소화불량, 구역, 구토를 포함한 임상적인 증상 모두 증상의 위험성에 기반한 것이 사실임을 검증하기 추가적인
위트 지지를 실시하여야 한다. 그 위험군의 환자에게는 비의료인으로서 소아전통적 약과 관련 없는 다른 대체 치료제를 추천
하여야 한다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 2) 실험이 막 및 역의 구성성분에 대해 과민반응을 그 병력이 있는 환자
- 3) 살코기 및 달걀에 대해 알레르기 반응을 보이는 환자
- 3) 아스타르틴이나 다른 비스테로이드성 소염진통제 (COX-2 억제제 포함)에 대하여 천식, 급성 비염, 비록 출혈, 혈관부종, 두드러기 또는 알레르기 반응의 병력이 있는 환자
- 4) 중증 간장애 환자
- 5) 중증 신장애 환자 (크레아티닌 청소율 (30mL/min인 환자)
- 6) 활동성 소화성 궤양 또는 위궤관 출혈 환자
- 7) 크론병 또는 궤양성 대장염과 같은 염증성 장 질환 환자
- 8) 불활성 심부전 환자 (N/A II – IV)
- 9) 복합 비활성 심장질환자, 말초성 동맥질환 환자 및/또는 뇌혈관 질환자
- 10) 알부민 또는 전산하고 있을 가능성이 있는 여성
- 11) 수유부
- 12) 관상동맥 우회로술(CABG) 전후에 발생한 증상의 치료
- 13) 고콜레스테롤 환자
- 14) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에서는 투여해야 합니다.

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 1) 간장애 환자 또는 그 병력이 있는 환자
- 2) 신장애 환자 또는 그 병력이 있는 환자(크레아티닌청소율(50mL/min인 환자)
- 3) 기간전 신자 환자
- 4) 심부전 환자 또는 그 병력이 있는 환자
- 5) 고혈압 환자 또는 그 병력이 있는 환자
- 6) 재복약 환자 또는 부종의 병력이 있는 환자
- 7) 미노사이클 ACE 제해제를 투여중인 환자
- 8) 저혈당증의 위험이 있는 환자
- 9) 말초혈관
- 10) 고령자
- 11) 소화성 궤양이나 위궤관 출혈의 병력이 있는 환자
- 12) 심혈관계 이상반응(심장박동차, 뇌졸중 등)에 대한 고도의 위험인자를 가진 환자
- 13) CYP2C9에 의한 대사가 중요한 환자
- 14) 혈액응고장애가 있거나 항응고제를 투여받고 있는 환자
- 15) 간기능을 개해하는 여성(이 약을 복용시 여성 생식능력이 손상될 수 있다.)
- 16) 임신부 환자

4. 이삼반응

- (1) 이상의 표1은 성별에 따라 1일 100mg ~ 800mg까지 용량을 최대 12주까지 투여한 12개의 위약-및/또는 활성제-대조군 임상시험들에서 0.01% 발생률을 나타내면서 위약군에 비해 더 높게 보고된 이상반응들이다. 이상반응들은 거기에 별로 구분하고, 발현빈도는 그에 따라 나열하였다. 발생빈도는 환자 38,000명 이상의 노출에 해당하는 임상시험들에 대한 최신의 종합결과에 기초한 것이다.
- 발생빈도의 정의: 매우 흔하게는 10%, 흔하게는 1%, 10%, 흔하지 않게는 0.1%, 1%, 드물게는 0.01%, 0.01%, 매우 드물게(0.01%)

[표 1]. 성인 1일 50mg에서 800mg의 용량으로 투여한 통증 및 염증에 대한 임상시험에서의 이상반응

갑열 흔하게 흔하지 않게	기관지염, 부비강염, 상기도 감염, 요로감염 인두염, 비염
혈액 및 림프계 흔하지 않게 드물게	빈혈 혈소판감소증
면역계 흔하지 않게	알레르기 악화(과민성)
정신계 흔하게 흔하지 않게 드물게	불면증 불안 착란(착란 상태)

신경계 흔하게 흔하지 않게	여지각용 근육 긴장형진, 줄림
눈 흔하지 않게	호린시력
귀 및 미로 흔하지 않게	이명
심장 흔하지 않게 드물게	두근거림 울혈심부전, 부정맥, 빈맥
혈관 흔하게 드물게	고혈압(악화성 고혈압 포함) 홍조
호흡, 흉부 및 종격 흔하게	기침
위장관 흔하게 흔하지 않게 드물게 매우 드물게	구토, 복통, 설사, 소화불량, 고창 위궤양, 치아질환 십이지장궤양, 십도궤양 장천공, 궤양성
간담도 흔하지 않게	간효소 상승(알라닌아미노전달효소 증가 및 아스파르 테아미노전달효소 증가를 포함하는 간효소 증가)
피부 및 피하조직 흔하게 흔하지 않게 드물게 매우 드물게	가려움(전신 가려움 포함), 발진 두드러기, 반상출혈 혈관부종, 발모증 물집병진(물집피부염)
전신 및 무어부위 상태 흔하게 흔하지 않게	발초부종 빈면부종, 인플루엔자유증상(인플루엔자 유사병)
손상, 증독 및 기술적 상태 흔하지 않게	우발적 손상(손상)

- [illegible]

- 나선 시한주 조사결과
- (1) 국내에서 6년 동안 실시한 시한주 사용성적조사결과, 약과의 인과관계에 상관없이 총 5,648례 중 305례(5.40%)에서 332건의 이상응답이 보고되었고, 소혈액반이 156건(2.74%)으로 가장 많았으며, 얼굴부종 54건(0.96%), 복통 33건(0.58%), 구역 13건(0.23%), 두통 12건, 설사 12건(0.21%), 설사 10건(0.18%), 불면증 7건(0.12%) 순으로 나타났다.
- (2) 기타 이상응답으로 두통, 현기증이 각 52건(0.92%) 보고되었고, 변비, 위양성, 두드러기, 빈혈이 각 2건(0.04%), 구토, 경맥성 간담, 위염, 알레르기, 요통, 기생충증, 고지혈증, 당뇨, 체중증, 관절, 관절염, RA factor양성, 대장포진, 폐렴, 효소결핍, ALT, 상승, 난임이 각 2건(0.02%) 보고되었다.
- (3) 국내에서 시한주 사용성적조사 결과
- 시한주 경험에서 확인된 이상응답은 아래와 같다. 이들 이상응답들은 시한주 보고서에서 확인되었지만, 빈도의 평가에는 임상 시한주보고가 참고되므로, 위의 이상반응과 발생빈도는 환자 38,000명 이상 환자에서의 노출을 나타내는 임상시한주보고 통합결과를 기초로 한다.
- 빈도의 범위: 매우 흔하게(≥ 10%), 흔하게 ≥ 1%, < 1%, 흔하지 않게(≥ 0.1%, < 1%), 드물게(≥ 0.01%, < 0.1%), 매우 드물게(0.01%)
- (1) 면역계: 매우 드물게 - 아나필락시스(아나필락시스 반응)
- (2) 장신계: 드물게 - 환기
- (3) 산근계: 매우 드물게 - 뇌졸중, 무관속맥염, 미각상실, 후각상실
- (4) 눈: 흔하지 않게 - 결막염
- (5) 혈관: 매우 드물게 - 혈전증
- (6) 소화: 매우 드물게 - 위장염 - 패색전증
- (7) 위장강: 드물게 - 위양성 출혈
- (8) 감염도: 드물게 - 감염
- 매우 드물게 - 간부전, 전각강염, 간괴사, 담낭염, 담낭경색간염, 황달
- (9) 피부 및 피하조직: 드물게 - 광선성 반응
- 매우 드물게 - 괴사성-존스 증후군, 다형성반, 독성피부괴사증, 호산구증가와 전신증상을 동반한 약발진 (DRESS) 또는 괴사성 존스 증후군, 급성 전신발진성드물증(acute generalized exanthematous pustulosis, AGEP), 피부발적
- (10) 신장 및 비뇨기계: 드물게 - 급성 신부전, 자비트루증
- 매우 드물게 - 간신장질환, 신종구증, 미세변화형(minimal change disease, MCD)
- (11) 생식계 및 유방: 드물게 - 월경장애
- 알려지지 않거나 - 여성생식능력 감소
- (12) 전신 및 무부여부: 흔하지 않게 -
- ↑혈당을 재확인하고 있는 여성은 모든 임상시험에서 배제되었으므로, 이 이상반응의 빈도에 대해 임상시험자료를 참고하는 것은 적절하지 않다.

