

032219

에프벡스[®]겔

Efvex[®]gel

에프벡스[®]겔은 알코올성 기제의 제제로서 항염증 및 진통의 2중 작용을 갖고 있습니다. 피부 침투성 형태의 에스신(Aescin)과 살리실산(Salicylic acid)이 배합되어 있어 조직의 부종(부기)을 저지하고 부종(부기)의 완화에 기여하여 통증을 완화해줍니다. 염증의 진행과정을 억제하여 항염증 효과와 진통 작용을 갖습니다. 에프벡스[®]겔은 투명하고 빠르게 질한 부위 조직 속으로 침투합니다.

【원료약품 및 그 분량】 1g 중

유효성분 : 에스신(별규) 10.0mg
 살리실산디에칠아민(BP) 50.0mg
 기타 첨가제 : 네올리우, 라벤더유, 마이크로글세토스테아릴에테르, 에데트산나트륨수화물, 이소프로판올, 정제수, 카르보머934, 트로메타민, 프로필렌글리콜, L-멘톨

【성상】

방향성이 있는 투명한 무색 미황색 겔상이다.

【효능·효과】

다음 증상의 진통·소염(항염) : 타박상, 뱀, 찰주의 통증성 병변(병에 의한 몸의 변화), 혈종, 건초염(힘줄염활막염)

【용법·용량】

1일 1~수회 환부(질한 부위)에 적당량 바른다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 부위에는 사용하지 말 것.
 - 상처 또는 절막 부위
 - 방사선 치료 부위
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 부작용

드물게 알레르기성 피부 발진이 나타날 수 있다.
- 일반적 주의
 - 정해진 용법·용량을 잘 지키다.
 - 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 사용한다.
 - 3~6일간 투여 후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우 사용을 중지하고 의사 또는 약사 또는 의사와 상의한다.
- 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 넓은 부위에 장기간 사용하지 않는다. 살리실산은 피부를 통하여 과량이 흡수될 수도 있으며 중독을 일으킬 수 있다.
 - 수유기중에 유방부위에는 적용하지 않는다. 모유로 이행되나 영아의 피해는 보고되지 않았다.
- 적용상의 주의
 - 이 약은 외용으로만 사용하고 내복하지 않는다.
 - 눈에 들어가지 않도록 주의한다. 만일 눈에 들어간 경우에는 즉시 물로 씻는다. 증상이 심할 경우에는 안과 의사의 치료를 받는다.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
 - 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【포장단위】 50그램/튜브

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국약품안전관리원(<http://www.drugsafe.or.kr>) → 의약품이상사례보고에 알리도록 하십시오.

※ 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 의약품 정보 참조

※ 만일, 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되었거나 손상된 제품이 발견된 경우에는 약국 개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 교환해 드립니다.



부광메디카주식회사

제조사 : 부광약품(주) 경기도 안산시 단원구 능안로 47

제조의회사 : 부광메디카(주) 경기도 안산시 단원구 원로 63
 기동(지하층, 2층, 3층, 4층) 다동, 마동, 비동, 시동

국민 건강을 위해 꾸준히 노력해 온 저희 부광메디카는 소비자의 편의를 위해 부광메디카가 통화료를 부담하는 소비자 상담실을 운영하고 있습니다. 제품 문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 지금 전화해 주십시오.

◆ 소비자 상담실 : TEL 02-828-8291

※ 이 첨부문서 작성일자(2019년 03월 22일) 이후 변경된 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.