

【용법·용량】 성인의 경우 6시간마다 2정씩, 1일 최대 8정씩 초과하지 말 것
【저장방법】 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)
【포장단위】 자시포장단위



(01) 08806422037219

【사용상의 주의사항】

1. 경고 매일 세잔이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열제를 복용해야 하는 경우, 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이런 사람이 이 약을 복용하면 간손상 및 위장출혈이 유발될 수 있다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 행위를 하지 말 것
 이 약에는 아세트아미노펜이 함유되어 있다. 다른 아세트아미노펜 제품과 함께 복용하여 일일 최대용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용해서는 안 된다.

3. 다음 사람은 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것
 1) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 의심되는 어린이와 청소년 : 아스피린과 관련된 것으로 보고된 바 있는 레이중후군에 대하여 상의할 것.
 2) 아스피린에 알레르기 증상을 나타내거나, 천식 또는 속쓰림, 소화불량, 위통 또는 위궤양이나 출혈이 일어나는 사람

3) 임부 또는 수유부
 4) 항응고제, 당뇨병, 통풍, 관절염 치료제를 사용하고 있는 환자

4. 복용할 때 다음 사항을 주의할 것
 1) 이 약을 진통제로서 10일 이상, 해열제로서 3일 이상 연속하지 말 것
 2) 임부 : 임신기간중 마지막 3개월간은 아스피린을 사용하지 말 것

5. 복용중 또는 복용후에는 다음 사항을 주의할 것
 1) 통증이나 발열이 지속되거나 악화되는 경우 또는 그 밖의 다른 증상이 나타나는 경우, 발적 또는 부종이 나타나면, 의사·약사와 상의할 것 (치통은 치과의사와 상의)


2) 귀울림이나 청력이 감소하는 경우 의사·약사와 상의할 것
 3) 부주의로 과량복용시, 즉시 의사·약사와 상의할 것

6. 저장상의 주의사항

어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것
 ※ 본 케이스에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(<http://www.drugsafe.or.kr> → 의약품 유행시례보고)에 알리도록 하십시오.
 ※ 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의약품 정보 참조
 ※ 만일, 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되었거나 손상된 제품이 발견된 경우에는 약국 개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 교환해 드립니다.
 ※ 본 케이스의 작성일자(2015년 4월 20일)이후 변경된 내용은 홈페이지(www.bukwang.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.

블리스터포장 개봉방법

1. 절취선을 따라
 넓개로 자릅니다.



2. 화살표 부분부터
 뒷면종이를 벗겨냅니다.



제조·판매

부광약품주식회사

경기도 안산시 단원구 능안로 47

【원료약품 및 그 분량】 1정(720mg) 중

아세트아미노펜(KP)	250mg
아스피린(USP)	250mg
카페인무수물(KP)	65mg

【성상】 흰색의 정방형 필름코팅정

【효능·효과】 1) 두통, 치통, 발치(이빨 뽑음)후 통증(통증), 인후구강(구강)통, 귀의 통증, 관절통, 신경통, 요통, 근육통, 건통(어깨결림, 어깨통증), 타박통, 골절통, 염좌(삔)통증, 월경통(생리통), 외상통의 진통 2) 오후 졸고 일어나는 증상, 발열시의 해열

약효분류: 114 해열, 진통, 소염제

일반의약품

두통 전문 치료제

아카드린 정

▶ 두통에 효과적인 3가지 복합성분 진통제

10정

부광약품주식회사