



액상이라 효과 빠른 종합감기약 목살/두통/콧물/기침/가래

【성분·함량】1캡슐 중

아세트아미노펜(KP)	200.0 mg
클로르페니라민말레산염(KP)	1.25 mg
d-메틸에페드린염산염(KP)	12.50 mg
슈도에페드린염산염(USP)	15.0 mg
덱스트로메토르판브로모화수소산염수화물(KP)	8.0 mg
구아이페네신(KP)	41.60 mg
노스카핀염산염수화물(KP)	8.0 mg
참가제(KPTaCS) : 적색 40호, 청색 1호	
참가제(동물유래성분) : 젤라틴(소,가축)	

【성상】 목색의 내용물이 든 적색의 투명한 장방형 연질캡슐

【용법·용량】 만 15세 이상 및 성인 : 1일 3회, 1회 2캡슐 식후 30분에 복용

【효능·효과】 감기의 증상상(여러 증상(콧물, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 기침, 가래, 오한(흔들) 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

【사용상 주의사항】

1. 경고

1) 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람 2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 천식을 일으킨 적이 있는 사람 3) 만 3개월 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기) 4) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

진해기침을 그치게 하기(가래배출제)가래약, 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염)교염용 경구약(복용하는제, 말약, 알레르기약)

4. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

1) 이 약에는 아세트아미노펜이 함유되어 있다. 다른 아세트아미노펜 제품과 함께 복용하여 일일 최대용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용해서는 안 된다.

5. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의 할 것.

1) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(젖먹이, 갓난아기) 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이증후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의할 것) 2) 만 3개월 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기)에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경우도 만 2세 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기)· 유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 약을 복용시키지 않도록 한다. 만 2세 미만 영아(젖먹이, 갓난아기)· 유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터링해야 한다. 3) 본인, 양친 또는 형제 등이 투드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람 4) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상에 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등을 일으킨 적이 있는 사람 5) 간장질환, 신장(콩팥)질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 위십이지장염, 녹내장 : 눈의 통증, 눈이 침침한 등), 배뇨(소변을 볼)곤란 등이 있는 사람, 고령자(노인), 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람 6) 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제나 자식 혹은 재발되거나 제양, 출혈문제를 가지고 있는 사람 7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부 8) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람) 9) 다음과 같은 기침이 있는 사람 : 흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열· 발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

6. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의 할 것. 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소장할 것.

1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우 : 발진· 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 구역· 구토, 식욕부진, 변비, 부종(부기), 배뇨(소변을 볼)곤란, 목마름(지속적이거나 심함), 어지러움, 불안, 떨림, 불면 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증(심한 증상) 증상이 나타난 경우 ① 속(아니팔락시) : 복용 후 바로 투드러기, 부종(부기), 가슴 답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다. ② 피부부종(안구(눈)스티븐스-존슨 증후군), 중독성표피괴사(시용데리(열중후군)) : 고열을 동반하고, 발진· 발적(충혈되어 붉어짐), 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈(눈)에 나타날 수 있다. ③ 천식 ④ 간기능장애 : 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨)이 나타날 수 있다. ⑤ 간질성폐렴 : 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타난다. ⑥ 5 ~ 6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

7. 기타 약의 복용시 주의할 사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것 2) 장기간 계속 복용하지 말 것 3) 복용시에는 음주하지 말 것 4) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것 5) 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다.

8. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【포장단위】 10캡슐

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 24개월

【소비자상담실】 080-700-8487

【판매처】 휴메이팜 / 울산광역시 남구 남중로94번길 4

【제조자】 한국표준과학연구원 / 전북 완주군 봉동읍 완주산단9로 100

• 본 약의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입시 사용기간이 경과 되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

• 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.

• 약의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어와야 하며, 첨부문서를 약의약품과 함께 보관하십시오.

• 설명서 개정일자 이후 변경된 내용은 식약처 온라인 의약품사전(<http://drug.mds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.