

슬림에스정

일반의약품 분류번호: 399

300정

【성분·함량】 1정 중

알긴산(NF) 200mg 카르복시메틸셀룰로오스나트륨(USP) 100mg

【성상】 분홍색의 장방형 필름코팅정제 【효능·효과】 음식물 섭취 감소를 통한 체중감량의 보조요법

【용법·용량】 1일 3회 2정씩 식전에 복용하고 필요에 따라서는 취침전에 추가로 2정 복용가능하다. 충분한 양의 물과 함께 복용하는 것이 좋다. 권장량을 최소 3~4주간 복용할 것이 권장된다.

【사용상의 주의사항】 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자 3) 유·소아
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것 : 다른 약물과 상호작용을 방지하기 위해 다른 약과 동시에 복용하지 않는 것이 좋으며, 복용할 경우 30~1시간의 간격을 두고 복용하는 것이 권장된다.

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 임부 및 수유부 2) 소화기 장애 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약은 복부 팽만감, 구역, 변비 또는 설사가 발생할 수 있으며 이와 같은 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의 할 것.

2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것.

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 1) 정해진 용법 용량을 잘 지킬 것.

2) 위산 농도가 저하된 경우 이 약의 포만효과가 감소되거나 소실될 수 있다.

6. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 정해진 보관조건에서 보관하도록 하며, 유효기간이 지난 약은 복용해서는 안 된다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

* 본품을 구입할 때 사용기한이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

* 본제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

* 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
(이 문서 작성일자 이후 변경된 내용은 www.seoulpharma.com이나 (080)780-1931에서 확인할 수 있습니다.)

작성일자 : 2015.04.30

【제조사】 (주)넥스팜코리아 / 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 168-41

【제조의뢰자】 (주)서울제약 / 경기도 시흥시 경제로 59



마음까지 건강하게

(주)서울제약

PM.103367(00)



(01)08806529037518

제조번호:

사용기한: