



【성분·함량】1정 중

리보플라빈(B ₂)	100.0 mg
니코틴아미드(B ₃)	100.0 mg
판토텐산칼슘(B ₅)	108.7 mg
피리독신염산염(B ₆)	100.0 mg
몰신(B ₁₂)	100.0 µg
콜린타르타르산염(B ₄)	100.0 mg
이노시톨(B ₇)	100.0 mg
비오틴(B ₈)	100.0 µg
신화아연(아연으로서 25 mg)(B ₉)	31.20 mg
제파아스코르비네(아스코르비산으로서 95.96 mg)(비타민 C)	100.0 mg
시아노코발라민 1000배산(시아노코발라민으로서 100 µg)(B ₁₂)	100.0 mg
티아민질산염(B ₁)	95.0 mg
푸르셀타이민(B ₂)	5.0 mg
γ-오리자놀(B ₂)	10.0 mg
신화마그네슘(마그네슘으로서 12 mg)(B ₄)	20.0 mg
유비대카르비(B ₁)	2.0 mg
참가제(동물유래성분): 유당수화물(소, 우유)	
참가제(KPtaCS): 청색호 작사제1호 황색203호	

【성상】갈색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】

1. 다음경우의 비타민(B₁, B₂, B₆, C)의 보급

- 육체피로
- 임신·수유기
- 병중·병후병을 앓는 동안이나 회복 후의 체력저하

2. 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(허리통, 건통(어깨결림, 어깨통증) 등), 각기, 눈의 피로, 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 살염(혀염), 습진, 피부염

3. 아연의 보급

【용법·용량】

만 12세 이상 및 성인: 1일 1회 1정 식후 복용

【사용상 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 만 12개월 미만어 젓아이
- 3) 심한 증상의 산부전 환자
- 4) 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(Galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp Lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것

- 1) 인산염, 칼슘염, 구리(구리)는 복용하는 동안 티트라시이클린계 제제, 제산제
- 2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 1) 의사와 치료를 받고 있는 환자
- 2) 고요산산증 환자(hyperoxaluria): 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태
- 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 마약, 유아
- 4) 심장·순환기계기능 장애 환자

5. 신장(콩팥)장애 환자

6. 저단백혈증 환자

7. 등통 환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자

8. 임부

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉시 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상급 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우

구역, 구토, 설사, 묽은 변, 구내염(입안염), 식욕부진, 복부(배부분)팽만감, 붉은 반점, 부전수축(상장벽동장지), 중추신경계 기능저하, 위장관장애, 소화장애, 상복부(배부분)통증, 저혈압, 폐부종

2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.

3) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy): 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화가 나타날 수 있다.

4) 몰신이 부족한 환자(예)에 비타민 B₁₂를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.

5) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment): 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애, 고요산혈증(hyperoxaluria), 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태, 간손상을 일으킬 수 있다.

6) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 과나트륨혈증(hyponatremia): 혈액중에 나트륨이 과잉으로 존재하는 상태, 울혈성부전(CF: 심장기능 저하로 신체조직이나 기관에 혈액을 공급할 수 없는 상태, 부종(붓기) 등)의 증상이 나타날 수 있다.

7) 혈액도스트로제, 트리암테렌과 병용(함께 복용)두어 신장기능장애(hyperkalemia): 혈액중에 칼륨이 과잉으로 존재하는 상태를 일으킬 수 있으므로 주의할 것

8) 우발적으로 과량복용 한 경우

9) 1개월 정도 복용하더라도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

2) 각종 요점사시에 혈당의 감소를 방해할 수 있다.

3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사시에 영향을 줄 수 있다.

4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것

2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.

3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】제조일로부터 30개월

【포장단위】120정, 60정

【소비자상담실】080-6776-080(수선자 부동)

【제조자】한국프림제약(주) / 전북 완주군 봉동읍 완주산단로 100

본 약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구별 사용기간에 경과 되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

본 제품은 공정거래위원회 고시 소비재 환경예결 기준에 의거, 정당한 소비재 하폐기 대에 보상해드립니다.

의약품은 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어 주며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

상당시 개정법제 이후 변경된 내용은 약국(약국)의 의약품정보(http://drug.mfds.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

개정일자: 2015. 12. 10