GC녹십자

급성·만성통증에 효과빠른~

멀티펜

카타플라스마

펠비낙 (Felbinac)

근육통/관절통/어깨결림

카모마일향 함유

일체형 습포제

6 매입

8 806436 051119

뜯어내세요

자세한 사용법은 동봉된 설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.

자세한 사용법은 동봉된 설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.

뜯어내세요

급성·만성통증에 효과빠른~

멀티펜

카타플라스마

펠비낙 (Felbinac)

일반의약품

분류번호 264

일반의약품 정보

[유효성분] 1매 (8 X 12㎠, 6.8g) 중

펠비낙(INN) ..... 48 mg

[효능·효과]

다음 질환 및 증상의 진통·소염(항염) : 퇴행성관절염(골관절염), 어깨관절주위염, 견(함)증, 건초염(함)출혈(함)염, 견(함)출주위염, 상완골위염(테니스 엘보우 등), 근육통, 외상(상처)후의 종창(부기), 동통(통증)

[용법·용량]

약면의 비리(벗겨내기, 벗겨짐)지를 떼어낸 후 1회 1매를 1일 2회 환부(질환 부위)에 붙이십시오.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

1) 이 약 이 약 성분 및 기타의 펠비낙제제에 과민증의 병력이 있는 환자

2) 아스피린 또는 기타의 비스테로이드성 소염(항염)진통제에 천식(비스테로이드성 소염(항염)진통제 등에 의한 천식 발작을 유발) 또는 그 병력이 있는 환자(천식 발작을 일으킬 수 있습니다)

3) 아스피린 또는 기타의 비스테로이드성 소염(항염)진통제에 대한 두드러기 또는 급성 비염(코염)의 병력이 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

기관지 천식 환자(천식발작을 일으킬 수 있습니다)

3. 부작용(이상반응)

때때로 가려움, 홍반(붉은 반점), 발적(충혈되어 붉어짐), 피부염(발진, 습진), 접촉피부염, 드물게 자극감 또는 수포 등이 나타날 수 있습니다. 이러한 증상이 심하게 나타날 경우에는 사용을 중지하십시오.

4. 일반적주의

1) 소염(항염)진통제에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법(증상별로 치료하는 방법)잔에 유의하십시오.

2) 피부감염증을 불완전(충분)하게 치료하지 않게 시킬 수 있으므로 감염을 수반 하는 질환에 사용하는 경우에는 적절한 항균제 또는 항진균제를 병용(함께 복용(사용))하고 충분히 관찰하여 사용히 투여하십시오.

3) 만성질환(퇴행성관절염(골관절염)) 등에 사용하는 경우에는 약물요법 이외의 요법도 고려하십시오. 또한 환자의 상태를 충분히 관찰하여 부작용 발현(드러남, 드러나 보임)에 유의하십시오.

5. 임부 및 수유부에 대한 투여

1) 동물의 생식실험 결과 임신 후반기에 이 약의 사용시 다른 비스테로이드성 소염(항염)제에서와 같은 난산 및 분만지연 등이 관찰되었습니다.

2) 임부 및 수유부에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부에는 투여하지 않습니다.

6. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않습니다(사용경험이 적습니다).

7. 적용상의 주의

1) 손상피부 및 점막에 사용하지 않습니다, 2) 습진 또는 발진 부위에 사용하지 않습니다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

[포장단위] 6매

[사용기한] 제품 뒷면 하단 표시일까지

[첨가제] •청가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸(KP) 6.8mg, 파라옥시벤조산프로필(KP) 3.4mg
•청가제(용매제,용제) : 젤리린(소, 내피) •기타 청가제 : L-캔톨, N-메틸피롤리돈, 건조수산화칼륨(이물), 로지세린, 나가졸 TS-20D, 다부틸이드록시톨루엔, 밀랍성, 부직포, 산화티탄, 소르비탄세스퀴올레이트, 실리코나이즈드콜리에스테르에이크, 에르드산, 트롤라솔레올, 정제수, 조합형(가드라이)인, 카르복시메틸셀룰로오즈나트륨, 가돌린, 타르타르산, 폴리바닐알코올, 폴리소르베이트80, 폴리아크릴산나트륨, 폴리에틸렌글리콜400

[성상] 흰색의 점착성 고체를 부직포상에 도포한 방향을 가진 카타플라스마제로서 밀폐포가 접합되어 있습니다.

이 내용은 소비자의 안전한 선택을 위해 허가사항을 요약한 것으로 사용 전 반드시 포장의 기재사항을 확인하십시오.

※ 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

※ 이 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 따라 소비자의 정당한 피해는 보상 받을 수 있습니다. 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변패, 오염, 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 상기표기 사항 중 작성일자(2018년 5월 3일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.greencross.com)나 소비자상담실(080-260-0033)로 문의하시기 바랍니다.

[안전한 사용방법]
- 사용 전에 상세사를 상세히 읽어 보시고 효능, 효과상에 기재된 용도 이외에 임의대로 제품을 부착하지 마십시오.
- 침출부위를 깨끗이 하고 건조상태에서 부착하십시오.
- 목과 같이 연약한 부위나 피부 또는 모발이 많은 부위에 부착한 경우에는 미온수로 적당히 불려서 떼어 내십시오.
- 피부 일러지 방지를 위하여 동일부위에 연속적으로 사용하는 것은 피해주시고 가려움증이나 발적 발진이 나타날 경우 사용을 중지하고, 환부를 호르는 찬물에 담가 주십시오.
- 사우나, 온천장 전후에는 피부각질이 약해지고 내피가 손상되기 쉬우므로 본 제품 부착시 주의하십시오.
- 피부에 이상 증상이 생겼을 때에는 광기나 손대지 말고 즉시 의사 또는 약사와 상담하십시오.

제조판매자

GC녹십자

[주]녹십자
충북 음성군 금왕읍 무극로65번길 26
TEL. 031)260-9300
소비자상담실 TEL. 080-260-0033 호일-10-0026-4

비닐류 OTHER

제조번호

사용기한

(01)08806436051119