

치질로 인한 통증, 출혈, 가려움에 효과적인

푸레파에이 좌제

SUPPOSITORIES

일반의약품

분류번호

256
(치질용제)

원료약품의 분량(1개 중)

리도카인(KP)	60.0mg
알란토인(USP)	20.0mg
테트라히드로졸린염산염(USP)	1.0mg
클로르헥시딘염산염(KP)	5.0mg

성상

흰색 내지 미황색의 포탄형 좌제

효능·효과

치열·치핵의 아픔·가려움·부종(부기)·출혈의 일시적 완화

용법·용량

성인(만 15세 이상)에 1회 1개, 1일 3회의 범위 내에서 직장내에 삽입합니다.

사용상의 주의사항

이 약을 사용하시기 전에 아래의 주의사항을 잘 읽어보신 후 사용하시기 바랍니다.

- 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 마십시오.
 - 심장질환, 고혈압, 갑상선질환, 당뇨병, 전립샘비대증으로 인한 배뇨곤란 환자
- 이 약을 사용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 마십시오.
 - 혈압강하제, 항우울약
- 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
 - 이 약 사용에 의해 충혈되어 붉어짐, 부종(부기), 자극감 등의 증상이 나타날 경우
 - 이 약 사용에 의해 알레르기 증상(발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움 등)이 나타날 경우
 - 7일정도 사용하여도 증상의 개선이 나타나지 않을 경우
 - 출혈이 있는 경우
- 기타 이 약의 사용시 주의사항
 - 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
 - 어린이에게는 사용하지 마십시오.
 - 이 약이 무르게 된 경우에는 잠시 냉각시킨 후에 사용하며 또한 지나치게 단단해진 경우에는 무르게 한 후 사용합니다.
 - 이 약은 직장에만 사용하고 내복용으로는 사용하지 마십시오.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 좌제는 체온으로 녹기 쉽도록 제조되어 있기 때문에 직사광선이나 온도가 높은 곳을 피하여 서늘한 곳에 보관하십시오.

저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위

12개


좌제 사용법

(취침전 사용이 좋고 낮동안 사용하는 경우에는 배변 후에 사용합니다.)


1. 사용 전 항문 주위를 청결히 하고, 부드러운 티슈로 물기를 없앱니다.
2. 연결된 좌제 중 하나를 떼어내어 그림과 같이 등근 부분이 나오도록 벗겨줍니다.
3. 항문에 넣기 쉬운 자세를 취하고, 등근 부분이 위로 올라오도록 좌제를 잡고 항문 안으로 넣습니다.
4. 삽입 후 밀려 나오지 않도록 항문을 눌러 준 후 20~30분간 움직이지 않습니다.



(그림1)



(그림2)



(그림3)

- 이 제품은 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.
- 설명서는 2015년 11월 13일자로 작성되었으며, 이후로 변경된 내용을 홈페이지 (www.ildong.com)에서 확인하실 수 있습니다.

제조사 :

(주)씨트리

경기도 남양주시 경강로 27

제조의뢰자 :

일동제약주식회사

본사: 서울특별시 서초구 바우포로27길 2

공장: 경기도 안성시 공단1로 25

소비자상담실 : (전화)080-022-1010