

근이완제 · 근육통증 전문치료제

클로스펜® 정

※ 사용 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

유효성분 : 아세트아미노펜(KP) 300mg
 클로르록사존(KP) 250mg
 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 저치함도히드록시프로필셀룰로오스, 크로스포비돈, 포비돈, 히드록시프로필셀룰로오스

【성상】 흰색의 타원형 정제

【효능·효과】

신경통, 근육통, 관절통, 요통, 염좌(삔)통, 건통(어깨통증), 근경련(근육경련), 근경직 등 근육의 이상 긴장을 수반하는 제 질환(여러질환)

【용법·용량】

성인 : 1회 2정, 1일 4회까지 공복 시를 피하여 복용한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다.
 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간 손상 및 위장출혈이 유발될 수 있다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 행위를 하지 말 것

이 약에는 아세트아미노펜이 함유되어 있다. 다른 아세트아미노펜 제품과 함께 복용하여 일일 최대용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용해서는 안 된다.

3. 다음 환자에게 투여하지 말 것

- 1) 클로르록사존에 과민증 환자
- 2) 아세트아미노펜에 과민증 환자

4. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 1) 심한 간, 신장에 환자
- 2) 알레르기 환자 또는 약물 알레르기가 있었던 환자

5. 부작용

- 1) 과민증 : 두드러기, 발적, 가려움증과 같은 과민증이 나타나면 투여를 중지한다. 드물게 알레르기성 피부발진, 점상출혈, 반상출혈, 요변색 등이 나타날 수 있다. 매우 드물게 혈관신경성 부종 또는 아나필락시스 증상이 나타날 수 있다.
- 2) 간 장 : 클로르록사존에 의해 간 손상이 나타날 수 있으므로 간 기능 이상이 나타나면 투여를 중지한다.
- 3) 소화기 : 때때로 위장장애가 나타날 수 있으며 드물게 위장출혈이 나타날 수 있다.

4) 정신신경계 : 때때로 졸음, 어지러움, 두통, 권태, 과도한 흥분이 나타날 수 있다.

6. 임부에 대한 투여

임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우 투여한다.

7. 상호작용

알코올이나 중추신경억제제와 병용투여 시 삼기작용이 나타나므로 신중히 투여한다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 10정/PTP

(이 포장은 어린이보호용 안전포장입니다)

※ 안전포장 사용방법 ※



어린이 안전용기 포장으로 강하게 눌러주세요.

※ 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(<http://www.drugsafe.or.kr> → 의약품유해사례보고)에 알리도록 하십시오.

※ 온라인의약품서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의약품 정보 참조

※ 만일, 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되었거나 손상된 제품이 발견된 경우에는 약국 개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 교환해 드립니다.

부광약품주식회사

제조회자 : 부광약품(주) 경기도 안산시 단원구 능안로 47

제조자 : 콜이파미(주) 충북 제천시 바이오펀리2로 93

국민 건강을 위해 꾸준히 노력해 온 저희 부광약품은 소비자의 편의를 위해 부광약품이 통화료를 부담하는 소비자 상담실을 운영하고 있습니다. 제품문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 지금 전화해 주십시오.

☛ 소비자 상담실 : TEL 080-933-2233 <http://www.bukwang.co.kr>

※이 첨부문서 작성일자(2018년 01월 08일)이후 변경된 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.