

전문 의학 용
분류번호 113

레비탐^정
250mg/500mg/1000mg
(레비티라세탐)

 **CELTRION** (주) 셀트리온

전문 의학 용
분류번호 113

레비탐 정 250mg/500mg/1000mg (레비티라세탐)

【성분·함량】 1회 용	
레비탐 10250mg 에 약 1회 용	
레비티라세탐 10.25g	250.00 mg
헥사하이드로테오 소프 2호 일수미늘레아크	
레비탐 3500mg 에 약 1회 용	
레비티라세탐 35.00g	500 mg
레비탐 10000mg 에 약 1회 용	
레비티라세탐 100.00g	1000.00 mg

【용법·용량】	
레비탐 정 250mg : 정맥외 투여용, 일일복합정	
레비탐 정 500mg : 노인세와 비특정 일일복합정	
레비탐 정 1000mg : 한세외 투여용, 일일복합정	

【용법·용량】

1. 투약요법
 - 처음 간질로 진단된 2차성 전신발작을 동반하거나 동반하지 않는 부분발작의 치료(16세 이상)
2. 부가요법
 - 기존 1차 간질치료제 투여로 조절되지 조절이 되지 않는 2차성 전신발작을 동반하거나 동반하지 않는 부분발작의 치(16세 이상)
 - 소아 간대성 근전성 간질(Juvenile Myoclonic Epilepsy/원자)의 근간대성 발작의 치료(12세 이상)
 - 특정성 전신성 간질(Genetic Generalized Epilepsy) 환자(1차성 전신 경작-간대 발작의 치료(12세 이상)
 - 레비티라세탐 투여하는 경우투여가 일시적으로 불가용한 환자에 투여한다.

【유형·유량】

일일복합정제와 액제는 경우투여 하에 식사와 관계없이 투여할 수 있고, 충분한 양의 물과 함께 복용한다.
1회 용량은 1회 2회 균등한 용량으로 나누어 투여한다.
레비탐/가시돌 치료는 일제 또는 경우 투여로 시작할 수 있다.
경구에서 정맥 또는 그 반대로 투여경로를 바꾸는 경우, 용량 조절 없이 바로 투여할 수 없으며, 1회 용 투여할 및 투여횟수는 동일하게 유지하여야 한다.

단독요법
성인 16세 이상의 청소년
초환발은 1회 2회, 1회 250mg으로 시작하여, 2주 후 1회 2회 1회 500mg으로 용량 투여하도록 한다.
입상적 반응에 따라, 2주마다 1회 500mg(1회 250mg, 1회 2회까지 용량할 수 있으며, 최대투여량은 1회 3000mg(1회 2회, 1회 500mg)이다.

1. 부분발작
성인(18세 이상) 및 제용이 50kg이상인 청소년(12~17세)
이 약은 1회 2회, 1회 100mg으로 투여를 시작한다.
입상적 반응과 내약성에 따라, 2주 내지 4주마다 1회 1000mg(1회 500mg, 1회 2회까지 용량)으로 용량할 수 있으며, 최대일일용량은 1회 3000mg이다.
4세~11세의 소아 및 제용이 50kg 미만인 12~17세의 청소년
초환발은 1회 2회, 1회 10mg/kg으로 시작한다.
입상적 반응과 내약성에 따라 1회 60mg/kg(1회 30mg/kg, 1회 2회)까지 용량할 수 있으며 용량변경은 2주마다 1회 20mg/kg(1회 10mg/kg, 1회 2회) 초과하여 용량 혹은 간격(투여)을 한다.
유량과 투여 발할량 복용한다.
처음이 50kg 이상인 소아의 용량은 보인 용량과 같다.
소아와 청소년을 위한 주의사항은 아래 표와 같다.

	1회 용량		
제용	20mg/kg/회 (1회 2회)	40mg/kg/회 (1회 2회)	60mg/kg/회 (1회 2회)
15~20kg ¹⁾	300mg~400mg/회 (1회 1회 150~200mg씩 1회 2회)	600mg~800mg/회 (1회 300~400mg씩 1회 2회)	900mg~1200mg/회 (1회 450~600mg씩 1회 2회)
20.1~40kg	500mg/회 (1회 250mg, 1회 2회)	1,000mg/회 (1회 500mg, 1회 2회)	1,500mg/회 (1회 750mg, 1회 2회)
40.1~50kg ²⁾	1,000mg/회 (1회 500mg, 1회 2회)	2,000mg/회 (1회 1,000mg, 1회 2회)	3,000mg/회 (1회 1,500mg, 1회 2회)

- ¹⁾ 제용이 20kg 이하인 소아의 경우, 100mg/mL 용량을 시작하는 것이 권장된다.
²⁾ 제용이 50kg 이상인 소아와 청소년의 용법 용량은 성인과 동일하다.
- 소아 환자에서의 근간대성 발작(12세 이상)
이 약은 1회 2회, 1회 300mg으로 투여를 시작한다.
용량은 2주 마다 1회 1,000mg씩 용량하여 용량 1회 용량인 3,000mg 까지 용량한다.
1회 3,000mg 마만의 용량에서 유효성능은 연구되지 않았다.
- 1차성 전신 경작-간대 발작(12세 이상)
성인(18세 이상) 및 제용이 50kg이상인 청소년(12~17세)
이 약은 1회 2회 1회 100mg으로 투여를 시작한다.
용량은 2주 마다 1회 1,000mg(1회 500mg, 1회 2회)씩 용량하여 용량 1회 용량인 3,000mg(1회 1,500mg, 1회 2회)까지 용량한다.
1회 3,000mg 마만의 용량에서 유효성능은 조절해 연구되지 않았다.
제용이 50kg 미만인 12~17세의 청소년
이 약은 1회 2회 1회 10mg/kg, 1회 10mg/kg, 1회 2회)으로 투여를 시작한다.
용량은 2주 마다 1회 20mg/kg(1회 10mg/kg, 1회 2회)까지 용량하여 용량 1회 용량인 60mg/kg(1회 30mg/kg, 1회 2회)까지 용량한다.
1회 60mg/kg 2회의 용량에서 유효성능은 조절해 연구되지 않았다.
- 간대성 환자
레비티라세탐 정소음이 생기능과 관련되어 있으므로 환자의 신장기능에 따라 개별적으로 투여한다.
성인에서의 용량조절은 아래 표를 참조한다.
표를 이용하여 환자사 환자의 크레아티닌(Cr_{CL}, μmol/L)이 필요하면 성인에서는 아래 공식을 이용하여 일일복 제티라세탐(mg/회) 수치로부터 용량 수 있다.

$$Cr_{CL} = \frac{(140 - 나이(연령)) \times 제용(kg)}{72} \times \text{헥사하이드로테오(mg/회)} \quad (1 \times 0.85 \text{ 여성의 경우})$$

크레아티닌 청소율 (ml/min)	1회 용량	용 량
정상	180	500~1,000mg
정상	50~80	600~1,000mg
중등증	30~50	250~750mg
중등증	30	250~500mg
일기신장률무신장환자 ³⁾	500~1,000mg	1회 1회 ⁴⁾

¹⁾ 투여 첫첫째에는 초기투여용량 750mg의 투여가 권장된다.

²⁾ 투여 후, 250~500mg의 추가용량 투여가 권장된다.

나이, 소아 및 청소년은 아래 표식을 사용한다

$$Cr_{CL} = \frac{(140 - 나이(연령)) \times 제용(kg)}{72} \times \text{헥사하이드로테오(mg/회)}$$

$$kg: 0.45 (14세)인 경우 : kg: 0.56 (13세)인 소아 및 청소년 여성) kg: 0.7 (청소년 남성)$$

크레아티닌 청소율 (ml/min/1.73m ²)	1회 용량 및 용법
정상	180
정상	50~80
중등증	30~50
중등증	30
일기신장률무신장환자 ³⁾	500~1,000mg

¹⁾ 투여 첫첫째에는 초기투여용량 750mg의 투여가 권장된다.
²⁾ 투여 후, 5~10mg/kg(0.05~0.10mg/kg)의 추가용량 투여가 권장된다.

- 간대성 환자
경증에서 중등증의 간대성 환자는 용량조절이 필요치 않다.
중증의 간대성 환자(경우, 크레아티닌 청소율은 신부전을 예상할가능 수 있다.
따라서 크레아티닌 청소율이 60mL/min/1.73m² 미만일 경우 1회 용량(용량)을 50% 감량하는 것이 좋다.

- 소아
경구용 제제는 연상성과 유효성 자료를 기준으로 분류함으로써 1개월 미만의 영아에게 권장되지 않는다.
4세 이하의 소아에게서 용량 투여는 적용되지 않으며, 1개월 이상인 영아에서는 용량을 투여하여야 한다.
주사제는 4세 6개월의 소아에 대해 안전성·유효성이 확립되지 않았으므로 투여가 권장되지 않는다.
- 노인(65세 이상)
신기능이 약화된 노인 환자에서 용량조절이 권장된다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고
 - 1) 자살충동과 자살행위
환간질약을 복용한 환자에서 자살충동 또는 자살행동을 보이는 위험성이 증가되므로 환간질약을 치료받은 환자는 자살충동 또는 자살행동, 우울증의 발현 또는 악화 및 기분과 행동과 비정상적 변화에 대하여 모니터링되어야 한다.
환간질약을 처방받는 간질과 다른 질환의 병행은 그 자체가 위험 및 사망, 치료기간 동안의 자살충동과 자살행동의 위험성을 증가시킬 수 있다.
따라서, 처방자는 환간질약 처방시 환자가 치료기간 동안 자살충동 또는 자살행동과 치료 및 질병감에 관련성 유무 및 이 약의 유효성을 함께 고려한다.
2. 신장질환과제 이상반응
부분발작
성인 - 이 약은 1. 통풍, 피로, 2. 혈중요소증, 3. 알콜이성 등의 중추신경계 이상반응을 발생시킨다.
통풍, 무릎 통증, 혈중요소증에는 이 약 투여 후 첫 4주 이내에 가장 빈번히 발생하였다.
소아 - 레비티라세탐정을 투여한 소아환자에 있어, 이 약은 통풍, 피로, 통풍이상을 나타내었다.
1차성 전신 경작-간대 발작
이 약은 1차성 전신 경작-간대발작이 있는 6세 이상의 환자에서 항통학적 징후와 관련이 없었다.
3. 투약 주의사항
이 약을 포함한 간질치료제는 발작 빈도가 증가되는 잠재성을 최소화하기 위해 철저적으로 중단하여야 한다.
이 약 투여를 중단하는 경우, 성인 및 제용이 50kg이상인 청소년은 500mg을 1회 2회 2~4주마다 단계적으로 줄여나간다.
소아의 경우, 용량 감소는 매 2주마다 1회 2회 10mg/kg를 초과해서는 안된다.

2. 다음 환자에는 투여하지 않 것
 - 1) 이 약의 투여성이나 다른 약물과의 유독도 또는 다른 구성성분에 과민 반응이 있는 환자
3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
 - 1) 레비티라세탐을 투여한 환자는 자살, 자살 시도 및 자살 상상이 보고되었다.
우울 및/또는 자살 상상이 중상이 있는 경우 환자에서 자살 보고하도록 환자에게 권고해야 한다.
 - 2) 신장에 환자에서 이 약을 투여하는 경우 용량 조절이 필요할 수 있다.
중증의 간대성 환자에서는 용량 선택 전에 신기능 감시기 관찰과(내용량용량) 절조.
4. 이상반응
1) 항간질약을 치료받은 환자는 자살충동 또는 자살행동, 우울증의 발현 또는 악화 및 기분과 행동의 비정상적 변화를 보인다.
1. 통풍의 다른 항간질약을 사용하여 130명의 환자(대조 임상 시험)간대발작을 투여한 결과 환간질약 복용환자는 투여 투여환자와 비교하여 악화의 자살충동 또는 자살행동의 위험을 보였다.
12주의 치료기간 동안 자살행동 또는 자살충동 발생률은 27.85%에서 환간질약 치료환자에서 0.43%였으며 16.03%의 환자 투여 환자에게는 0.24%였다.
여는 치료받은 530명 환자 중 17명은 자살 충동 또는 자살 행동을 보인 것을 의미한다.
통 약을 투여 환자에게서 3건의 자살이 있었고 학위 자료 환자에서의 자살은 없었다.
그러나, 자살 예후가 14부 적이 이 약의 자살과 연관성을 결론지을 수는 없다.
환간질약 복용에 악한 자살충동 또는 자살행동의 위험증가는 약물치료를 시작 초기 2주에 관찰되었고 치료기간 동안 지속되었다.
대부분의 임상시험은 24주 이상을 초과할 수 없었으며 24주를 초과한 자살충동 또는 자살행동에 위험은 평가할 수 없었다.
자살충동 또는 자살행동 위험은 분석된 11명의 환간질약에서 일관적이었다.
다 양한 약물(가)가 사용됨을 가진 환간질약에서의 위험성 증가는 어떤 효능으로도 사용된 모든 환간질약에 대해서도 독립없이 일관되어 나타났다.
그 위험성은 분석은 임상시험에서 연령5~100세에 따라 차이가 나지는 않았다.
- 2) 신장질환과제 이상반응
(1) 부분발작
성인
통풍, 피로: 레비티라세탐에서 이 약을 투여한 성인환자는 14.8%, 위약투여환자는 8.4%에서 통풍이 보고되었다.
3000mg/day까지 용량변화는 경화하지 않다.
용량을 적정하지 않은 임상시험에서 이약 4,000mg/day를 투여한 환자들의 46%가 통풍을 나타내었으며, 0.3%가 통풍으로 심각한 이상반응을 나타내었다.
통풍 때문에 약물투여를 중단한 환자는 3%였으며 투여용량을 감소한 환자는 1.4%였다.(위약군 각각 0.7%, 0.3%)
레비티라세탐 투여환자 중 0.7%는 통풍 때문에 입원했다.
크레아티닌 청소율 조절가능 부분발작 일한 간질 환자를 대상으로 이 약을 투여한 대조 3상 임상시험(1003 결과, 통풍의 발병빈도는 36.0%(363/1003)은 용량은 다자적으로 신장적 효과의 비례적 감시(18~15에서 보고된 발현률(18.9%)보다 유의하게 높았다.
또한 레비티라세탐정 투여군의 14.7%, 위약군의 9.1%에서 투여중이 보고되었으며, 각각 0.3%, 0.5%가 투여중으로 사함을 중단했으며, 용량을 감소한 환자는 각각 0.5%와 0.7%였다.

혈중요소증: 이 약 투여환자의 중 1.4%가 운동실조증, 비정상적 보행, 혈중요소증일지 등의 혈중요소증증세를 경험한(위약군 1.6%, 위약대조시험에서 레비티라세탐정 투여환자의 중 0.4%가 운동실조증 때유한 약물투여를 중지한다.(위약군 0.7%, 레비티라세탐정 투여군은 0.7%, 위약투여군은 0.7%였다.
혈중요소증 증세에 대응해 용량을 감소했다.
이 약 투여환자 중 1명만 기원의 운동실조증이 악화되어 입원했다.
혈중요소: 레비티라세탐에서 감시(1명)의 통풍을 경험한 환자는 레비티라세탐정 투여군 0.7%, 위약군 0.2%였으며, 레비티라세탐정 투여환자 중 2개(0.3%)이 입원했고, 약물투여를 중지했다.
정신과적 관련한 2개 이상반응은 9명뿐 두 첫 주 내에 발생하였고, 약물 중추 1~2주내에 사라졌다.
통과와 관련된 2개 다른 이상반응은 1~5개월 후에 발생했고, 약물투여를 중지하는 첫한 2~7일 내에 해결되었다.
정신학적 우울증을 경험한 환자 1명은 1개월 내에 발생하였고, 약물 투여하는 동안 45일 내에 해결되었다.

레비티라세탐정 투여환자의 중 13.3%가 공격, 초조, 분노, 불안, 감정둔다, 미안증, 우울, 신경적 불안정성, 적개심, 과민성 등 정서적 증상을 경험했다(위약군 6.2%)
이러한 환자는 12주이후 첫 4주 이내에 마약 같은 (위약) 용을 보고했다.
레비티라세탐정 투여환자 중 1.7%가 약물투여를 중지했고, 0.8%가 용량을 감소하였다(위약군 각각 0.3%와 0.5%)

0.2%, 0.5%)
레비티라세탐정 투여환자 중 중 0.8%가 심각한 행동적 이상반응을 나타내어 입원하였다(위약군 0.2%)
레비티라세탐정 투여환자 중 49.5(5.5%)이 자살을 시도했으나(위약군 0%), 이 환자들 중 1명이 자살하였고 나가지 3명이 통자는 이상반응 때문에 약물을 중단하거나 용량을 감소하지 않았다.
이 이상반응은 환자가 40세에서 6개월 동안 치료받은 후에 발생하였다.

- 소아

통풍, 피로: 소아를 대상으로 한 이중 맹검, 위약대조시험에서 이 약을 투여한 소아 환자는 22.8%, 위약투여환자는 11.3%에서 통풍이 보고되었다.
중 감시(1명)이 실제되는 통풍-반응 초과를 경험하지 평가할 수 없었다.
통풍으로 인해 치료를 중단한 예는 없었으나 이 약 투여 소아환자의 약 3.0% 및 위약 투여환자 3.1%에서 통풍으로 인해 용량이 감소했다.

우울증: 이 약을 투여한 소아환자 8.9%에서, 위약투여 환자 3.1%에서 우울증이 보고되었다.
우울증으로 치료를 중단한 환자는 없었으나 이 약 투여 소아의 통자의 3.0% 및 약의 투여환자 0%에서 우울증으로 인해 용량이 감소되었다.

혈중요소: 레비티라세탐정 투여환자의 중 37.8%가 초조, 불안, 감정둔마, 미안증, 우울, 감정적 불안정성, 적개심, 운동과다증, 우울, 입원증, 무복합, 위장장애 등 행동 증상을 경험했다(위약군 16.8%), 레비티라세탐정 투여환자 중 1명 이 자살관심을 경험했다.

	미 약 투여군	위약투여군
악화실	11.9%	6.2%
신경과민	9.9%	2.1%
우울	3.0%	1.0%

정신적 및 비정신적 이상반응으로 인해 이 약 투여환자 중 중 3.0%, 위약투여환자 4.1%가 치료를 중단했다.
이 약 투여환자 10.3%, 위약투여환자 8.2%가 중단 또는 용량감소와 관련된 행동 증상을 경험했다.

(2) 비정 전신 경작-간대 발작

1차성 전신 경작-간대발작이 있는 특정성 전신 간질환자를 대상으로 한 이중맹검, 대조시험에서 통풍(amblyopia)이 가장 흔하게 보고된 증상적 이상반응이었으며 위약을 투여한 환자와 2.4%의 비교하여 이 약을 투여 환자에게는 5.3%로 발생하였다.
또한 비정상성의 행동장애(비정상적인 행동, 충동, 공격성, 행동 장애 및 충동성으로 보고된)가 위약을 투여한 환자에서는 3.6%로 보고되었으나 이 약을 투여한 환자에서는 11.4%로 나타났다.
이 약을 투여하고 비정상성의 행동장애를 나타낸 환자 중 한명이 공격성으로 인하여 입원되었다.
비정상성의 기분장애(짜증, 무관심, 우울, 기분 변화, 기분 중요, 거부감, 자살 관련, 슬픈 감정으로 보고됨)이 위약 투여군에서는 8.3%로 보고되었지만 이 약 투여군에서는 12.7%로 나타났다.
이러한 이상반응으로 인하여 이 약의 투약을 중단하거나 감량한 환자는 없었다.
이 약을 투여한 환자 1명에서 자살 관련이 나타났다.
환자 1명에서 이 약의 용량을 줄이는 것이 필요로한 정도의 양상에 통풍이 나타났다.

비정상성의 행동장애가 수면되는 다양한 형태의 일화성 전신 간질 환자를 대상으로 한 장기간, 공개시험에서 102명 중 2명의 환자에게서 형상분과 유사한 행동이 나타났다.
그 중 한 증례에서 환자와 자살 생각이 특이한 행동장애가 나타나서 이 약의 투여를 중지하였다.
다른 증례에서는 기차실용인 정신분열병이 악화되었고 이로 인하여 약물투여를 중단하라는 입었다.

3) 임상시험에서 보고된 유해사례

레비티라세탐은 3,000명 이상의 마취가 될 환자 투여되었다.
1,023명의 간질환자가 대조 임상연구에 참여하였다.
연구적으로 성인 부분발작환자를 대상으로 실시한 임상시험으로부터 얻은 통풍 이상성 자료에 의하면, 이 약을 투여한 46.4%환자(42.2%에서 이상반응을 경험하였다), 중대한 이상반응은 이 약을 투여한 2.9%환자(2.0%에서 나타남)에 가장 빈번하게 보고된 이상반응은 통풍, 우울증 및 어지러움이었다.
통풍 안전성 분석에서, 경증의 용량-반응관계는 없었다.
그러나 이상반응과 관련된 중추신경계의 증상은 일 중증도는 시간이 지남에 따라 감소하였다.

- 이 약이 단독요법시 환자가 45.8%가 적어도 한가지의 약물과 관련된 이상반응을 경험하였다.
가장 빈번하게 보고된 이상반응은 피로와 통풍이었다.

- 부분발작을 가진 소아(4~16세)에서 실시한 임상자료에 의하면, 이 약을 투여한 55.4%의 환자에서 이상반응을 경험하였다(위약군 40.2%)
이중 중대한 이상반응은 0.0%였다(위약군 1.0%).
소아 모자(모자)가 가장 흔하게 보고된 이상 반응은 통풍, 짜증, 신경과민, 감정적 불안정성, 초조, 식욕부진, 무기력, 두통이었다.
성인보다 소아에서 더욱 빈번하게 발생하였(33.0% vs 19.0%).
그러나, 신장애 위험은 성인과 비교할 때 유사하였다.

- 부분발작을 가진 소아(4~16세)에서 실시한 임상자료에 따르면, 이 약을 투여한 환자의 21.7%, 위약을 투여한 환자 7.1%에서 이상반응을 경험하였다.
이 중 중대한 이상반응은 없었다.
장기투여시(1~16개월)의 1개월~4세 소아에서 가장 빈번한 이상반응은 신경과민(7.9%, 12명(7.2%)), 통풍(10.0%), 장조음증과 과활성(3.3%), 수면 장애(3.3%), 공격성(3.3%)이었다.
1개월~4세의 소아 환자에서의 안전성 결과는 4~16세 소아에서의 안전성 프로파일과 일치하였다.

- 간대성 근근력 약화를 가진 성인(12~65세)에서 실시한 임상시험에서, 이 약을 투여한 31.3%환자가 이상반응을 경험하였(위약군 20.7%)
이들은 역할과 관련된 이상반응으로 판단되었다.
가장 빈번하게 보고된 이상반응은 두통과 통풍이었다.
간대성 근근력 약화를 가진 환자에서 이상반응 발생 예수는 성인 부분발작환자에서의 이상반응 발생 예수와도 달랐다.(33.3% vs 48.4%)

- 처성 전신 경작-간대 발작을 가진 특정성 전신성 간질 환자를 대상으로 실시한 연구에서 레비티라세탐정 투여군 환자의 39.2%와 위약 대조군 환자의 29.8%가 치료와 관련부 것으로 판단되어 이상반응을 경험하였다.
가장 빈번하게 보고된 이상반응은 피로였다.

- 처가과 소아에서 실시한 임상시험에서 보고된 이상반응의 빈도는 아래와 같다.
(대여 비율(%)은170), 최후가 (217)(210),170, 170하지 않(%)은17,000, 17,000), 드물게(%)은17,000, 17,000), 매우드물게(%)은17,000, 17000)
모호하고 모호

임상시험에서 보고된 이상반응

발현빈도	빈도	이상반응
전신 및 투여후부 신장애	매우 흔하게 매우 흔하게	무력증, 피로 통풍
신경계 장애	흔하게	기억상실, 조현상동증/분열상, 경련, 어지러움, 두통, 운동과다증, 불면, 과민 장애, 수면의 장애, 기분 순회
정신계 장애	흔하게	초조, 우울, 감정적 불안정성/가분, 자각성(공격성, 불면, 신경과민/불안장애, 비정상적 사고
위장관 장애	흔하게	복통, 설사, 소화불량, 구역, 구토
대사 및 영양 장애	흔하게	식욕부진, 체중 증가, 포도당(케토)이상과 병행하는 경우 식욕부진의 위험이 높음
귀 및 비인두 장애	흔하게	현훈(어지러움)
시각장애	흔하게	빛시, 호민 시력
근골격계 및 관절조직 장애	흔하게	근육통
심장, 순환, 및 사혈부 합병증	흔하게	심계
감염	흔하게	감염, 비만두염
호흡기계 장애	흔하게	기침
피부 및 피하조직 장애	흔하게	발진, 속진, 가려움증
혈액 및 림프계 장애	흔하게	혈소판감소증

4) 국외 임상 후 조사에서 보고된 이상반응
이 약 조사에서 신경계 및 정신과 증후 유해사례가 가장 빈번하게 보고되었다.
위의 임상시험에서 보고된 이상반응 이외에 추가된 시된 후 조사를 통해 보고된 이상반응은 아래와 같다.

발현빈도	이상반응
신경계 장애	무도무정위운동증, 운동이상성, 감각이상, 기면
정신계 장애	자살, 자살기도, 자살도범, 전신성 장애, 이상행동, 통과, 학인 상태, 공황발작, 불안, 분노
위장관 장애	식욕감
간담도계 장애	간부전, 간염, 간기능장애 이상
1차 및 2차성 간대	체중 감소, 과(비)활동증(hypotatremia)
피부 및 피하조직 장애	홍반류마티스 약제(TNF-α 억제제)중 중추신(3.3%), 다형성, 동요(발열, 발진, 이 약 중단 후 회복됨)
근골격계 및 관절조직 장애	근육 약화
혈액 및 림프계 장애	발혈(혈소판)결핍 증후에서 급속 악화를 동반하여 혈관염, 부종(혈구, 백혈구 감소, 호중구 감소)
면역계 장애	호산구 증가증과 전신성증을 동반한 약물반응(DRESS, Drug reaction with eosinophilia and systemic symptom)

5) 레비티라세탐 정제 및 액제의 국내 시판 후 조사 결과

국내에서 제정사를 위하여 5년 동안 4,964명을 대상으로 실시한 사용성조사결과, 유해사례 발생률에 인과관계로 상관계수가 7.76%(805/4896명, 4362/1191)고, 주부 유해사례는 통풍 2.23%(103/4896명, 197)인, 경련 1.2%(58/4896명, 59)인, 어지러움 1.04%(50/4896명, 492)인, 두통 0.99%(29/4896명, 30)인이었다.
발현된 유해사례의 대부분이 과증 및 초조였다.

- 이 약을 14주까지를 배제할 수 있는 약물유해사례 발생률은 7.25%(355/4896명, 4067)이었으며, 주부 약물유해 반응은 통풍 2.23%(103/4896명, 197)인, 경련 1.06%(52/4896명, 52)인, 어지러움 0.99%(49/4896명, 49)인, 두통과 과민(1) 각각 0.99%(24/4896명, 25)인이었다.
- 국내인 유해사례에는 자살기도와 자살충동이 각각 12건만 보고되었으며 그 중 이 약과 연관관계를 배제할 수 없는 5건만 유해사례로는 자살기도와 1건 보고되었다.
- 경증까지 못한 유해사례의 발현률은 0.39%(19/4896명, 20)인데 비해, 두근거림, 설사증, 운동장애, 중중중증, 정신운동장애, 두통, 입원증, 무복합, 위장장애 장애, 침과다분비, 두드러기, 패혈증, 근골격계 장애, 복통증, 분노증 초중중등에 보고되었다.

5. 일반적 주의
 - 1) 환자 및 보호자에게 환간질약이 우울증의 징후 및 증상과 관련 또는 악화, 비정상적 기분과 행동으로 변화, 자살충동 및 자살행동 또는 자해충동의 위험을 증가시킬 수 있음을 알려 환자에게 이러한 증상은 초조 또는 행동이 발현될 경우 즉시 의료 전문가에게 보고할 수 있도록 한다.
 - 2) 신장애에서 나타나는 예는 없었으나 이 약 투여 소아환자에 대한 설명은 없었으나, 그러나, 장기 투여 시, 학, 알콜적, 지병, 성정, 내분비기능, 사춘기 기인 능력에 대한 영향은 알려지지 않았다.
6. 상호작용
(1)아래 상호작용에 대한 생체외 자료에서 이 약은 약동학적 상호작용이 일어나지 않았다.
지용성인 발원제에 해대(혈중농도 이상)에서 이 약과 후 (1차)에는 CYP-150 isom, acitorde hydrolase, UDP-glucuronidation 효소의 대사가 약제에 관련 다(가)고 간질치료제 기질로도 작용할 수 있다.
또한 이 약은 생체외 및세포분자식 glucuronidation에 영향을 주지 않았다.
이 약은 혈장단백질에 결합되지 않고 독백성 혼합하드로 (단백결합률 10%) 단핵세포(부피)에 결합하는 다른 약물과 이상적으로 유익한 상호작용을 일으킬 것 같지 않다.
- (1) 다른 간질치료제 이 약과 기원에 간질치료제 (메치로인, 카바마제핀, 발프로산, 페르나트페말, 카르보마지, 카바페핀, 클리페르자)와 상호작용을 유발(단독이상시)을에서 이 약과 수도 간질치료제의 혈중농도를 측정할 결과, 이 약은 기존 간질치료제의 혈장농도에 영향을 미치지 않았고, 간질치료제에 이 약의 약동학에 영향을 주지 않았다.
- 2) 경구용피마인 이 약(1회 2회, 1회 500mg)은 경구용피마인(0.03mg 메타하이드로라지디올과 0.15mg 페르나트페스테)의 약동학, 혈청정산효율로의 약동학, 프로게스테론 농도에 영향을 주지 않았고 마만의 효과는 유지시켰다.
경구용피마인의 병용은 이 약의 약동학에도 영향을 미치지 않았다.
- 3) 다국산 이 약(1회 2회, 1회 1000mg)은 1회 0.25mg의 다국산의 약동학 및 약력학(ED₅₀)에 영향을 미치지 않았으며, 다국산의 병용은 이 약의 약동학에도 영향을 미치지 않았다.
- 4) 위약군 이 약(1회 2회, 1회 1000mg)은 R- 및 S-이소머의 약동학에 영향을 미치지 않았으며, 프로테올린 시간에 경 영향을 주지 않았다.
좌우편의 병용은 이 약의 약동학에도 영향을 미치지 않았다.
- 5) 프로테올린: 신장애 분비 억제제인 프로테올린(1회 4회, 1회 500mg 투여할 때 이 약의 약동학을 변화시키지 않았다.
다사제인 uch L057와 C₅₀m은 프로테올린은 초제와 인 관계가 있었고, 노에서 미분해제로 배출된 약물의 비율은 같았다.
uch L057와 신메타하이드로는 60% 감소하였는데 uch L057의 경증(약) 세노분 분비억제과 관련 있는 것 같다.
프로테올린(1회 2회)에 대한 이 약의 영향은 연구되지 않았다.
- 6) 소아에 대한 약동학적 연구

성인에서 실시한 약동학적 연구와 일치하여, 60mg/kg/day까지 투여한 소아 환자에서, 임상적으로 유의하게 역할을 할 정도로에 대한 경증(약)은 통풍, 4~17세의 간질로 가진 소아 및 청소년에서 약동학적 상호작용을 경험적으로 평가했다.
결과: 페르나트페말을 투기요법으로 투여한 소아에서, 병용 투여한 카바마제핀과 페르나트페에 대한 혈장농도의 혈장농도에 영향을 미치지 않음은 확인되었다.
그러나, 치료제, 치료제, 호르몬 투여하는 간질치료제는 소아에서 레비티라세탐의 클리어런스(22%)가 증가시키는 것으로 나타났다.
복합 처방은 필요하지 않다.

가) 투

이 약물의 흡수에 대한 자전체의 약학에 대한 자료는 없으며, 독살장애 의해 흡수 침도에 영향을