

※ 복용전에 사용설명서를 숙지하시고 의약품과 함께 보관하십시오.

정공공단 KGMP
적격업체제품

일반의약품
분류번호:222

세브론과립

(아세틸시스테인)

【성분·함량】 1정 중
아세틸시스테인(USP) 200.00mg
첨가제(타르색소) : 적색40호

【성상】 얇은 분홍색 과립제

【효능·효과】
1) 다음 질환에서의 객담배출곤란 : 급·만성기관지염, 기관지확장증, 천식성기관지염, 기관지천식, 세기관지염, 만성염증증
2) 인·후두염, 부비강염, 삼출성 및 장액성중이염

【용법·용량】
아세틸시스테인으로서 다음 용량을 식전에 소량의 물과 함께 경구투여(복용)한다.
1. 급성질환
· 성인 : 1회 200mg 1일 3회
· 소아 : 6~14세 1회 200mg 1일 2회, 2~5세 1회 100mg 1일 3회
2. 만성질환
· 성인 : 1회 200mg 1일 2회
· 소아 : 6~14세 1회 100mg 1일 3회
3. 만성염증증
· 소아 : 6세 이상 1회 200mg 1일 3회, 2~5세 1회 100mg 1일 4회
· 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】
1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
1) 이 약에 과민증 환자
2) 위 십이지장궤양 환자
3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
신생아 (중증 질환이 아닌 경우 신생아에게 투여하지 않는다.)
3. 부작용
1) 소화기계 : 드물게 구역, 구토, 구내염, 가슴쓰림, 설사 등이 나타날 수 있다.
2) 과민증 : 드물게 두드러기, 가려움, 발진, 두통, 이명(귀울림), 기관지경련(특히 천식 환자) 등이 나타날 수 있다.
3) 드물게 빈맥(빠른맥), 고혈압이 나타날 수 있다.
4) 국내 자발적 유해사례 보고자료(1989~2013 상반기)를 분석한 결과, 유해사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 유해사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 유해사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 유해사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
· 호흡곤란
4. 상호작용
경구용 항생물질(아목시실린, 세푸록심, 독시사이클린, 에리스로마이신, 치암페니콜)과 병

용투여시 항생물질의 약효를 감소시킬 수 있다(적어도 2시간의 간격을 두고 투여한다).
5. 임부에 대한 투여
임부에 대한 적절한 연구가 없으므로 반드시 필요한 경우에만 투여한다.
6. 수유부에 대한 투여
이 약이 모유로 분비되는지 알려지지 않았으나 많은 약들이 모유로 분비되므로 수유부에 투여할 경우에는 신중히 투여한다.
7. 적응상의 주의
이 약의 용액에 다른 약물의 첨가는 피해야 한다.

【포장단위】 100g

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

* 본품을 구입할 때 사용기한이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
* 본제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
* 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

〈이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 www.seoulpharma.com이나 (080)780-1931에서 확인할 수 있습니다.〉

작성일자 : 2015. 08. 10
PM.102363(00)

【제조자】 (주)서울제약 : 경기도 시흥시 경제로 59