

마룬정

분류번호: 399

일반의약품

MALLOON Tab.

이 약을 복용하시기 전에 반드시 첨부문서를 주의깊게 읽어주시기 바라며,
제품과 함께 보관하여 주시기 바랍니다.

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

알긴산(BP).....	200mg
카르복시메틸셀룰로오스나트륨(KP).....	100mg
· 첨가제(타르색소): 황색4호	

【성상】 노란색의 타원형 필름코팅정제

【효능·효과】

음식을 섭취 감소를 통한 체중감량(줄임)의 보조요법

【용법·용량】

1일 3회 2점씩 식전에 복용하고 필요에 따라서는 취침전에 추가로 2정 복용가능하다. 충분한 양의 물과 함께 복용하는 것이 좋다. 권장량을 최소 3-4주간 복용할 것이 권장된다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 이 약 및 이약에 포함된 성분은 과민증이 있는 환자
 - 3) 유·소아
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
다른 약물과 상호작용을 방지하기 위해 다른 약과 동시에 복용하지 않는 것이 좋으며, 복용할 경우 30분~1시간의 간격을 두고 복용하는 것이 권장된다.
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 임부 및 수유부
 - 2) 소화기 장애 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 이 약은 복부(배부분) 팽만감, 구역, 변비 또는 설사가 발생할 수 있으며 이와 같은 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것.
- 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것.
- 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 2) 위산 농도가 저하된 경우 이 약의 포만효과가 감소하거나 소실(없어짐)될 수 있다.
- 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 정해진 보관조건에서 보관하도록 하며, 유효기간이 지난 약은 복용해서는 안된다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 30정, 300정

【사용기간】 제조일로부터 36개월

- * 본 제품은 "우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)"에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다. 만약 구입시 사용유효기간이 경과하였거나, 변질, 변색 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- * 기타 자세한 사항이나 첨부문서의 작성일자(2015년 12월 09일) 이후 변경된 내용은 대화제약 홈페이지나 마케팅팀(080-855-0114)으로 문의하시기 바랍니다.
- * 의약품 중어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

최초 작성일 : 2015년 12월 09일



대화제약주식회사

서울특별시 관악구 남부순환로 2038
공정·강원도 황성군 황성읍 한우로 495
<http://www.dhpharm.co.kr>