

건위소화제

분류번호:233

일반의약품

제스탈 정 1000정

■ 원료약품 및 그 분량: 1정 중

- 유효성분: 디아스타제·프로테아제·셀룰라제 2000IV(KP)··· 20.0mg
(전분당화력(pH4.5)278단위이상, 전분호정화력(pH4.5) 640
단위이상, 단백소화력(pH3.0)170단위이상, 섬유소당화력(pH4.5)
2단위이상)

- 유효성분: 리파제 II (KP)··· 20.0mg (지방소화력(pH6.0)120단위)
- 유효성분: 우르소데옥시콜산(KP)·········· 10.0mg
- 유효성분: 시메티콘(KP)·········· 30.0mg

- 첨가제(타르색소): 황색 4호, 청색 1호
- 첨가제(동물유래): 무수유당(소,우유)
- 기타첨가제: 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 폴로이드성 이산
화구소, 크로스카르멜로소나트륨, 셀룰, 폴리에틸렌글리콜6000, 히드록시
프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스

■ 색상: 녹색의 장방형 필름코팅된

■ 효능·효과: 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 체함, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감

■ 용법·용량: 성인 1회 1~2정, 1일 3회 식후에 복용한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 만 7세 이하의 어린이

2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성 (galactose
intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증 (Lapp lactase deficiency)

또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 (glucose-galactose malabsorption)등의
유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람

2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성

3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람

3. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와
상의할 것. 상담시 이 첨부문서를 소지할 것.

2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민 하거나
알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것.

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

1) 정제된 용법용량을 잘 지킬 것.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 직사광선을 피하고 밀 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.

3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

■ 포장단위: 1000정/병

■ 저장방법: 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

■ 제조의뢰자: 일성신약주, 경기도 안산시 단원구 산단로 349

■ 제조자: (주)씨트리, 경기도 남양주시 경강로 27

■ 판매자: (주)앤시엔, 경기도 수원시 영통구 매영로35번길 9(매탄동)

※ 사용(유효)기한이 경과한 의약품은 사용하지 마십시오.

※ 본 의약품은 KGMP(의약품 제조 및 품질관리기준)에 의하여 엄격한 관리를 펼친
제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질변패 오염되거나
손상된 의약품이 발견된 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 제품 설명내용의 최종 개정 연월일(2016.03.07)이후 변경된
내용은 www.ilsung-ph.co.kr이나 식품의약품 안전처 온라인
의약 도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

※ 소비자 상담(문의)실: 앤시엔, 031-548-0785

제조
번호:

사용
기한:

30*17mm



HDPE

부형:LDPE

L ZSA R02
4010799-1



(01)08060554035510