



36022

I SCA R02

전문 의약품

분류번호:119

에스콜린_주

콜린알포세레이트

4mL

[원료약품 및 그 분량] 1mL 중

주성분 : 콜린알포세레이트(KP).....250.0mg

용 제 : 주사용수(KP).....적량

[성상]

무색투명한 앰플에 든 무색투명한 주사액

[효능·효과]

- 뇌혈관 결손에 의한 2차 증상 및 변성 또는 퇴행성 뇌기질성 정신증후군 : 기억력저하와 착란, 의욕 및 자발성저하로 인한 방향감각장애, 의욕 및 자발성 저하, 집중력감소
- 감정 및 행동변화 : 정서불안, 자극과민성, 주위무관심
- 노인성 가성우울증

[용법·용량]

콜린알포세레이트로서 1일 1회 1g을 근육 또는 정맥주사한다. 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

1. 경고

앰플주사제는 용기절단시 유리파편이 혼입되어 이상반응을 초래할 수 있으므로 사용시 유리파편 혼입이 최소화 될 수 있도록 신중하게 절단 사용하되 특히 어린이, 노약자 사용시에는 각별히 주의할 것.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응 환자
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성

3. 이상반응

- 1) 2차적인 도파민 작용에 기인한다고 추정되는 구역이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량 투여한다.
- 2) 전신 및 투여부위 : 주사부위 통증
- 3) 소화기계 : 구강건조
- 4) 정신신경계 : 졸음, 불면, 적개심, 신경질, 불안
- 5) 피부 : 두드러기

4. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

[포장단위] 10앰플, 50앰플

[저장방법] 밀봉용기, 실온(1~30℃)보관

[제조사] 일성신약(주), 경기도 안산시 단원구 산단로 349

[판매자] HS바이오, 서울시 강남구 논현로 63길16 214호

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 처방된 증상, 처방된 환자 이외에는 사용하지 마십시오.

※ 첨부문서에 기재되어 있지 않은 부작용이 나타날 경우, 의사나 약사 또는 식품의약품안전처에 알려십시오.

※ 사용(유효)기한이 경과한 의약품은 사용하지 마십시오.

※ 본 의약품은 KGMP(의약품 제조 및 품질관리기준)에 의하여 엄격한 관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질·변색·오염되거나 손상된 의약품이 발견된 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부서 최종 개정 연월일 이후 변경된 내용은 www.ilsung-ph.co.kr이나 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

제조사

ILSUNG 일성신약(주)
www.ilsung-ph.co.kr

판매자

HS | B|O
에치에스바이오
소비자상담실 : 02-538-6400

최종 개정 연월일 : 2016. 06. 22

