

파워콘드로 600에프정



【원료약품 및 분량 : 1정 중】

- 유효성분
- 콘드로이틴설페이트나트륨(KP) 600.0mg
 푸르설테아민(KP) 50.0mg
 니코틴산아미드(KP) 50.0mg
 이노시톨(KP) 25.0mg
 콜린타르타르산염(USP) 20.0mg
 판토텐산칼슘(KP) 15.0mg
 피리독신염산염(KP) 10.0mg
 시아노코발라민 1000배산(KP) 10.0mg
 (시아노코발라민으로서 10μg)
 리보플라빈(KP) 6.0mg
 γ-오리자놀(KP) 5.0mg
 콜레칼시페롤과임(별규) 0.5mg
 (콜레칼시페롤로서 50IU)
- 유효성분(동물유래성분) : 콘드로이틴설페이트나트륨(소, 연골)
 콜레칼시페롤과임(소의 가죽)
- 첨가제(타르색소) : 적색40호, 청색1호알루미늄레이크
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 크로스카멜로소나트륨, 폴리메틸렌글리콜 6000, 히프록셀로오스

【성상】

갈색의 장방형 필름코팅정제

	앞	뒤
식별 표시	IH	PCD

【효능·효과】

1. 다음경우의 비타민 D, B₁, B₂, B₆의 보급

- 육체피로
- 임신·수유기
- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
- 발육기
- 노년기

2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.

- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등)
- 각기
- 눈의 피로

【용법용량】

만 8세 이상 어린이 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정 식후 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- (1) 고칼슘혈증(hypercalcaemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유훈종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
- (2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- (3) 만 3개월 미만의 젖먹이
- (4) 신장결석 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- (1) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.

- (1) 만 1세 미만의 젖먹이
- (2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- (3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이

- (4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아

① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.

- (5) 신장결석 병력이 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 구내염(입안염)
- (1) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- (2) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
- (3) 고지방 영양에 의해 소화성 장애를 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
- (4) 우발적으로 과량복용 한 경우
- (5) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- (1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- (2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것
- (3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.

6. 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
- (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 90정/케이스(45정/병 x 2)

【사용(유효)기간】 제조일로부터 36개월

※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 엄격한 제조관리와 품질관리를 거쳐 생산된 의약품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변색, 오염 또는 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품 판매업자를 통해 교환하여 드립니다. ♣ 소비자상담실 : 080-388-3333 (순산자부담)

※ 본 의약품 사용시 이상반응이 발생할 경우 한국약물관리안전센터(www.drug.safe.or.kr)의 의약품 부작용 신고 및 피해구제상담(1644-6223)을 통해 피해구제신청이 가능합니다.

※ 최신의 정보 확인방법 : 이 첨부문서의 개정일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.ilhwa.co.kr) 또는 전화 (031)550-0472-8 (주)일화 화솔 · 개발부를 통해 확인할 수 있음

※ 자세한 품목허가 또는 신고사항은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(https://nedrug.mfds.go.kr) 의약품등 정보 참조

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.

제정연월일 : 2020년 05월 20일

【제조자】 (주)일화 / 강원도 춘천시 동내면 거두단지2길 55

【판매자】 동화약품(주) / 충청북도 충주시 충주산단1로 167