

전문의약품

분류번호:114

마도펜 서방정 / 세미서방정

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

마도펜서방정	마도펜세미서방정
-유효성분: 아세트아미노펜(KP)..... 650mg, -유효성분: 트라마돌염산염(BP) 75mg -기타 첨가제: 스테아르산마그네슘, 오파드라일 II 나란색(85F420033), 저지환도하트루스프로필 셀룰로오스, 콜로이드성아산화규소, 크로스포 비돈, 포비돈, 히프록셀로오스	-유효성분: 아세트아미노펜(KP).....325mg, -유효성분: 트라마돌염산염(BP) 37.5mg -기타 첨가제: 스테아르산마그네슘, 오파드라일 II 나란색(85F420033), 저지환도하트루스프로필 셀룰로오스, 콜로이드성아산화규소, 크로스포 비돈, 포비돈, 히프록셀로오스

[성상]	
	마도펜서방정
	마도펜세미서방정
	연한 노란색의 장방형 서방정 필름코팅정

[효능·효과]
중등도~중증의 급, 만성 통증

[용법·용량]
·성인

용량은 환자의 통증 정도 및 치료 반응에 따라 조절한다. 초효율성으로 마도펜서방정(1정), 마도펜세미서방정(2정) 투여를 권장하며, 그 이후 투여 간격은 최소 12시간 이상으로 하되 마도펜서방정(1일 4정), 마도펜세미서방정(1일 8정)을 초과하지 않도록 한다. 이 약을 필요 이상 장기간격 투여하지 않도록 하며, 질병의 특성과 심한 정도로 인해 정기간 투여가 필요한 경우, 정기적인 모니터링을 실시하여 이 약의 지속적용 여부를 확인하도록 한다.

이 약의 투여 시 구역, 구토, 가려움증, 변비, 어지러움, 졸음 등이 나타날 수 있으므로 환자의 반응을 면밀히 관찰하고 적절히 조절한다.

·소아
소아에 대한 이 약의 안전성 및 유효성은 확립되어 있지 않으므로, 투여를 권장하지 않는다.

·노인
통상적인 성인 용량을 투여하도록 한다. 단, 75세 이상의 노인에게 트라마돌을 경구 투여시 트라마돌의 소살빈간기가 17% 증가하였으므로 최소 12시간 이상 간격으로 이 약을 투여하도록 한다.

·신장질환자
신장애환자에 대한 이 약의 안전성 및 유효성은 확립되어 있지 않으므로, 투여를 권장하지 않는다.

·간질환자
간장애환자에 대한 이 약의 안전성 및 유효성은 확립되어 있지 않으므로, 투여를 권장하지 않는다.

[사용상의 주의사항]

- 경고
1) 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.
2) 아세트아미노펜을 복용한 환자에서 매우 드물게 급성 전신성 발진성 농포증(급성 전신성 발진성 고름물집증) (AGEP), 스티븐스존슨 증후군(SJS), 독성 표피 괴사증候(TEN)과 같은 중대한 피부 반응이 보고되었다. 이러한 피부반응은 치명적일 수 있다. 따라서 이러한 증후군에서 피부 반응의 징후에 대하여 환자에게 충분히 경고하고, 이 약 투여 후 피부반응이나 다른 과민반응의 징후가 나타나면 즉시 복용을 중단하도록 하여야 한다.
3) 트라마돌을 권장용량 범위 내에서 투여받은 환자에서 발진이 보고된 바 있으며, 권장용량 이상 투여 시 발진의 위험은 증가되는 것으로 나타났다. 트라마돌을 다음의 약물과 병용시 발진의 위험은 증가된다.
-선택적 세로토닌 재흡수 억제제 (SSRI) 항우울제 또는 식욕감퇴제
-삼환계 항우울제 (TCAs) 및 다른 삼환계 약물 (예, 시클로벤자피린, 프로메타진 등)
-다른 마약류
트라마돌은 다음의 약물과 병용시 발진의 위험을 증가시킬 수 있다.
-MAO (Monoamine Oxidase) 억제제
-신경아민제
-발작 역치를 낮출 수 있는 약물
간질 환자, 발작 병력자 또는 발작에 대한 위험인자 (머리 상해, 대사장애, 알코올 또는 약물 금단 환자, 중추신경계 감염)가 있는 환자에서 경련 발생의 위험이 증가될 수 있다.
4) 트라마돌 투약 환자에서 드물게 치명적인 아나필락시양 반응이 보고된 바 있다.
5) 과량의 트라마돌을 마취제 또는 알코올과 병용시 호흡억제가 나타날 수 있다. 이 약 과량 투여시 호흡억제에 대한 처치를 실시해야 한다. 날록손을 투약할 경우에 발진이 있을 수 있으므로 주의하도록 한다.
6) 중추신경계 억제제를 복용한 환자에게 이 약을 투여시 중추신경계 및 호흡억제의 위험이 증가될 수 있다.
7) 두개고압증이 증가된 환자나 고압성상 환자에서 이 약의 투여는 아편제제의 호흡억제 효과로 이산화탄소 지류와 2차적인 뇌척수액의 압력 증가로 인해 이러한 증상이 심각해지 나타날 수 있다.
8) 트라마돌은 모르핀類似(opioid)의 전신성, 유효적 효능성을 유발할 수 있다.
9) 간독성: 이 약에는 아세트아미노펜 및 트라마돌이 함유되어 있다. 아세트아미노펜은 때로 간이손 및 사망을 초래하여 급성 간부전과 관련이 있으며, 대부분의 간손상은 다른 아세트아미노펜 제품과 함께 복용하여 일할 4,000mg을 초과하였을 때과 관련이 있으므로 사용시 주의한다. 특히 간장애 환자는 반드시 의사와 상의한 후 복용하여야 한다.

- 다음 환자에는 투여하지 말 것
1) 이 약의 성분에 과민성인 있는 환자
2) 알코올, 수면제, 중추작용진통제, 아편제 또는 항정신성 약물 등 중추신경계 작용약물 중독 환자
3) 삼한 호흡억제상태 환자(가벼운 호흡억제가 나타날 수 있다)
4) 두부손상, 뇌의 병변이 있는 경우로 의식혼탁의 위험이 있는 환자
5) MAO억제제를 투여받고 있는 환자 또는 최근 14일 이내에 투약한 경향이 있는 환자
6) 소화성궤양, 심한 혈액이상 환자
7) 삼한 간장애, 심한 신장애, 심한 신기능부전 환자
8) 아스피린, 천식(바스테딘)이상 소염진통제에 의해 한식발작 유발)되는 병력이 있는 환자
9) 약물로 조절되지 않은 간질 환자

- 다음 환자에는 신중히 투여할 것
1) 모르핀 병용 또는 반복투여 환자(동물실험에서 가벼운 모르핀 길항작용이 인정되었으므로 금단증상을 일으킬 수 있음)
2) 아편제제, 마취제, 최면제, 폐노자이진, 신경안정제, 진정제 등과 같은 중추신경계 억제제 복용 환자
3) 담도질환 환자(동물실험에서 대량투여하는 경우 우도결막근을 수축함)
4) 간장애 환자(동물 실험에서 혈청GOT, GPT 활성치의 상승을 보이는 수가 있다.)
5) 신장애 환자
6) 음주 환자
7) 아편에 과민증 환자
8) 간질 환자 또는 발작 발생 가능성이 있는 환자
9) 속성태, 원인모를 이유로 인한 의의 변화성태 환자

- 이상반응
4.1. 이상반응
1) 과민증: 속 등의 과민증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
2) 전신성태: 무력증, 피로, 홍조, 때때로 흥동, 경직, 실신, 금단증상이 나타난다.
3) 순환기계: 때때로 고혈압, 고혈압성 뇌졸중, 부정맥, 심장정맥, 심장경련, 빈맥이 나타난다.
4) 중추신경계 및 말초신경계: 환기 두통, 진전, 때때로 운동실조, 경련, 간장경직, 편두통, 편두통 약화, 불수면의 수축, 지각이상, 혼미, 환기증이 나타난다.
5) 소화기계: 복통, 변비, 설사, 소화불량, 팽기, 구내건조, 구역, 구토, 때때로 현하관란, 혈변 (melena), 허부종이 나타난다.
6) 정신과적 장애: 식욕감퇴, 불안, 착란, 도취, 불면증, 신경과민, 졸음, 때때로 건망증, 이인증, 우울증, 약물남용 및 의존, 강장 작용, 환각, 발기부전, 약용, 비정상성 사고가 나타난다.
7) 혈액계: 때때로 빈혈이 나타난다.
8) 호흡기계: 때때로 호흡곤란이 나타난다.
9) 비뇨기계: 때때로 단백뇨, 배뇨장애, 빈뇨, 뇨저류가 나타난다.
10) 피부: 소양증, 발진, 발한, 두드러기 증가
11) 기타: 간기능 이상, 체중감소, 이명, 비정상적인 시야, 오한이 나타난다.

트라마돌/아세트아미노펜의 임상시험에서는 보고된 바 없었으나, 이 복합제 보다 더 많은 환자들에게 사용령이 있는 트라마돌염산염 및 아세트아미노펜의 임상시험과 시판 후 조사에서 관련이 있는 것으로 보고된 기타 이상반응은 다음과 같다.

- 트라마돌염산염
혈관연하, 기립성 저혈압, 사해, 탈락, 심근허혈, 폐부종, 호흡기증상 (호흡곤란, 기관지천연, 천명, 혈관신경성 부종), 알러지 반응(아나필락시스와 두드러기, 스티븐스 존슨 증후군), 식욕변화, 운동허약, 호흡기 억제, 인지 기능 이상, 집중곤란, 우울증, 자살경향, 간염, 간 기능 부전과 위장관 출혈, 또한 강직, 활동 인지 및 감각의 변화를 포함한 다양한 정신의 부작용이 개인에 따라 다르게 나타날 수 있다. 실험실검사상에서 크레아티닌과 간기능 검사를 포함한 실험실적 정신의 부작용이 증가되었다는 보고가 있으며, 드물게 프로트롬빈 시간 상승을 포함하여 파와된 적용 변화가 밝혀졌다. 트라마돌을 선택적 세로토닌 재흡수 억제제(SSRIs)와 같은 세로토닌 제제와 병용시 세로토닌 증후군(정신신체 변화, 반사항진, 발열, 혈림성 진전, 흥분, 발한, 발작, 혼수, 빈맥, 착란, 혼돈실조, 근경련, 설사 등이 포함)이 보고되었다. 인과관계는 확립되지 않았지만 전신의 약화가 보고된 바 있으며, 마약중독 증 나타나는 것과 유사하게 금단증상이 나타날 수 있다.
2. 아세트아미노펜
알레르기 반응 (주로 피부 발진) 또는 아세트아미노펜에 대한 2차성 과민반응이 드물게 보고되었다. 일반성으로 약물 투여 중단 후 회복되었고, 필요한 경우 증상 치료가 실시되었다. 혈소판 감소증과 무구립구증 포함한 혈액장애가 보고된 바 있으나 반드시 아세트아미노펜과 관련된 것은 아니다. 아세트아미노펜이 파와된 유사물질과 같이 투여하였을 때 자프로트롬빈혈증을 일으킬 수 있음을 나타내는 여러 보고가 있다. 다른 연구에서는 프로트롬빈 시간은 변하지 않았다.

알레르기 반응 (주로 피부 발진) 또는 아세트아미노펜에 대한 2차성 과민반응이 드물게 보고되었다. 일반성으로 약물 투여 중단 후 회복되었고, 필요한 경우 증상 치료가 실시되었다. 혈소판 감소증과 무구립구증 포함한 혈액장애가 보고된 바 있으나 반드시 아세트아미노펜과 관련된 것은 아니다. 아세트아미노펜이 파와된 유사물질과 같이 투여하였을 때 자프로트롬빈혈증을 일으킬 수 있음을 나타내는 여러 보고가 있다. 다른 연구에서는 프로트롬빈 시간은 변하지 않았다.

- 트라마돌/아세트아미노펜 서방정의 이상반응
1) 만성 허부 우울 환자를 대상으로 무작위배정, 위약대조, 평행군 이중 눈가림 임상시험(n=245)에서 이상반응으로 인한 치료에 투여를 중단한 환자는 위약군 6명(5.00%), 이 약 투여군 24명(19.20%)이었다. 이상반응은 총 169명의 환자에서 발생하였고 이 약 투여군 125명중 104명(83.20%)과 위약 투여군 120명중 65명(54.1%)에서 발생하였다. 중대한 이상반응은 총 42건(동맥경화증, 신전도 비정상, 크레아티닌 포스포가나제 증가, 유방암 각 1 건)이 보고되었으나, 모두 시험약과 관련이 없는 것으로 판단되었다. 발생한 모든 이상반응 중 이 약과의 인과관계를 배제할 수 없는 이상반응 발현율은 73.6%(92명/125명, 236건) 이었다. 또한 다른 트라마돌/아세트아미노펜 서방정의 활성대조(트라마돌/아세트아미노펜 일반정, 평행군 임상 시험 (n=218)에서 이상반응은 총 104명에서 발생하였고 이 중 이 약 투여군은 110명중 48명(43.6%, 118건), 대조약 투여군은 108명 중 56명(51.85%, 107건)에서 발생하였다. 또한, 시험약과의 인과관계를 배제할 수 없는 이상약물반응 발현율을 분석한 결과, 이 약 투여군은 42.73%(47/110명, 112건)이고, 대조군은 48.15% (52/118명, 98건)이었다.

- 요통 환자를 대상으로 국내에서 실시한 임상시험 중 2% 이상의 빈도로 보고된 이상반응은 다음과 같다. 가려움증, 구역, 두도, 두드러기, 두통, 변비, 소화불량, 식염분, 식욕감소, 어지러움, 졸음, 구강건조증, 다한증, 발진, 발노장애, 복통, 불면증. 임상시험 중 이 약 투여군에서 보고된 이상반응을 발한기관별로 나열하면 다음과 같다. (매우 흔하게: 10% 이상, 흔하게: 1% 이상 10% 미만, 때때로: 0.1% 이상 1% 미만)
① 감염 및 기생충 침입:
-때때로: 발발성상, 비염, 코인두염
② 근골격 및 결합조직 장애:
-흔하게: 사지통증
-때때로: 관절통, 근경련, 근육쇠약, 근육통
③ 눈의 장애:
-때때로: 시야흐림, 결막염
④ 면역계 장애:
-때때로: 면역반응감소
⑤ 신경계 장애:
-매우 흔하게: 어지러움, 졸음
-흔하게: 두통, 불면증
-때때로: 감각이상, 통풍상태, 미각이상, 불수의적 근수축, 진전, 편두통
⑥ 신장 및 요로계 장애: 흔하게-배뇨장애, 혈뇨
-때때로-질은뇨, 무뇨증, 배뇨장애, 오갈증, 빈뇨
⑦ 위장관 장애:
-매우 흔하게: 구역, 변비, 구토, 소화불량
-흔하게: 구강건조증, 복부통증, 복부불편감, 복부팽만, 상복부불편감
-때때로: 상복부통증, 소화성궤양, 설사, 트림
⑧ 일반 장애 및 투여부위 상태:
-흔하게: 갈증, 가슴불편감, 열결부증, 오한, 발열
-때때로: 말초부종, 무력증
⑨ 피부 및 피하조직 장애:
-매우 흔하게: 가려움증
-흔하게: 다한증, 두드러기, 발진, 식염분
⑩ 혈관 장애:
-때때로: 장벽, 혈압변동
⑪ 호흡계, 흉곽 및 순격장애:
-흔하게: 호흡곤란
-때때로: 기침, 간질, 천음
⑫ 기타:
-흔하게: 뇨혈결구양성
-때때로: 혈압상승, 두근거림, 월경불규칙, 유방암, 상해
3) 체질 수축 수 중등도 이상의 통증 환자를 대상으로 실시한 무작위배정, 이중눈가림, 활성대조(트라마돌/아세트아미노펜 일반정), 평행군 임상시험(n=202명)에서 이상반응은 총 42명에서 발생하였고, 이 중 이 약 투여군은 101명중 24명(23.76%, 38건), 대조약 투여군은 101명 중 18명(17.82%, 26건)에서 발생하였다. 이 약 투여군에서 주로 나타난 이상반응은 구역, 어지러움, 구토, 두통 등이었다. 또한, 시험 약과의 인과관계를 배제할 수 없는 이상약물반응 발현율을 분석한 결과, 이 약 투여군은 17명(16.83%, 26건)이고, 대조군은 12명(11.88%, 16 건)이었다.

4.2. 트라마돌/아세트아미노펜 일반정의 국내 시판 후 조사 결과

- 국내에서 재심사를 위하여 6년 동안 37,967명의 환자를 대상으로 실시한 트라마돌/아세트아미노펜 일반정의 시판 후 조사결과 이상반응의 발현특례들은 약물용의 인과관계와 상관없이 4.57%(1,737명/37,967명, 2,501건)로 보고되었다. 이상반응은 구역, 변비, 구토 등의 소화기계 이상반응이 총 1,391건(3.66%)으로 가장 많았고, 현기증, 두통, 진전, 신경계 유해사제가 563건(1.48%), 전신이상기 149건 (0.39%), 정전계 이상 1492건(3.99%), 피부 및 부속기관 105건(0.28%), 혈액계 31건(0.08%), 신장 및 비뇨기계 28건(0.07%), 순환기계 28건(0.07%), 호흡기계 21건(0.06%), 심혈관계 1건 및 기타 43건(0.11%)로 조사되었다. 트라마돌/아세트아미노펜 일반정과와 인과관계를 배제할 수 없는 약물이상반응 발현율은 4.14%(1,573명/37,967명, 2,244건)이었다. 주된 약물이상반응으로는 구역,1.49%(567명/37,967명), 현기증 0.95%(358명/37,967명)이며, 그 외에 1% 미만으로 보고된 이상반응을 기관별로 분류하면 다음과 같다.
① 전신이상: 무력증, 피로, 발열, 부종, 흥동, 경직, 실신,
2) 심혈관계: 울혈성 심부전
③ 신경계: 환기증, 두통, 현훈, 혼미, 편두통, 진전, 지각이상, 긴장항진, 편두통약화, 불수의기의 수축, 경련
④ 호흡기계: 호흡곤란, 천식, 운동성호흡곤란, 기침, 기관지염
⑤ 신장 및 비뇨기계: 배뇨장애, 뇨저류, 빈뇨, 신장기능수치이상, 빈뇨
⑥ 피부 및 부속기: 간: 소양증, 발진, 발한증가, 두드러기
⑦ 소화기계: 구역, 구토, 소화불량, 복통, 변비, 구강건조, 설사, 현하관란, 방귀, 허부종, 타액증가, 자작염진행, 식도암진행, 위암진행, 마비성 장폐색증, 담낭염, 담낭경, 담낭경
⑧ 정전계: 졸음, 불면증, 식욕감퇴, 발한, 우울증, 신경과민, 강장 불완전, 환각, 이인증
9) 혈액계: 빈혈, 헤모글로빈감소, 적혈구감소, 백혈구증가, 백혈구증가, 혈소판감소
10) 순환기계: 심장정진, 고혈압, 부정맥, 빈맥, 고혈압약화, 대동맥확장
(11) 기타 : 하혈, 골레스테롤상승, 체중감소, 이명, 오한, 엉덩이통증, 대퇴통증, 알레르기성비염, 비출혈, 비정상시야, 담도암 진행, 뇌의 이물감, 간암진행, 간기능 이상

중대한 약물이상반응은 간기능이상, 담낭염, 마비성장폐색증, 혼미등이 각 1례씩 보고되었으며, 예상이 못한 약물이상반응으로 담낭염, 말국질, 마비성장폐색증, 신장기능수치이상(BUN/CR상승), 타액증가, 하혈이 각 1례씩 보고되었다.

특수한 환자인 신장애 환자를 대상으로 한 조사에서 나타난 약물이상반응 발현율은 6.25%(116명/176명, 165 건)이었으며, 주된 약물 이상반응은 구역 및 현기증이 각 42건(22.72%)씩 이었다. 다른한 약물이상반응과 예상하지 못한 이상반응은 없었다. 특수한 환자인 간장애 환자를 대상으로 한 조사에서 나타난 약물이상반응 발현율은 6.63%(22명/332명, 36건)이었으며, 주된 약물이상반응은 구역 12건(3.61%), 현기증 62건(1.81%) 이었다. 중대한 약물이상반응은 마비성 장폐색증, 담낭염, 간기능 이상 각 1건(0.30%)씩 이었고, 예상이지 못한 이상반응은 마비성 장폐색증과 담낭염 각 1건씩이었다.

- 국내 시판 후 조사기간 동안 자발적으로 보고된 중대한 이상반응은 구역 3건, 현훈, 호흡곤란 각 2건, 혼미, 편두통, 언어장애, 의식상실, 심근경색증등의 재발, 저혈압, 구토, 소화불량, 착란, 다발성 장기부전, 아나필락시스, 의도적인 과량 복용이 41건씩 총 23건으로 이는 불확실한 규모의 인구집단으로부터 보고되었으며, 그 빈도 및 이 약의 인과관계를 확실히 추정하기가 어렵다.
3) 또한 국내 시판 후 조사기간 동안, 총 5,666명을 대상으로 사용성적 조사 시 의 별도도 실시한 시판 후 임상시험 결과, 예상이 못한 약물이상반응은 투립 2건(0.04%), 가슴불편감 12건(0.02%)씩 총 32건이 보고되었다.
4) 트라마돌/아세트아미노펜 일반정을 투여하기 전 치료약(진통제) 투여여부 있는 환자군으로 투여여부 없는 경우에도 비한 이상반응 발현율이 통계적으로 유의하게 높게 나타났다.(5.92% vs 3.75%, p<0.001). 또한, 1일 평균투여량이 4 이하인 이상반응 발현율이 이상반응 발현율은 8.35%(289/3460명)로 2정 이상 4정 미만 투여한 한 환자군 4.36%(1325/30419명)보다 이상반응 발현율이 통계적으로 유의하게 높게 나타났다.(p<0.001).

4.4. 트라마돌/아세트아미노펜 서방정의 국내 시판 후 조사 결과

- 1) 국내에서 재심사를 위하여 4년 동안 4,382명을 대상으로 실시한 중등도~중증의 급·만성 통증에대한 시판 후 조사 결과, 이상사례의 발현율은 인과관계와 상관없이 10.09%(442/4,382명, 총 587건)로 조사되었다. 이 중 중대한 이상사례의 발현율은 0.05%(2/4,382명, 3건)로 등통증, 두통, 일과성 허혈발작 각 0.02%(1/4,382명, 1건), 이 약과 인과관계를 배제할 수 없는 중대한 이상사례는 보고되지 않았다.

예상이지 못한 이상사례의 발현율은 인과관계와 상관없이 0.52%(23/4,382명, 총 23건)로 보고되었으며, 가슴스릴 0.25%(11/4,382명, 11건), 사설별명의 위장장애 0.09%(4/4,382명, 4건), 급성위염, 감기, 상기도 감염, 전신쇠약, 열미, 일과성 허혈발작, 등통증, 무기력 각 0.02%(1/4,382명, 1건)로 조사되었다. 이 중, 이 약과 인과관계를 배제할 수 없는 예상하지 못한 이상사례 발현율은 0.39%(17/4,382명, 총 17건)로 가슴스릴 0.23%(10명/4,382명, 10건), 사설별명의 위장장애 0.09%(4/4,382명, 4건), 급성위염, 전신쇠약, 무기력 0.02%(1/4,382명, 1건)가 보고되었다. 1-2) 국내에서 재심사를 위하여 4년 동안 978명을 대상으로 실시한 중등도~중증의 만성 통증에 대한 시판 후 조사 결과, 이상사례의 발현율은 인과관계와 상관없이 15.0%(147/978명, 총 172건)로 보고되었다. 이 중 중대한 이상사례의 발현율은 0.2%(2/978명, 2건)로 사지통증, 폐렴 각 0.1%(1/978명, 1건), 이 약과 인과관계를 배제 할 수 없는 중대한 이상사례는 보고되지 않았다.

예상이지 못한 이상사례의 발현율은 인과관계와 상관없이 1.3%(13/978명, 총 14건)로 보고되었으며, 등통증 0.3%(3/978명, 3건), 근골격통증 0.2%(2/978명, 2건), 복통증, 열구립구증, 상기도감염, 폐렴, 기역억제제, 위장장애, 효과부족, 방항갑상선미, 안면홍조 각 0.1%(1/978명, 1건)으로 조사되었다. 이 중, 이 약과 인과 관계를 배제할 수 없는 예상하지 못한 이상사례 발현율은 0.3%(3/978명, 총 3건)로 기역억제제, 효과부족, 안면홍조 각 0.1%(1/978명, 1건)가 보고되었다.

2) 재조사 이상사례 분석결과 평가
이 약에 대한 국내 재조사 이상사례 및 자발적 부작용 보고자료를 국내 시판 허가된 모든 의약품 대상으로 보고된 이상사례 보고자료와 재조사 종료시점에서 통합평가한 결과, 다른 모든 의약품에서 보고된 이상사례에 비해 이 약에서 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 없었다.

5. 일반적 주의

- 간장질환을 초래하여 투여하지 않도록 하며, 다른 트라마돌 또는 아세트아미노펜 제제와 병용 투여하지 않도록 한다.
2) 트라마돌은 의존성 발현이 낮은 약물이기는 하나, 장기간 투여할 경우에는 의존성의 가능성을 전적으로 배제하기 어려우므로 투여기간을 조정하여야 한다. 약물남용 가능성이나 의존성의 위험이 있는 환자들은 신중히 관찰하며 단기간 투여하도록 한다. 트라마돌은 아편 의존성 환자들에 대해 약물로 적절하지 않으며, 아편작용 약물이나 모르핀의 금단증상을 억제하지 못한다. 아편약 작용제-길항제 (날부론, 부프로피론, 펜타존신)와 병용시 수유제에서의 경정적 차단효과로 인하여 진통효과 감소와 금단증상 발생 위험이 있으므로 병용사용은 권장되지 않는다.
3) 이 약의 투여를 갑자기 중단할 경우 불안, 발한, 불면, 경직, 통통, 구역, 진전, 설사, 상기도 증후군, 입모, 흥분, 신경과민, 운동과민증, 위장전 증상 등과 같은 금단증상이 나타날 수 있다. 공황발작, 심한 불안, 환각, 자각이상, 이명, 비정상적인 중추신경계 반응 또한 매우 드물게 보고되었다. 임상경정성 약용항을 감해해 가며 중단할 경우 금단증상이 완화될 수 있다.
4) 트라마돌 투여 환자에서 중대한 아나필락시양 반응을 포함하여 두드러기, 발진, 기관지 경련, 중독성 피부부종 및 스티븐스존슨 증후군 등의 알러지 반응이 보고된 바 있다. 코데인과 다른 아편제제에 아나필락시양 반응 병역이 있는 환자에서 그 위험이 증가될 수 있다.
5) 알코올, 마취류, 마취제, 최면제, 폐노자이진, 신경안정제 또는 진정 수면제, 진정 항우울제, 진정 항사시딘제, 신경아민제, 중추작용 항고혈압제, 발리도마이드, 바를로핀 등과 같은 중추신경계 억제제 투약 환자에게 이 약 투여시 주의하도록 하며, 이 약의 감량을 고려한다. 이러한 환자에서 트라마돌 투여시 중추신경계 및 호흡 억제 위험이 증가될 수 있다. 이 약을 호흡 억제 약제와 함께 사용하는 환자에서 투여시 주의하도록 하며, 다른 비아편제 진통제 사용을 고려하도록 한다.
6) 발작 가능성이 있거나 발작 역치를 낮추는 기타 약물, 특히 선택적 세로토닌 재흡수 억제제, 삼환계 항우울제, 항정신병약, 중추작용 진통제 또는 국소마취제를 투여한 환자에서 트라마돌 투여시 경련이 보고된 바 있다. 약물로 조절된 간질환자나 간질 가능성이 있는 환자는 꼭 필요한 상황에서만 이 약을 투여하여야 한다.
7) 만성 알코올 중독자에게 과다한 아세트아미노펜 투여로 간독성이 증가될 수 있다. 간장애 환자에게 이 약의 투여를 권장하지 않는다.
8) 간장애 환자에 대한 이 약의 약동학 및 내약성에 대해 시험한 바 없다. 트라마돌과 아세트아미노펜은 주로 간에서 대사된다. 트라마돌염산염/아세트아미노펜 일반정은 중등도 간 장애에 환자에게는 투여 간격을 연장하여 투여하는 것을 신중히 고려하고 중증의 간장애 환자에게는 투여를 권장하지 않는다.
9) 신장애 환자에 대한 트라마돌과 아세트아미노펜의 복합제에 대해 시험한 바 없다. 트라마돌의 사용 경험으로 신장애 환자에서 트라마돌과 활성 대사제 M1의 배설 정도와 배설률이 감소될 수 있다. 트라마돌염산염/아세트 아미노펜 일반정의 경우 크레아티닌 청소율이 30mL/min 미만인 환자의 경우 이 약의 투약간격을 12시간 마다 2정을 초과하여 투약하지 않도록 한다.
10) 트라마돌을 장기투여할 경우에는 의존성의 가능성을 전적으로 배제하기 어려우므로 투여기간을 조정하거나 일시적으로 휴약기간을 가진다.
11) 이 약과 파와된 유사약물을 병용할 경우에는 혈액응고시간 (INR) 증가 보고가 있으므로, 의학적적으로 적절한 경우 프로트롬빈 시간을 정기적으로 평가하도록 한다.
12) 한 연구에서 연부루편과 산화질소로 인한 마취중 트라마돌을 사용하였을 때 수술중 마취가 약해지는 경우가 증가되는 것으로 보고되었다. 추가 정보가 있을때까지 약한 수준의 마취 중 트라마돌의 사용을 피해야 한다.

6. 약물상호작용
1) 선택적세로토닌재흡수억제제(SSRI 항우울제 및 식욕감퇴제), 삼환계 항우울제 (TCAs), 다른 삼환계 약물 (예, 프로메타진 등) 및 다른 아편제제 투약 환자에서 이 약 투여시 발작의 위험이 증가될 수 있다. 트라마돌은 발작의 역치를 낮추는 MAO 억제제, 신경아민제 또는 다른 약물들을 복용하는 환자로부터 발작의 위험을 증가시킬 수 있다. MAO 억제제를 투여하고 있는 환자에게 이 약 투여시 산화작용에 대한, 동물시험에서 MAO 억제제와 트라마돌을 병용시 시험동물들이 사망 수가 증가되었다. 트라마돌과 MAO 억제제 또는 선택적 세로토닌 재흡수 억제제를 병용시 발작 및 세로토닌 증후군 등 부작용이 증가될 수 있다.
2) 카르바마제핀과 병용시 트라마돌의 혈장 농도 감소로 인하여 트라마돌 진통 효과 및 작용 시간이 유익하게 감소할 수 있다. 카르바마제핀이 트라마돌 대사를 증가시키고, 트라마돌의 발작 발생 위험을 증가시킬 수 있으므로 병용을 금한다.
3) 트라마돌은 CYP2D6에 의해 대사제 M1으로 대사된다. 퀴나딘은 CYP2D6의 선택적 억제제로서 트라마돌과 퀴나딘의 병용투여는 트라마돌의 농도를 증가시키고 M1의 농도를 감소시킨다. 이러한 현상의 임상적 중요성은 아직 모른다. 인해 간 마이크로소 생성의 약물상호작용 시험에서 트라마돌은 퀴나딘 대사에 영향이 나타나지 않았으며, 플루세틴, 파록세틴, 이미트립틸린과 같은 CYP2D6 저해제와의 병용투여는 트라마돌의 대사를 일부 저해하였다.
4) 케토코나졸과 에리스로마시딘과 같이 CYP3A4를 저해하는 것으로 알려진 기타 약물들은 트라마돌의 대사 (N-디메틸화)를 저해할 수 있고, 활성 O-디메틸화 대사의 대사 또한 저해할 수 있다. 이러한 상호작용의 임상적 의미에 대해서는 연구된 바 없다.
5) 아세트아미노펜의 흡수 속도는 메토프로콜라미드 또는 토플라이드으로 증가될 수 있으며 클레스타티린으로 흡수가 감소될 수 있다.

7. 소아 및 노인에 대한 주의
1) 소아에 대한 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않다.
2) 간, 신장, 심장 기능이 저하 및 동시에 수반되는 질환과 다양한 약물치료가 더 자주 일어날 수 있으므로 노인환자에서 이 약의 투여를 주의하여야 한다.
8. 임부 및 수유부에 대한 주의
1) 임부에 대한 적절한 임상시험은 실시된 바 없으며, 태아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우 투여한다.
2) 트라마돌과 그 대사체는 유모에서 소량 분비되므로, 수유하는 투여하지 않는 것이 바람직하다.

9. 운전, 기계조작에 대한 영향
트라마돌은 졸음이나 현기를 일으킬 수 있으며 이것은 알코올 또는 기타 중추신경계 억제제에 의해 증강될 수 있다. 민첩성에 영향을 주며 때문에 운전이나 기계조작과 같은 위험 가능성이 있는 행위시 주의하도록 한다.

10. 과량 투여시의 처치

- 과량 투여시 트라마돌 독성, 아세트아미노펜 독성 또는 두 약물 모두의 독성 증상 및 징후가 나타날 수 있다.
1) 트라마돌 과량 투여시 호흡억제, 기면, 혼수 발생, 사망의 심각한 증상이 나타날 수 있다.
2) 아세트아미노펜 과량 투여시 사망을 야기하는 간장의 소염성증상 고사기 나타날 수 있으며 신장의 세노 과다, 저혈압, 응고장애가 일어날 수 있다. 아세트아미노펜 과량 투여시 초기 증상은 구역, 구토, 권태감 등이 나타나며 간독성의 임상과 실험실적 증가는 48~ 72시간 후에 더 나타나지 않을 수 있다.
3) 과량투여시 응급조치가 가능한 기관이나 병원으로 연락하도록 하며, 일반인과는 치치별과 함께 적절한 호흡이 유지될 수 있도록 한다. 날록손 투여로 트라마돌 과량 투여로 유발된 증상을 일부 회복시킬 수 있으나, 발작의 위험이 증가된다. 트라마돌 사용 경험상 혈액투석은 4시간 투여하여 투여량의 7%가 제거되었으며 과량투여시 처치법으로 유용하지 않다. 아세트아미노펜의 과량 투여시에는 10~ 12시간 이내에 N- 아세틸 시스테인을 정맥주사하거나 메치오닌을 경구투여하여 간을 보호한다.

11. 의약품동등성시험 정보

- 공복시험
가. 시험약 아세트아미노펜/트라마돌염산염 650/75mg(한국콜마(주))과 대조약 윌트란서방정(대원제약(주))을 2×2 교차시험으로 각 1정씩 건강한 성인에게 공복 시 단회경 투여하여 31명의 혈중 아세트아미노펜 및 트라마돌을 측정한 결과, 비교평가항목치(AUC, C_{max})를 로그변환하여 통계 처리하였을 때, 평균치 차의 90% 신뢰구간이 log 0.8 에서 log 1.25 이내로서 생물학적으로 동등함을 입증하였다.

(1) 아세트아미노펜		비교평가항목		참고평가항목	
구분		AUC _{Co-24hr} ($\mu\text{g} \cdot \text{hr/mL}$)	C _{max} ($\mu\text{g/mL}$)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)
대조약	윌트란서방정 (대원제약주)	31.41±6.29	4.486±0.925	1.0(0.5~3.0)	8.92±3.87
시험약	아세트아미노펜/트라마돌 염산염 650/75mg (한국콜마주)	32.12±7.30	4.667±0.885	1.5(0.5~3.0)	7.37±2.56
90% 신뢰구간* (기준 : log 0.8 ~ log 1.25)		log0.9907~ 1.0441	log0.9904~ 1.0974	-	-

(AUC, C_{max}, t_{1/2}: 평균값±표준편차, T_{max}: 중앙값(범위), n=31)
AUC: 투약시간부터 최종혈중농도 정형시간 t까지의 혈중농도-시간곡선하면적
C_{max}: 최고혈중농도
T_{max}: 최고혈중농도 도달시간
t_{1/2}: 말단 소실 반감기
* 비교평가항목치를 로그변환한 평균치 차의 90% 신뢰구간

* 비교평가항목치를 로그변환한 평균치 차의 90% 신뢰구간

(2) 트라마돌		비교평가항목		참고평가항목	
구분		AUC _{0-24hr} (ng·hr/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)
대조약	윌트란서방정 (대원제약(주))	2052±553	161.3±26.5	5.0(3.0~6.0)	7.19±1.84
시험약	아세트아미노펜/트라마돌 염산염 650/75mg (한국콜마(주))	1898±464	151.7±24.7	5.0(3.0~6.0)	7.13±1.99
90% 신뢰구간* (기준: log 0.8 ~ log 1.25)		log0.9056~ 0.9596	log0.9110~ 0.9696		

(AUC, C_{max}, t_{1/2}: 평균값±표준편차, T_{max}: 중앙값(범위), n=31)
AUC: 투약시간부터 최종혈중농도 정형시간 t까지의 혈중농도-시간곡선하면적
C_{max}: 최고혈중농도
T_{max}: 최고혈중농도 도달시간
t_{1/2}: 말단 소실 반감기
* 비교평가항목치를 로그변환한 평균치 차의 90% 신뢰구간