

	일반의약품
---------------	--------------

세스콘보아정

	V210723
---------------	---------

※ 의약품은 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고오고 약과 함께 보관하십시오.

[원료약품 및 그 분량] 1정 중
■ 주요성분 : 페니실로게스트렐(USP).....0.1mg
에티날에스트라디올(USP).....0.02mg
■ 첨가제(동등물량) : 유당수화물(KP) 소수유
기타 첨제 : 정질수구산, 스테아르산, 오프도라비룡산(0.3F84827), 전산화전분, 토크메인, 포베돈
[성질] 전용성의 현형 필름코팅정

[효능·효과]
- 피임
- 이 약을 복용할 수 있는 여성의 증증도의 여를 치료

[용법·용량]
일 정형 21일간 복용하고 7일간 휴약한다. 매일 같은 시간에 복용하는 것이 좋다.
- 처음 복용할 경우
월경이 시작되는 일주일부터 복용을 시작하여 이 약을 21일간 매일 복용해서 복용하고 7일간 휴약한다. 월경은 보통 이 약을 복용을 중단한 후 3일 이내에 나타난다. 만약 월경 시작 첫날 이후에 이 약의 복용을 시작할 경우, 이 약을 연속해서 7일간 복용하기 전까지 완전한 피임포장을 기대 할 수 없고 다른 보조의 비호르몬적 피임법(구경조임법)이나 기초온반을 제외한 방법 : 예 - 피임기구를 병용해야 한다. 지시한 용법을 잘 지키면 임신 가능성이 거의 없지만 만약 월경이 없으면 임신 가능성이 있다고 판단해야 한다. 지시한 용법을 잘 지키지 않았거나 연속 2회에 걸쳐 월경이 없으면 계속 복용하기 전에 이미 임신한 상태 및 임신의 가능성을 고려해야 한다.
- 계속 복용할 경우
7일간 휴약 후 다음날 다시 복용을 시작한다. 만일 휴약 후 8일이 지나 복용하기 시작한 경우에는 계속 7일간 복용할 때 다른 보조의 비호르몬적 피임법(구경조임법)이나 기초온반을 제외한 방법 : 예 - 피임기구를 병용해야 한다. 지시한 용법을 잘 지키면 임신 가능성이 거의 없지만 만약 월경이 없으면 임신 가능성이 있다고 판단해야 한다. 지시한 용법을 잘 지키지 않았거나 연속 2회에 걸쳐 월경이 없으면 계속 복용하기 전에 임신 가능성이 있다고 의사의 진단을 받아야 한다.
- 복용을 잊었을 경우
한 정을 잊었을 지 못했는 경우 생각할 때 즉시 그 1정을 복용하고 그 후 계속 복용한다 대로 복용한다. 즉 하루에 2정을 복용하게 되는 것이다. 이 약의 1주제 또는 2주제 복용분 중 2정을 잊고 복용하지 못했는 경우 생각할 때 즉시 2정을 복용하고 다음날 2정을 복용한 후 계속 1정씩 복용한다 대로 복용하여 이 하려 계속 7일간 복용할 때까지 다른 보조의 비호르몬적 피임법을 병용해야 한다. 3정 이상을 복용하지 못했는 경우 및 이 약의 3주제 복용분 중 2정을 잊고 복용하지 못했는 경우에는 나머지 약을 버리고 생각할 때 즉시 세포장된 복용을 시작하여 하려 계속 7일간 복용할 때까지 다른 보조의 비호르몬적 피임법(구경조임법)이나 기초온반을 제외한 방법 : 예 - 피임기구를 병용해야 한다 그 다음에 월경이 있을 수 있다. 그러나 만약 연속 2회에 걸쳐 월경이 없으면 임신가능을 가능성이 있으므로 의사의 진단을 받도록 한다.
- 다른 경구피임제를 복용하다가 변경할 경우
21일 복용종료 후 되어 있는 다른 경구피임제를 사용하다가 이 약으로 변경할 경우에는 기존 제제의 유효성분과 약효의 정를 병용한 후 7일의 휴약기간 후 다음날부터 이 약의 복용을 시작한다. 아마 휴약기간 중에 월경이 생길 것이다. 20일 복용종료 후 되어 있는 다른 경구피임제를 사용하다가 이 약으로 변경할 경우에는 기존 제제의 유효성분의 마지막 정를 복용한 후 바로 다음날 이약의 복용을 시작한다.
- 분만 또는 임신 중임 시기에 복용 후 복용
분만 직후엔 혈전색전증의 위험이 증가될 수 있으므로, 출산 후 또는 임신 중임분기 유산한 후에는 4-6주 후에 경구피임제의 복용을 시작하도록 한다.

[사용상의 주의사항]
1. 경고 : 출산전 경구피임제로 인한 심각한 심혈관계 부작용(혈전증 등의 위험성을 증대시키며 이 위험성은 나이와 혈연(혈 및 15%)에상에 따라 증가되고 특히 35세 이상의 여성에게 한층더 나타나므로 경구피임제를 투여하는 여성은 출원을 삼가 한다. 또한 35세 이상 혈연자는 이 약을 투여해서는 안된다.
2. 다음 환자에는 투여하지 말 것
1) 에스트로겐 과민성 증후 (예, 자궁내막염, 또는 유방암이 있거나 의심이 되는 환자 및 그 병력이 있는 환자(종양을 악형 또는 현상화시킬 수 있다)
2) 혈전성 동맥색전, 혈전색전증 환자 또는 그 병력이 있는 환자(혈전성 경염이 증가될 수 있다), (현재 또는 과거의 심낭색전혈전증 환자, 선천성 또는 후천성 혈전성증후(thrombophilias) 환자
3) 뇌졸중 또는 관상동맥질환환자 심근경색 환자
4) 진단되지 않은 비당성아민 병상기 출혈 환자
5) 중증도 및 중증 간질환 환자
6) 중증도 및 중증 간질환 환자
7) 두번-존슨 증후군 및 로렌츠회근 환자
8) 황달, 담낭염, 간염(바이러스성 및 비바이러스성) 및 양성 또는 악성 간종양 환자 또는 그 병력이 있는 환자
9) 경성적혈구빈혈 환자
10) 혈관변성을 수반하는 중증 당뇨병, 중증고지혈증, 고지단백혈증 및 포도당증 등의 중증대사장애 환자
11) 임신중 지속적인 가려움, 임신포진, 유행포창(痲瘋癩) 또는 이형종증의 병력이 있는 환자
12) 간부 또는 신장하고 있는 기능성이 있는 분만 및 수유부
13) 뇌하수체 종양 환자
14) 유루증을 수반할 수 있는 고프로틴혈증 환자
15) 이 약 성분에 과민증 환자
16) 성형암절(痲瘋癩), 성형암절(痲瘋癩) 등의 전조를 수반하는 편두통 환자
17) 폐고혈압 또는 심방세동을 합병한 심장병(심장증) 환자
18) 미용성 색전성 신막염의 병력이 있는 심방성막증 환자
19) 혈관병변을 수반한 당뇨병 환자(당뇨병성 신증, 당뇨병성 망막증 등)
20) 혈당증이나 심한 포도과리제리드알증과 관련된 병력을 가진 환자
21) 전조(aura)와 같은 국소성 신경학적 증상을 수반하는 두통 환자
22) C형 간염 직접 작용 해마이리제(Direct-acting antiviral, DAA) 환자 (현재(5, 6)단계의 경우 참조)
23) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토제 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당불내효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에는 투여하면 안 된다.
24) 선천성 또는 후천성 과응고증후(hypercoagulopathies) 환자
25) 35세 이상 흡연자
3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
1) 흡연자
2) 고혈압 환자

3) 비만자
4) 40세 이상의 여성(일반적으로 혈전증 등의 심혈관계 장애가 발생하기 쉬운 나이)
5) 간질 환자
6) 편두통 환자
7) 동맥질환의 가족력이 있거나 정맥류의 병력이 있는 환자
8) 전신성 홍반성 루푸스 환자
9) 유방암의 가족력이 있는 환자
10) 우울증 및 그 병력이 있는 환자
11) 심·신부전 환자
12) 비선형적 과다중식된 유선병증 환자
13) 유방결절의 병력이 있는 환자
14) 심장병(심장병, 동맥색전증 환자 및 그 병력 또는 가족력이 있는 환자
15) 고지혈증의 가족력이 있는 환자
16) 담낭질환 및 담낭증의 병력이 있는 환자
17) 자궁내막증 환자
18) 전신 또는 기미 환자
19) 알코올발효신증에 환자
20) 당뇨병 환자
21) 전조를 수반하지 않는 편두통 환자

4. 이상반응
1) 심혈관계 : 혈전성 정맥역, 혈전증 및 동맥성 혈전색전증, 뇌졸중, 뇌출혈, 뇌혈관질환, 심근경색, 폐색전증, 혈관질환, 정맥류 악화
2) 비호르몬성기 : 월경불규칙(정상출혈, 과다출혈), 월경증 변화 및 무월경, 질분비불형, 자궁근종 크기의 증가, 자궁경부암(만, 잘나디다증, 질염, 질양종증등), 융합성 요추종추근, 질경근관
3) 유방 : 유방직장암 및 기타, 유루증, 유방염, 양성유선병증, 유방암, 유방비만
4) 소화기계 : 구역, 구토, 복부팽만감, 복부경련, 위장장애, 담낭돌이, 무당당성 간염, 담낭결석 형성, 악성 및 양성 간종양에, 초장성 결장성 과다성 간선종, 결장암으로부터 자양적 복부나 출혈이 생길 수 있다. 프로스타틴의 악화, 만성 염증성 결장염 (크로네르, 궤양성 대장염), 복통, 복강염, 간세포손상 등, 담석증을 포함한 담낭질환 (장담 역류성 또는 담낭질환을 악화시킬 수 있고 이전에 자각증상이 없었던 여성에서 이 질환을 유발을 촉진시킬 수 있다), 허혈성 대장염, 간세포성 손상 (예, 간염, 간기능 이상), 실사
5) 중추신경계 : 두통, 편두통, 우울증, 어지러움, 신경과민, 두도병의 악화, 간질, 자각각각각각, 해열, 조절 장애, 기분불안
6) 피부 : 기미 및 기미의 지속, 여드름, 다형성 홍반, 홍반성 홍반, 전신성 홍반성 루푸스의 악화, 출혈성·알러지성 발진, 피부색, 기려움, 두드러기, 두근, 조증, 발모, 탈모
7) 눈 : 시각장애, 각막결막염, 콘택트렌즈에 대한 감수성 증가, 망막혈전증, 시신경염(부분적 또는 완전한 시신경손상을 초래할 수 있다)
8) 귀 : 청각장애
9) 기타 : 나열된 및 제재처, 내당력 감소, 당뇨병, 고트리글리세리드증, 고콜레스테롤혈증
10) 기타 : 중독현상, 식욕부진, 성욕변화, 언어장애, 드물게 프로락틴성 뇌하수체종양(때때로 유루증이 나 타남), 이차발작/이차발작성 발진(빈동맥도그), 혈관부종, 그리고 호흡기 및 순환기 증상을 수반한 심한 반응을 포함, 혈당상승농도증, 과민증

5. 일반적 주의
1) 의약품(을 시작하기 전에 의학적 및 가족의 병력을 조사하고 이 약 투여 중 혈압, 유방, 복부 및 자궁경부세포조사를 포함하는 골반기관에 대해 적어도 1년에 한번 검진을 받도록 한다. 혈전색전증의 가족력은 있는 경우 이 약 처방전에 혈전증을 촉진하는 인자의 유무를 검사하는 것이 바람직하다.
2) 자궁경부암의 가장 중요한 위험요인은 자식적인 인유전적이나 감염이다. 경구피임제의 투여로 유방암, 난소암, 자궁경부암 및 자궁내막암의 발생률이 증가하여 높아진다는 보고되고 이러한 난소암과 자궁내막암의 위험을 줄인다는 보고도 있다. 그러나, 이러한 결과가 생행위 및 다른 요인에서의 차이점 때문이라는 것에 대해서 논쟁이 계속되고 있다.
3) 유방암의 발병률은 투여 중단후 10년 동안 점차적으로 감소한다는 보고가 있다. 또한 유방암의 발병위험과 자궁경과라는 상관관계가 적어도 투여중단 20년이 경과할수록 위험도가 증가한다는 보고가 있다. 이러한 연구는 인과관계의 증거를 제시하지는 않는다. 유방암 진단 위험성 증가의 양상은, 경구용 피임제 복용자에게서도 정기적인 암검 모니터링으로 인해 초기에 유방암이 진단될 것이라는, 경구용 피임제의 생행위적 증가에, 또는 이 두 가지의 복합적인 결과일 수도 있다. 유방암은 40세 이하 여성에서는 드물지만 때때로 악성까지 발전 유방암의 위험성과 관련하여 볼 때, 현재 또는 최근의 경구용 피임제 복용자에게 진단된 유방암의 초과치자이다. 계속 복용자에게 진단된 유방암은 비복합성(비자궁내관 진단된 유방암에 비해서 양성종양에 밀 진행하는 경향이 있다.
4) 혈전증의 위험성 증가를 지니는 여성 중수 전 4주 및 수술 후 2주 동안 그리고 장기간 활동하지 않을 때에는 이 약의 투여를 중단한다. 출산 직후 기간은 혈전색전증의 위험성 증가와 관련이 있으므로, 분만 및 또는 임신기간 유산후 28일 이내에 이 약의 투여를 시작해서는 안 된다.
5) 이 약 투여기간 중에 경미한 출혈이 나타나더라도 계속 투여한다. 이러한 출혈은 보통 일시적이며 자발적으로 멈추나, 출혈이 경미하거나 출혈량이 과다한 경우에는 투여를 중단하고 의사와 의사와 상 의한다. 부위 여하에는 후약지혈용안 소색성출혈이 있을 수도 있다. 지시하 따라 약을 복용하지 않은 경우에 처음으로 소색성출혈이 있었거나 2번 연속 소색성출혈이 있었다면, 이 약의 투여를 중단하고 임신 가능성이 의심되는 때까지 비호르몬적 피임방법을 사용한다.
출혈이 지속되거나 재발할 경우에는, 비호르몬적 만안을 고려해야 하며 적절한 진단방법을 지시해야 한다. 만약 혈색적지 분제가 아닌 경우에는, 경구용 피임제를 지속적으로 복용하거나 다른 제제로 바꾸어 문래를 해결할 수 있다.
이 약을 사용하는 여자의 경우, 양치를 하지 않아도(다도 메정전(소색) 출혈이 있을 수 있다. 그러나 예정된 출혈이 발생하지 않을 경우, 임신의 가능성을 고려해야 한다. 만약 복통 일출을 준수하지 않았다면 처음으로 출혈을 하지 않은 시점에 임신 가능성이 고려하고 적절한 진단 검사를 시행한다. 만약 약을 잘 복용하고 2년 연속 출혈을 하지 않았다면 임신 가능성이 배제된다.
6) 이 약 투여를 중단하면 생식기간은 곧 재 기능을 발휘하여 정상적인 임신능력을 회복하게 되며 2번 배배 월경은 생식보다 약 1주일 정도 늦어질 수 있다. 그러나, 1년 2-3월 이내에 정상적인 기로 회복되지 않은 의사는 또는 약사의 상담한다.
7) 경구피임제의 투여는 정맥성 및 동맥성 혈전증, 그리고 혈전색전증의 위험성 증가와 관련이 있다.
8) 정맥성 혈전증증은 유방 질환 인자로는 정맥성 혈전증의 가족력, 정맥류, 나이, 비만자(BMI)가 30kg/m² 이상인 경우 등이 있다. 비만, 혈전증의 위험성이 증가된 수술 또는 외상, 최근의 분만 또는 임신 중 2초(2-second-trimester) 유산, 그리고 장기간 활동하지 않을 경우, 정맥성 혈전증 및 혈전색전증 위험이 있다.
9) 경구피임제의 투여는 동맥성혈전증 및 혈전색전증의 위험을 증가시킨다. 심근경색증과 뇌졸중(과제혈형 혈형 및 출혈성 뇌졸중) 증가와도 관련이 있다. 동맥성 혈전증 및 혈전색전증의 위험성은 경구 피임제 사용 여하에 따라 임상적으로 동맥성 혈전증 및 혈전색전증 위험인자를 지니는 여성에게 경구 피임제를 처방할 때에는 주의해야 한다.
동맥성 혈전증 및 혈전색전증 위험 인자로는 특정 선천성 및 후천성 thrombophilias, 고혈압, 고지혈증, 당뇨병, 나이, 내이 등이 있다. 35세 이상의 여성은 복합경구피임제 투여 시작 전에 심혈관계 질환 또는 정맥혈색전증의 위험을 증가시킬 수 있는 기타 위험인자에 대해 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증, 비만을 고려해야 한다.
10) 많은 정맥성 혈전색전증의 경우 증상이 명확하지 않으므로 경구피임제를 투여중인 환자는 혈전증이

이상되는 경우 또는 혈전증 진단 후에는 이 약의 투여중지를 고려한다.
에티날에스트로진(프로게스틴 보형제에 대해서도, 실험혈액이 낮고 각 개인에 필요에 맞는 최소 용량의 에스트로겐 및 프로게스틴을 처방하도록 한다.
경구용 피임제를 처음으로 복용하는 경우에는, 50mg 미만의 에스트로겐을 함유한 제제로 복용을 시작하도록 한다.
경구피임제의 투여는 심근경색, 뇌졸중, 심장 장애 혈전증, 폐동맥 색전증과 같은 정맥성 혈전증 및 혈전색전증의 위험을 증가시킨다. 경구피임제를 복용할 경우 복용하지 않는 경우에 비해 정맥성혈전증 및 혈전색전증의 위험이 증가한다. 정맥혈전색전증의 위험은 복합경구피임제를 투여하는 첫 해 동안 그리고 4주 이상 복용하기 이후 호르몬피임제 사용을 재시작할 때 가장 높다. 특히 경구피임제를 복용한 증가는 약에에 있어서 처음 1년간 과도위험이 가장 높다. 정맥성 혈전증 및 혈전색전증의 위험성 증가는 임신과 관련된 경기에 년간 여성 100,000명당 60건으로 예상되는 위험성보다 낮았다. 긴 중 1-2주에 해당하는 정맥성 혈전색전증은 저평가되었다.
역학조사결과에 따르면 재능도의 에스트로겐 (에티날에스트라디올 (50mcg) 경구피임제 사용에서 정맥성 혈전색전증의 발현율은 년 간 여성 100,000명당 20-40건이었다.
11) 경구피임제를 중단해야 할 때 임신으로 인한 위험이 경구피임제 투여로 인한 위험의 2배 이상인 경우 경구피임제를 중단해야 할 때에는 다른 피임법을 고려한다.
12) 다른 경구용 피임제와 같이 이 약은 HIV증(에이즈) 및 다른 성병의 예방 기능이 없다.
13) 신장 위양과제 질환이 있는 경우, 흡수가 불완전할 수 있으므로 피임법을 사용해야 한다.
14) 트리코클로에이드 수치가 높은 환자에서는, 에스트로겐 함유 제제가 드른 경우 혈장 트리코클세리드 수치를 크게 증가시켜 혈당증을 초래할 수도 있다.
15) 우울증과 병발이 있는 여자의 경구용 피임제를 복용할 경우에는 주의깊게 관찰하고, 우울증이 재발하거나 나쁜 경향에는 투여를 중단한다. 경구용 피임제를 복용하는 동안 우울증이 유발하게 나서는 경우 이는 투여를 중단하고, 증상이 악화과 관련된 것까지 확인하기 위해 대체 피임방법을 사용하도록 한다.
16) 실신 및/또는 두근 또는 드문 흡수 감도 혈당증도 관심을 초래할 수 있다.
17) 경구피임제의 투여로 부종적 또는 전제적인 시력상실을 초래할 수 있는 망막혈관질환이 보고되었다.
18) 만일 사각막염, 안과질환증 또는 비, 유두부종, 또는 망막혈관순상등의 증상이 발생하면 투여를 즉시 중단하여 만안을 의사와 상담한다.
19) 약을 드른 경우 간질환 및 자하에 드른 경우 간세포증은 경구용 피임제의 사용과 관련이 있을 수 있다. 이 위험성은 경구용 피임제 복용기간에 따라 증가하는 것으로 나타났다. 간선종의 파열은 복강 내 출혈로 투여를 중단할 수 있다.
경구피임제와 관련된 간염증과 병발이 있는 여성 또는 임신 중인 간염증(염인 여성은 경구피임제 사용으로 간염증에 추가될 가능성이 높다. 이러한 환자들에 경구피임제를 복용하는 경우 신중히 모니터링되어야 하며, 간염증에 재발할 경우 경구피임제 투여를 중단해야 한다.
경구피임제 사용에 있어서 간세포성 손상이 보고되었다. 약과 관련된 간세포성 손상을 초기 발견할 경우, 이 약의 투여 중단을 통해 간세포 손상의 중증도를 감소시킬 수 있다. 다른 간세포성 손상이 진단되면, 환자는 경구피임제 사용을 중단하여 비호르몬적 피임방법을 사용해야 하며 의사와 자문을 구해야 한다.
금단 또는 만성 간기능의 장애의 경우, 간기능이 정상화될 때까지 경구피임제를 중단할 필요가 있다.
18) 경구피임제를 복용한 여성에서 혈당장애가 보고되었다. 고혈압, 고혈압의 병력 또는 고혈압과 관련된 질환이 있는 여성은 경구피임제 다른 피임법에 더 바람직할 수 있다. 이러한 약물에 경구피임제를 사용한 경우 혈화한 모니터링이 권고되며, 더 바람직하게 혈당이 상승하면 투여를 중단해야 한다. 적절하고 관련된 경구 피임제 치료로 정상 혈당에 도달하면 경구피임제를 다시 시작할 수 있다.
20) 편두통이 병발 또는 악화되거나 재발적 지속적 또는 중증의 두통이 드로운 형태로 발생하면 경구피임제의 투여를 중단하고 원인을 조사해야 한다. 경구피임제 사용자 중 편두통(특히 전조를 동반한 편 두통)이 있는 경우 뇌졸중의 위험을 증가시킬 수 있다.
21) 유산성 및 후천성 혈관병력이 있는 여성들에게 임신성 에스트로겐은 혈관부종의 증상을 유발하거나 악화시킬 수 있다.
22) 이 약은 7일간여성에 대해서 안전성 유효성이 확립되었다. 이 약은 초경 전 여성에 대해 적용되지 않다.
23) 이 약은 폐경 후 여성에 대해 적용되지 않는다.
24) C형 간염 : 올비타트(비/파리타프레비르/리타나비르 복합제로 수행한 C형 간염 해마리사제와 에티날에스트라디올을 함유 복합경구피임제 병용 투여시 ALT 상상이 관찰되었다.
25) 이 약은 내과를 감소시킬 수 있으므로 당뇨병이 있는 여성에게 투여 시 주의깊게 모니터링해야 한다.
26) 조혈되지 않은 이상지질혈증 환자는 대체 피임법을 고려해야 한다. 이 약은 이상 지질 변화를 일으킬 수 있다.
27) 이 약에 포함된 에스트로겐 성분은 간상선-결합 글로불린(thyroid-binding globulin), 성호르몬-결합 글로불린(sex hormone-binding globulin) 및 코르티솔-결합 글로불린(cortisol-binding globulin)의 혈중 농도를 증가시킬 수 있다. 갑상선 호르몬 또는 코르티솔 사용으로 시 용량 증가가 필요할 수 있다.
28) 이 약 사용 시 기기가 발할할 수 있으며 특히 임신성 기기를 경험하면 여성에게 발생할 수 있다. 기기를 경험한 여성의 경우 이 약 복용 중 대양양 또는 자외선 노출을 피해야 한다.
6. 상호작용
1) 비특이하게 혈액, 항원(간세포백식세포를, 카바라제핀, 펩티딘, 카바토민, 프리리딘, 리파루민, 리람 파신, 형용성결합단백질, 테트사이클린, 글리사요올린, 루비나이드, 이파르피리드, 보센, 에비비엔, 조, 빌베마이드, 옥사카바제핀, 약용관, 한하와제 병용투여시 혈중구기 변화, 과다성 출혈이 나타날 수 있고 경구피임제의 신진대사 촉진으로 피임효과가 감소될 수 있으므로 이러한 약물을 투여하는 기간 중 및 투여 중단 후 28일까지 자전피임법을 이 약과 병용하여 사용해야 한다.
2) 경구피임제는 내당력을 감소시키고 인슐린 또는 혈당강화제에 요구를 증가시킬 수 있다.
3) s-치트제(메트포르름, 빅토사(메포르판 병용투여시 이 약들의 작용이 강화되고 연장될 수 있다.
4) 시아노코발린과 병용 투여시 간 배설 감소로 혈청 시아노코발린 농도는, 코바메드(사이아니네 나제 농도 등의 증가가 나타날 수 있다.
5) 리토나비르, 세트트리스톨(S. John's wort, Hypericum perforatum)과 병용투여시 에스트로겐 농도 감소로 내과적 반응을 감소시킬 수 있다.
6) 코다나비르와 병용투여시 치료기간 이후 주7동안 호소유도로 피임효과를 감소시킬 수 있다.
7) 플루바나지드와 병용투여시 유루증이 나타날 수 있다.
8) 에티날에스트라디올을 함유제제 및 에티날에스트라디올의 혈중 농도 감소를 초래할 수 있는 성분과 병용하는 등에는, 이 약 복용에 추가로 비호르몬적인 보조의 피임 방법(분류 및 실험제)을 사용하도록 권장한다. 이러한 성분을 함께 사용하는 경우, 경구용 복합피임제와 s-치 마임법으로 고려해서는 안 된다.
9) 에티날에스트라디올의 혈중 농도를 감소시킬 수 있는 성분과 투여 중단 후, 최소한 7일간은 피임 효과를 초래한 보조의 피임 방법이 권장된다. 간 미소세관을 포함하여 에티날에스트라디올의 혈중 농도 감소를 초래하는 성분이 투여 중단 후에는, 더 오랫동안 증상의 영향을 미친다. 율증, 투여기간 및 유도 돌출된 제제에 따라 투여 후 호소 유도가 완전히 사라질 때까지 주의가 소요될 수 있다.
10) 위양전 전이사(Translational transl. time)를 감소시키는 성분과 에스트로겐의 장간소화를 감소시키는 항제제(페리타린, 테트사이클린)는 에티날에스트라디올의 혈중 농도를 감소시킬 수 있다.
11) 에티날에스트라디올을 함유한 복합경구피임제와 아도르나비르 농도는 국부세스타론을 병용 투여하면

에티날에스트라디올의 AUC가 약 20-25% 증가한다.
위양전 백색사 융합(saturation)에 대한 정맥적 제해제인 아스코르빈산(아스코르)과 파파세라 및 간 호소 P450 3A4를 제해하는 이트라코나졸, 보리코나졸, 케토코나졸, 지무주스, 인디나비르, 플루코나졸, 트롤린도미아신은 에티날에스트라디올의 혈중 농도를 증가시킬 수 있다. 트롤린도미아신은 경구용 피임제의 병용투여 할 경우, 간내복용제적 위험성을 증가시킬 수 있다.
12) 호르몬 비임약과의 병용투여시 다수의 HIV 프로테아제 제해제(간상제) 펠리나비르, 리토나비르, 다투나비르/리토나비르, (소스)안파레비르/리토나비르, 로피나비르/리토나비르, 타포라비르/리토나비르) 또는 중(제)에: 인디나비르, 아타자비르/리토나비르) 또는 비뉴클로시드 역전사효소억제제(NNRTI, 간상제) 네라비린, 또는 중(제)에: 에트라비렌) 또는 C형 간염 해마리사 프로테아제 제해제(간상제: 보비트페리르, 펠라프레비르)가 에스트로겐 및/또는 프로게스틴의 혈중 농도를 유의하게 변화시킬 수 있다.
13) 이 약과 같은 에스트로진(프로게스틴 복합제)는 다른 약물들의 대사에 영향을 미칠 수 있다. 따라서 혈중 및 조직내 농도가 중(제)에: 아미노글리코사이드, 페르다나솔, 지오콜린, 티파나드, 보리코나졸)하거나 간상제에: 라모트라진, 이세티미드, 모로핀, 살리실산, 테트라하이드로 수 있다. 라모트라진 혈중 농도가 유효하게 감소되면 발작 조절이 감소할 수 있으므로 라모트라진 용량 조절이 필요할 수 있다. 갑상선 호르몬 또는 코르티코스테이드 대역요변으로 치료 중인 여성은 복합경구피임제 사용으로 갑상선-결합 글로불린(thyroid-binding globulin) 및 코르티솔-결합 글로불린(cortisol-binding globulin)의 혈중 농도가 중(제) 수 있으므로 갑상선 호르몬 또는 코르티솔 용량 조절이 필요할 수 있다.
14) 혈당상조작용의 장애증을 확인하기 위해서는 병용투여하는 약물의 처방내역을 고려하도록 한다.
15) 올비타트(비/파리타프레비르/리토나비르 복합제로 수행한 C형 간염 해마리사제와 에티날에스트라디올을 함유 복합경구피임제 병용 투여시 ALT 상상이 관찰되었다.
16) 갑상선 제제(zile acid sequestrant)인 콜레스티라임과 복합경구피임제를 함께 투여하면 에티날에스트라디올의 AUC가 유의하게 감소한다. 복합경구피임제와 에스트로겐 성분의 혈중 농도가 감소하면 점차적으로 피임 효과가 감소되는데, 이는 비특이적 경구 출혈이 발생할 수 있다. 복합경구피임제와 콜레스티라임 병용 투여 시 44간 이상 검사를 두고 따로 투여한다.
7. 일반 및 수유부에 대한 투여
1) 기형발생의 위험을 줄인다는 보고는 없으나 특히 대량 복용시 태아(3개월부터)의 위험 가능성을 완전히 배제할 수 없으므로 태아 전에 임신은 피하도록 하여 임신 확인되면 즉시 투여를 중지한다. 경구용 약(혈액에서 임신 전 경구용 피임제를 사용한 여성으로부터 태어난 아이에게 출산 기형의 위험성을 증가)는 나타나지 않는다.
2) 임신시작시 위약 복용을 유도하기 위해 복합경구피임제를 사용해서는 안된다. 임신 중 적발 유산 또는는 상관성 유산을 치료하기 위해 복합경구피임제를 사용해서는 안된다.
3) 이 약 성분중 일부가 모유에 이행되어 영아에게 할당 될 수 있으며 유방축적 후 부작용이 보고된 바 있고 모유와 약을 재배시킬 수 있으므로 수유부에는 투여하지 않는다.
4) 임신중 혈당의 변화에 있는 환자는 에스트로겐 함유 경구피임제 투여시 혈당이 재발될 수 있으므로 중증 임신과 태아에 대한 투여를 즉시 중단한다.
8. 과량투여
1) 약의 성분 및 소아에서, 경구용 피임제의 과량투여 시 구역, 구토, 가슴조림, 어지러움, 복통, 울혈/피로 등이 나타날 수 있고, 중상에서는 소색성 출혈이 나타날 수 있다. 과량투여에 대한 특별한 해독제 및 추가 치료는 없으며, 필요한 경우 증상에 대해 치료한다.
9. 임상연구에서의 영향
경구피임제는 다음과 같이 나타낸 7가지 사항과 혈액 내용물에 영향을 미칠 수 있다.
1) 프로콜린 및 응고인자 V, VII, IX, X의 경우, 항콜린 및 간소, 노르메파드린으로 인한 혈소판 응 집성의 증가
2) 단백질결합 요오드(티), 칼륨 분석 또는 방사선분석(색분석에 의한 T ₄ 농도 및 방사선 면역분석법에 의한 T ₃ 농도 측정에 따르면, 갑상선 결합 글로불린(TBG) 증가에 의해 순환하는 총 갑상선 호르몬의 증가(T ₄ 수치 상승)는 감소하는데, 이것은 TBG의 상승을 의미하며 투여 후 T ₄ 및 T ₃ 농도는 변하지 않는다)
3) 혈청 중 다른 결합 단백질 증가
4) 글로불린결합성 스테로이드의 증가로 인한 혈액 순환의 순환하는 성스테로이드 및 코르티코이드 총량의 증가(비결합되는 혈중 농도에는 변화 없음)
5) 혈청 단백질총량에 항상
6) 내당력 감소
7) 혈청 단백질 총량도 감소
8) 테트라산 시체에 대한 반응성 경변
10. 분포 및 취급상의 주의사항
1) 약물의 분포 용지 및/또는 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원액의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.
7. 기타
외국에서 게스트된 또는 대개 제제들을 함유하는 경구피임제가 다른 피임제에 비해 정맥성 혈전색전증의 유발빈도가 높다는 보고가 있다. 외국 약학조사 결과, 정맥혈전증 위험도가 복합경구피임제를 복용하고 있는 여성이 복용하지 않는 여성에 비해 3.25~4.0(보다는 보고가 있다. 또한 정맥혈전증 위험도는 경구피임제 복용자의 혈청 1년간 기증 높다는 보고가 있다. 외국에서 경구피임제의 복용에 의하여 선천성 홍반성 루푸스의 악화, 이차발작성 증상, 융합성 요추증 증후군(LAS) 이 나타났다는 보고가 있다.

[저장방법] 차광기밀용기, 실온보관(-1~30℃)
[포장단위] 21정/PTP
[사용기한] 외부 포장 참조

◆ 사용기밀이 경과한 제품은 복용하지 마시기 바랍니다.
◆ 의약품은 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여 주시기 바랍니다.
◆ 의약품의 용이 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템 (https://nephred.mfds.go.kr/)을 참조하시기 바랍니다.
◆ 최신의 정보로 변경된 내용은 지엘메디(주) 홈페이지(https://www.gilpharma.co.kr/ja) 개발학술정보(080-850-3922)에서 확인할 수 있습니다.
◆ 본 약품들은 엄격한 품질관리(QGMP)를 통한 제품입니다. 만약 구입 시 유효기간이 경과하였거나 변질 또는 오손된 제품을 발견할 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
◆ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223), 피해구제 제도 전용 상담전화(14-3330)

첨부 문서 작성일자 : 2021년 07월 23일
제조판매처 : 지엘메디(주) 경기도 안성시 민간구 시민대로 35