

※사용 전에 사용설명서를 숙지하시고 약물관과 함께 보관하십시오.

유아프람 정 10밀리그램 (에스시탈로프람옥살산염)

유아프람 정 20밀리그램 (에스시탈로프람옥살산염)

유아프람정 10밀리그램(에스시탈로프람옥살산염)

[원료약품 및 분량] 이 약 1정 중

- 유효성분 : 에스시탈로프람옥살산염(USP)----- 12.77mg(에스시탈로프람으로서 10mg)
- 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)
- 기타 첨가제 : 이결정셀룰로오스, 스테아르산나트륨, 오파드라이II 한색(85G68914), 크로스포비든, 히드록시프로필셀룰로오스

유아프람정 20밀리그램(에스시탈로프람옥살산염)

[원료약품 및 분량] 이 약 1정 중

- 유효성분 : 에스시탈로프람옥살산염(USP)----- 25.54mg(에스시탈로프람으로서 20mg)
- 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)
- 기타 첨가제 : 이결정셀룰로오스, 스테아르산나트륨, 오파드라이II 한색(85G68914), 크로스포비든, 히드록시프로필셀룰로오스

[성상] 흰색의 타원형 필름코팅정

[효능·효과]

주요우울장애, 광장공포증을 수반하거나 수반하지 않는 공황장애, 사회불안장애(사회공포증), 범불안장애, 강박장애의 치료

[용법·용량]

1일 20mg을 초과하는 용량에 대해서는 안전성이 확인되지 있지 않다.

이 약은 1일 1회 아침이나 저녁에 식사와 관계없이 투여한다.

- 성인
 - 주요우울장애 :

성용량으로 1일 1회 10mg을 투여한다. 환자의 반응에 따라 1일 최대 20mg까지 증량할 수 있다. 이 약의 용량을 20mg으로 증량하고자 할 경우, 최소 1주 이상의 간격을 두고 증량하여야 한다.

일반적으로 항우울제의 효과 발현에는 2~4주가 필요하다. 증상이 소폭된 후에도 치료 효과를 확실히 하기 위하여 최소 6개월의 약물투여가 필요하다.
 - 광장공포증을 수반하거나 수반하지 않는 공황장애 :

초기용량으로 1일 5mg을 1주간 투여한 후 1일 10mg으로 증량하는 것이 권장된다. 환자의 반응에 따라 1일 최대 20mg까지 증량할 수 있다.

최대 효과는 약 3개월 후에 나타난다. 공황장애에 치료에 있어 이 약의 10주 이상의 장기간 투여시의 안전성 및 유효성에 대해서는 체계적으로 연구되지 않았다. 외사는 각각의 환자들을 주기적으로 재평가하여 지속적인 치료의 필요성을 결정해야 한다.
 - 사회불안장애 :

성용량으로 1일 1회 10mg을 투여한다. 일반적으로 증상의 개선을 위해서 2~4주가 필요하다. 그 이후에 환자의 반응에 따라 1일 5mg으로 감량하거나 1일 최대 20mg으로 증량할 수 있다.

사회불안장애는 만성적 경과를 나타내는 질환으로 치료 효과를 확실히 하기 위해 12주 동안 치료를 지속하는 것이 권장된다. 반응을 보이는 환자들에 대한 장기치료는 6개월간 연구되었으며 재발을 예방하기 위하여 개개의 환자별로 고려한다. 장기치료의 유효성상에 특정 장기적으로 재평가하여야 한다.

사회불안장애는 특정 장애에 대한 잘 규명된 연구 없이도, 과도한 수줍음과는 혼동하지 않아야 한다. 약물치료는 사회불안장애가 유리하게 지면 및 사회 활동을 방해하는 경우에 한해 실시한다. 약물치료와 인지행동요법의 비교는 평가되지 않았다. 약 물치료는 전체적인 치료 전략의 한 부분이다.
 - 범불안장애 :

초기용량으로 1일 1회 10mg을 투여한다. 환자의 반응에 따라 최소 1주간 투여 후 1일 최대 20mg까지 증량할 수 있다.

12주 공개투여에 반응한 환자에 대해 최소 6개월간 1일 20mg을 투여한 장기 투여 시험이 실시되었다. 외사는 각각의 환자에 있어서 이 약의 장기치료의 유효성에 대하여 장기적으로 재평가하여야 한다.
 - 강박장애 :

성용량으로 1일 1회 10mg을 투여한다. 환자의 반응에 따라 1일 최대 20mg으로 증량할 수 있다.

16주 공개투여에 반응한 환자들에 대해 최소 24주간 1일 10mg 또는 20mg을 투여한 장기 투여 시험이 실시되었다. 강박장애는 만성질환으로 증상의 회복을 확신할 수 있도록 충분한 기간 동안 투여하여야 하며, 이 약을 장기 투여할 경우에는 개개 환 자에 대한 유효성과 투여용량을 정기적으로 재평가한다.

- 신생아 환자

경미하거나 중증도의 신장애 환자의 경우 용량 조정이 필요하지 않다. 중증의 신장애 환자 (CLCR (30mL/min)의 경우 주의하여야 한다.
- 간장애 환자

초회용량으로 1일 5mg을 처음 2주간 투여하는 것이 권장된다. 환자의 반응에 따라 1일 10mg까지 증량할 수 있다.
- 투여 중단

이 약의 투여를 중단하는 경우, 급만증상 발생 가능성을 피하기 위해 최소 1~2주에 걸쳐 점차적으로 감량해야 한다.
- 정신질환 치료를 하기 위한 MAO저해제 전후 관련

정신질환 치료를 위한 MAO저해제 투약을 중단하고 동 제제 치료를 시작할 경우 적어도 14일 이상 간격을 두어야 한다. 반대로, 정신질환 치료를 위해 MAO저해제 투약을 시작하려면 동 제제 투약 중단 후 적어도 14일이 경과해야 한다.
- 리니졸리드 또는 메칠렌클로루 제제에 투여하는 환자는 세로토닌 증후군 위험성 증가 때문에 동 제제 투여를 시작해서는 안된다. 입원을 포함한 다른 중재치사술을, 더 긴기간 정신질환적 상태 치료를 필요로 하는 환자의 경우 투여를 고려하여야 한다. 이미 동 제제를 투여받은 환자에게 리니졸리드 또는 정맥주사용 메칠렌클로루 제제를 긴급히 투여할 필요가 있을 수 있으며, 리니졸리드나 정맥주사용 메칠렌클로루 제제에 대한 대체약물이 없고 특정환자에게 리니졸리드 또는 정맥주사용 메칠렌클로루 제제 치료의 유효성이 세로토닌 증후군 위험성을 상회한다고 판단되는 경우 동 제제를 즉시 중단하고 리니졸리드 또는 정맥주사용 메칠렌클로루 제제를 투여할 수 있다. 환자는 리니졸리드 또는 정맥주사용 메칠렌클로루 제제를 투여한 지 2주 또는 마지막 투여 후 24시간 중 먼 지 후 신장에서 세로토닌 증후군 증상을 모니터링해야 한다. 리니졸리드 또는 정맥주사용 메칠렌클로루 제제 마지막 투여로부터 24시간 후 동 제제 치료를 다시 시작할 수 있다.
- 비정맥투여(경구경로) 또는 국소주사로 메칠렌클로루 제제 투여 또는 동 제제를 1mg/kg 이하 정맥주사한 경우에 대한 위험성은 명 확하지 않다. 그럼에도 불구하고 임상적의 이러한 사용에 대한 세로토닌 증후군의 응급응급 가능성을 인지해야 한다.

[사용상의 주의사항]

- 경고

자살성향 및 항우울제
주요우울증이나 다른 정신과적 질환을 가진 소아, 청소년 및 젊은 성인(18~24세)에 대한 단기간의 연구에서 항우울제가 위약에 비해 자살 충동과 행동(자살 성향)의 위험도를 증가시킨다는 보고가 있다. 소아, 청소년 및 젊은 성인에게 이 약이나 다른 항우 울제 투여를 고려중인 외사는 임상적용 필요성이 위험성보다 높을지 항상 신중하게 고려해야만 한다. 단기간의 연구에서 25세 이상의 성인에게는 위약과 비교하였을 때 항우울제가 자살 성향의 위험도를 증가시키지 않았고, 65세 이상의 성인에서는 위약에 비 해 항우울제에 의한 위험이 감소하였다. 우울증 및 다른 정신과적 질환 자체가 자살 위험 증가와 관련있다. 항우울제에 치료 효과를 시작한 모든 연령의 환자는 적절한 모니터링을 받아야 하고 질환의 악화, 자살 성향 또는 자결성, 분노 또는 비정상 적인 행동의 변화가 있는지 주의 깊게 관찰되어야 한다. 환자의 가족이나 보호자 또한 환자를 주의 깊게 관찰하고 필요한 경우 의 사의 연락하도록 지도한다. 이 약은 소아 및 청소년에서의 사용은 승인되지 않았다.
- 다른 환자에게 투여하지 말 것
 - 이 약의 주성분인 에스시탈로프람, 라세미메인 시탈로프람 또는 이 약의 다른 성분에 과민성이 있는 환자
 - MAO저해제를 투여하고 있는 환자

정신질환 치료를 위해 이 약과 MAO 저해제를 병용투여하거나 이 약 투여 중단 후 14일 이내에 MAO저해제를 투여하는 것은 세로토닌 증후군 위험성을 증가시키지 때문에 금기이다. 정신질환 치료를 위해 MAO저해제 투여 중단 후 14일 이내에 이 약을 투여하는 것 또한 금기이다. (용법·용량 항 및 4. 일반적주의 항 참조)

리니졸리드 또는 정맥주사용 메칠렌클로루 제제와 같은 MAO저해제를 투여받은 환자에게 이 약 투여를 시작하는 것 또한 세로토 닌 증후군 위험성 증가 때문에 금기이다.(용법·용량 항 및 4. 일반적주의 항 참조)
 - 피오자이드를 투여하고 있는 환자
 - 선천성 QT 연장 증후군 또는 QT 간격 연장이 있는 것으로 알려진 환자
 - QT 간격 연장을 유발하는 약물을 복용중인 환자
 - 이 약의 사용을 항우울증 및 당뇨병성 갈락토제 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해소결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 이상반응

이상반응은 이 약 투여 시작 후 처음 1~2주에 가장 빈번하게 발생하였으며, 대체로 투여를 지속하면 강도와 횟수가 감소하였다. 1) SSRIs에 약물에서 알려지고, 이 약의 위약-대조 임상 시험 또는 시판 후 자발 보고서에 나타난 이상반응을 아래 표에 기간제와 인도 별로 정리하였다.

발생빈도는 임상시험에서 얻어진 결과이며, 위약-보정된 (placebo-corrected) 값은 아니다. 발생빈도는 다음과 같이 정의된다
: 매우 흔함(≥ 1/10), 흔함(≥ 1/100 또는 1/10), 흔하지 않음(≥ 1/1000 예 ≤ 1/100), 드물(≥ 1/10000 예 ≤ 1/1000), 매우 드물(≤ 1/10000), 또는 알려지지 않음(주어진 자료에서 측정 불가능)

기간제 분류	빈도	이상반응
항제 및 항고혈압제	알려지지 않음	저혈압산증
면역학적 장애	드물	아니팰라시스반응
내분비적 장애	알려지지 않음	부작할한 중이노호르몬(ADH) 분비
	흔함	식욕감소, 식욕부진, 체중감소
대사 및 영양장애	흔하지 않음	저칼슘증
	알려지지 않음	저나트륨혈증, 식욕부진*

- 성인이나 수개월 이상의 장기 투여 환자에서 자살성향의 증가가 있는지 알 수 없으나, 항우울제를 사용 중인 환자는 투여 초기 수개월 동안 또는 용량 변경 (증감 혹은 감량)을 할 때 자살 성향, 자해, 자결성 등의 발현 및/또는 악화를 주의깊게 모 니터링 하여야 한다.

- 항우울제 사용 환자에서 불안, 초조, 공황장애, 불안, 흥분, 적대감, 공격성, 충동성, 정좌불능증, 건조증, 조증이나 나타날 수 있는데, 이러한 증상과 연관성은 확실하지 않으나 자살성향 발현의 위험증상일 수 있으므로 주의한다. 그리고 가족 및 보호 자에게 이러한 증상이 나타나자 자살성향 임상적 악화에 대한 예보 모니터링하여 증상 발현시 즉시 의사에게 알려주도록 지도한다.
- 우울증상에서 계속적인 악화, 항우울제의 발현 또는 자살성향의 전조증상일 가능성이 있는 증상(중증이나 갑작스러운 증상, 현 의의 환자에서 나타날 것이 아닌 증상)이 나타나면 이 약의 투여중단을 고려해야 한다.
- 다른 정신질환을 가진 환자를 치료할 때에도 주요 우울증 환자를 치료할 때와 동일한 예방조치를 취해야 한다.
- 자살 관련 사건(의 가망력이 있거나 투여 시작 전에 자살 경향이 유망하게 나타났던 환자들은 자살 충동 또는 자살 시도의 위험성이 더 크므로 투여기간 동안 주의 깊게 모니터링 하여야 한다.

- 정좌불능/정신운동불안

SSRIs/SNRIs의 투여는 불쾌감과 불안감을 동반하고 가만히 앉거나 서있을 수 없어 가급적 움직여야 하는 증상을 특징으로 하 는 정좌불능증의 발현과 관련이 있으며, 이는 투여 첫 수주 이내에 나타난다. 이러한 증상이 나타나면 환자에게 용량을 늘리는 것은 해로울 수 있다.
- 지나트륨혈증

SSRIs의 사용시 대개 중이노호르몬 분비 이상 증후군 (SIADH)으로 인한 지나트륨혈증이 드물게 보고되었으며, 일반적으로 약 물 투여 중단으로 회복되었다. 노인, 간장변증 환자 또는 지나트륨혈증을 유발할 수 있는 약물을 병용투여 중인 환자 등과 같은 고위험군 환자의 경우 주의해야 한다.
- 출혈

SSRIs에 의해 반소출혈, 자반병과 같은 피부 출혈 이상이 보고되었다. 특히 경구용 항응고제나 혈소판 기능에 영향을 미치는 것으로 알려진 약물 (예 비정형적 항응고제인 와파린, 페노티아진계, 대부분의 삼환계 항우울제, 아세트살리실산, 비스테로이드계 소 염제(NSAIDs), 티클로피딘, 디피리다몰)을 투여 중인 환자나 출혈 경향이 알려진 환자에게 SSRIs를 투여하는 경우 주의해야 한 다.

- 전기 경련 요법 (Electroconvulsive Therapy)

SSRIs와 전기 경련 요법의 병행 치료에 대한 사용 경험이 제한적이기 때문에 주의해야 한다.
- 심장 관상혈관질환

임상 경험이 충분하지 않기 때문에 관상혈관질환이 있는 환자의 경우 주의하도록 한다.
- 세로토닌 증후군

동 제제를 포함한 세로토닌-노르에피네프린재흡수억제제(SNRIs) 및 세로토닌선택적재흡수억제제(SSRIs)를 단독으로 투여했을 뿐만 아니라 특히 다른 세로토닌 작용성 약물들(트립탄계약물, 삼환계 항우울제, 펜타닐, 리튬, 트라마돌, 트림파민, 마소피린, 세린토존스워트(S^c, John's Wort) 및 세로토닌대사를 저해하는 약물들(특히 돌 다 정신질환 치료를 위한 MAO저해제 및 리니졸리드 및 정맥주사용 메칠렌클로루 제제와 같은 다른 제제)을 병용투여했을 때 잠재적으로 생명을 위협하는 세로토닌증후군 발현이 보고되었다.

세로토닌 증후군 증상은 정신신태변화(초조, 환각, 삼열, 설상, 혼란), 자율신경불안증(예, 빈맥, 불안정한 혈압, 어지럼, 발한, 홍조, 고열), 신경근긴장(예, 떨림, 경직, 간대성 근경련, 반사항진, 초운동성장애), 발작 및/또는 위장관계 증상(예, 구토, 팽만, 설사)을 포함한 수 있다. 환자들은 세로토닌 증후군을 경험할 때에 모니팅받아야 한다.

이러한 증상을 치료는 위해 동 제제와 MAO저해제를 병용투여하는 것은 금기이다. 또한 리니졸리드 또는 정맥주사용 메칠렌클로루 제제와 같은 MAO저해제를 투여받은 환자에게 동 제제 투여를 시작해서는 안된다. 투여경로정보가 제공된 메칠렌클로루 제제의 모든 시판후 보고는 용량범위가 1mg/kg~8mg/kg인 정맥투여를 포함한 것. 보고 중에 메칠렌클로루 제제를 다른 투여경로(정제 또는 국소 주사 또는 고열) 또는 저용량으로 투여된 경우를 포함하고 있지 않다. 동 제제를 투여받은 환자가 리니졸리드 또는 정맥 주사용 메칠렌클로루 제제와 같은 MAO저해제 치료 시작이 필요한 상황일 수 있다. 동 제제는 MAO저해제 투여 시작 전에 중단 해야 한다. (용법·용량 항 및 2. 다른 환자에게 투여하지 말 것 항 참조)

다음 들어 트립탄 계열 약물들, 삼환계 항우울제, 펜타닐, 리튬, 트라마돌, 부스피론, 트림토판 및 세인트존스워트(St. John's Wort)와 같은 다른 세로토닌 작용성 약물들과 동 제제를 병용투여하는 것이 임상적으로 유익성이 있다면 환자들을, 특히 치료 개시 중 및 용량을 증가할 때, 잠재적으로 가능한 세로토닌 증후군 위험성에 대하여 인식해야 한다.

동 제제 및 세로토닌작용성약물들을 병용투여했을 때 위에서 언급한 이상반응이 발생한다면 즉시 투여를 중단하고 보조적인 대 응요법을 시작해야 한다.
- 급만 증상

갑작스러운 투여중단으로 어지러움, 수면장애, 불안 등과 같은 급만증상을 경험할 위험이 있으므로 처방의사와 상담 없이 환자 나 투여중지 및발적으로 이 약의 투여를 중단해서는 안된다. 이 약의 투여를 중단하는 경우에는 수주간 수개월에 걸쳐 점진적으 로 용량을 감량할 것이 권장된다.

투여 중단, 특히 갑작스러운 투여 중단으로 인한 급만증상은 빈번하다. 임상시험에서 이 약을 투여한 환자의 약 25% 그리고 위 약을 투여한 환자의 약 15%에서 무한한 이환반응이 발생하였다.

급만 증상의 위험성은 투여 기간과 용량 그리고 용량 감소의 속도를 포함한 몇 가지 요인에 의한다. 어지러움, 감각이상, 두통, 설 사, 전기 충격 감과 포함, 수면장애 (불안증과 관련된 잠), 초조 또는 불안, 구역 그리고/또는 구토, 떨림, 혼란, 졸음, 발한, 자각, 설 사, 두근거림, 감성불안, 과민성, 시각장애 등이 자주 흔히 보고된 이상반응이었다. 대부분 이러한 증상은 감증 내지 증등증(지나친 일부 환자에서는 그 정도가 심할 수 있다).

이러한 이상반응들은 대개 투여 중단 후 초기 며칠이내에 발생하지만, 부주의한 1회 복용을 놓친 환자들에서 이와 같은 증상 이 매우 드물게 보고되었다. 일반적으으로 이러한 증상은 초기 한정기간 대개 2주내에 소실되지만 일부 환자에서는 연장될 수 있다 (2~3개월 이상).
- QT 간격 연장

이 약은 용량 의존적으로 QT 간격 연장을 유발하는 것으로 나타났다. 시판 후로 주류, 저칼슘혈증, 갑상선기능 저하, QT 간격 연장이 있거나 심장질환이 있는 환자에서 QT 간격 연장이 다형성심실빈맥(Torsade de Pointes)을 포함한 심상성 부정맥이 보고 되었다. 중대한 사례 중에는 최근 급성 심근근색증이 비정상신생성(uncompensated) 심부전인 환자에서나 조여하였다 한다. 저칼슘혈증 및 저마그네슘혈증과 같은 전해질 불균형은 심장성 부정맥의 위험을 증가시키므로 이 약의 투여 전에 조절되어야 한다. 만약 환자에서 심장질환 관련 지표를 발견 한다면 이 약 투여 시작 전에 ECG 검토를 고려해야 한다. 만약 이 약을 투여 하는 동안 심상 부정맥 발생 징후가 있으면, 치료를 중단하고 ECG를 실시해야 한다.

- 상호작용

약물동태학적 상호작용

 - 병용유기:
 - MAO 저해제 : 용법·용량 항, 사용상의주의사항 중 2. 다른 환자에게 투여하지 말 것 항 및 4. 일반적주의 항을 참조 한다.
 - 피오자이드

11일간 라세미메인 시탈로프람 40mg/day을 투여한 환자에서 단회 용량 피오자이드 2mg을 병용투여시 시험기간동안 일관 되지는 않았지만 피오자이드의 AUC와 Cmax가 증가하였다. 피오자이드와 시탈로프람의 병용투여는 QTc 간격을 약 10msec 증가시켰다. 저용량의 피오자이드에서 나타난 상호작용으로 인하여 이 약과 피오자이드는 병용투여해서는 안된다.
 - QT 간격 연장

QT 간격을 연장하는 다른 약물과 이 약의 병용투여에 대한 약물동태학적 연구는 아직까지 없었다. 이 약의 부가적인 작용을 배제할 수 없다. 따라서, Class IA 및 III의 항부정맥인, 항정신병약 (예: 페노티아진) 유도제, 피오자 이드, 할로페리돌), 삼환계 항우울제, 특정 항응고제 (예: 소피록사신, 쿽시몰록사신, 에리스로마이신 IV, 펜티미딘, 할말라리 이 치료제 (특히, 할로트랜트린), 특정 항히스타민제 (아스테미롤, 미클라스티딘)와 같이 QT 간격을 연장하는 약물과 이 약을 병용투여하지 않는다.
 - 주의해야 하는 병용투여
 - 세로토닌성 약물 : 용법·용량 항, 사용상의주의사항 중 2. 다른 환자에게 투여하지 말 것 항 및 4. 일반적주의 항을 참조 한다.
 - 간질발작 역치(seizure threshold)를 낮추는 약물: SSRIs는 발작 역치를 낮출 수 있다. 발작의 역치를 낮출 가능성이 있는 다른 약물(항우울제(삼환계, SSRIs), 신경안정제(노도자친, 부티로렌), 지오잔틴(thioxanthenes)), 마르코닌, 부부미도, 트라마돌과 병용투여하는 경우 주의해야 한다.
 - 리튬, 트림토판: 리튬 또는 트림토판을 병용 투여하는 경우 SSRIs의 효과가 증가하였다는 보고가 있으므로 이들 약물과 SSRIs를 병용투여할 경우 주의해야 한다.
 - St. John's Wort (성서의 풀): SSRIs와 St. John's Wort(Hypericum perforatum: 고추나뭇물)을 합용한 생약제제를 병 용 투여하는 경우, 이상반응의 발생이 증가할 수 있다.
 - 술 : 이 약과 경구용 항응고제를 병용투여 하는 경우, 항응고 효과가 영향받을 수 있다. 경구용 항응고제를 투여중인 환 자의 경우 이 약을 투여 시작 또는 투여 중단 시 항응고 효과를 주의해서 모니터링해야 한다. 비스테로이드계 소염진통제 (NSAIDs)와 병용 투여하는 경우 출혈 경향을 증가시킬 수 있다.
 - 알코올 : 병용 투여하는 어떠한 약물들 중에서도 알코올동태학적 상호작용이 예상되는 않는다. 그러나 다른 정신질환 성 약물들과 마찬가지로 이 약은 알코올과는 병용하지 않는 것이 좋다.
 - 약물동태학적 상호작용
 - 다른 약물이 이 약의 약물동태학에 미치는 영향

이 약은 주로 CYP2C19에 의해 대사된다. 이 약과 CYP2A6 또는 CYP2D6 또한 이 약의 대사에 관여할 수 있으나 매우 미약하다. 이 약의 주요 대사로인한 S-DCT(demethylated escitalopram)은 중등도는 CYP2D6에 의해 다시 대변되는 것으로 보인다. 이 약과 오메프라졸(CYP2C19 저해제)의 병용투여에 의해 이 약의 혈중 농도가 증등도(약 50%) 감소하였다. 이 약과 시메티 딘 (증등도의 전신적인 소아 억제제)의 병용투여에 의해 이 약의 혈중 농도가 증등도(약 70%) 증가하였다. 시메티딘과 이 약 을 병용투여시 주의하여, 용량 조정이 필요할 수 있다.

CYP2C19 저해제에 플루아세틴, 플루부타롤, 칸사프롤, 티클로피딘 또는 시메티딘을 병용 투여하는 경우, 이 약의 최고용 량 투여시 주의해야 하며, 약물학적 면전에 근거하여 이 약의 용량을 감량할 필요가 있다.
 - 이 약이 다른 약물의 약물동태학에 미치는 영향

이 약은 CYP2D6에 의해 대사된다. 이 약과 CYP2A6 소에 의해 주로 대변되는 약물을 병용 투여하는 경우 주의해야 한다. 특히 몰레타이드(mecaineide), 프로파렌올(propafenone), 메토프롤롤(metoprolol)(심부전제 사용시)과 같은 지제 (Therapeutic index)가 좁은 약물은 대시콜리딘(desipramine), 클로미프라민(cloimpramine) 및 노르트리플린 (nortryptiline)과 같은 항우울제와 리스레딘, 지오리다제(mioridazine) 및 할로페리돌과 같은 항정신병약들 등 주로 CYP2D6에 의해 대사되는 증중신경작용 약물들 이 경우 이 약과 병용투여시 주의한다. 용량 조정이 필요할 수 있다.

CYP2D6의 억제제인 데시프라민(desipramine) 또는 메토프롤롤(metoprolol)과 병용투여하는 경우, 이 두 약물의 혈중 농도

	혼합	불안, 안정불결, 비정성공, 여성과 남성 : 식욕감소, 여성 : 성불감증
정신계장애	흔하지 않음	이갈이, 초조, 신경과민, 공황발작, 혼돈상태
	드물	공작, 이인율, 환각
	알려지지 않음	조증, 자살관념, 자살행동*
	흔함	불면증, 졸림, 어지러움, 시각이상, 떨림
신경계장애	흔하지 않음	미각장애, 수면장애, 실신
	드물	세로토닌 증후군
	알려지지 않음	운동이상증, 운동장애, 경련, 정신운동불안/정좌불능증*
안질환	흔하지 않음	안동, 시각장애
귀 및 미로계 장애	흔하지 않음	이명
	흔하지 않음	빈맥
	드물	시력
	알려지지 않음	심전도QT연장, 다형성심실빈맥(Torsade de Pointes)을 포함한 심상성 부정맥
혈관계 장애	알려지지 않음	기립성저혈압
호흡기 장애, 흉격, 종격동 상에	흔함	부비동염, 하혈
	흔하지 않음	코피
	매우 흔함	구역
	흔함	설사, 변비, 구토, 구갈
위장관 장애	흔하지 않음	위장관내 출혈(직장출혈 포함)
간담도계 장애	알려지지 않음	간염, 간기능검사 이상
	흔함	발한증
피부, 피하조직 장애	흔하지 않음	두드러기, 탈모, 발진, 가려움
	알려지지 않음	반소출혈, 혈관부종
근골격계, 결합조직장애	흔함	관절통, 근육통
	알려지지 않음	혈문근공해
신장, 요로계 장애	알려지지 않음	요지류
생식기계, 유행성장애	흔함	남성 : 사정장애, 발기불능
	흔하지 않음	여성 : 자궁출혈, 월경과다
	알려지지 않음	유농농증, 남성 : 자궁발기증
	흔함	피로, 발열
전신장애 및 투여부위 상태	흔하지 않음	무증

* 자살관념과 자살행동은 이 약의 투여 도중 또는 투여 중단 직후에 보고되었다.

* 이들 이상반응은 SSRIs에 약물에서 보고되었다.

- 다음은 SSRIs에 약물에서 나타나는 이상반응이다: 소아, 청소년 및 젊은 성인(18~24세)에서의 자살 성향의 증가
- 시판 후로 주요 증상: 여성, 정좌불능증, 기존에 QT 간격 연장이 있거나 심장질환이 있는 환자에서 QT 간격 연장 및 다형성심실빈맥 (Torsade de Pointes)을 포함한 심상성 부정맥이 보고되었다.
- 4주 또는 50대 이상의 환자를 대상으로 한 역학조사에서 SSRIs 및 TCAs를 복용 중인 환자의 경우 골절 위험이 증가하는 것으로 나타났다.
- 국내에서 4년 동안 실시한 시판 후 사용성적조사결과 이상반응의 발현절대율은 인과관계와 상관없이 4.39%(60세/1,368세)로 보고되었다. '구역'과 '두통' 이 0.37%(5/1,368명, 5건)로 가장 많았고, '변비'와 '어지러움'이 0.29%(4/1,368명, 4건), '구강건조 증', '복통', '불면증', '제증증가'가 0.22%(3/1,368명, 3건), '발열', '구토', '소화불량', '장염', '감각이상', '기침', '상기능이상', '두근 거림'이 0.15%(2/1,368명, 2건), 그 외 '설사', '비비', '추체외로장애', '편두통', '성욕감소', '식욕부진', '환각', '천식', '호흡곤란', '골절', '관절염', '고혈압'이 각각 0.07%(1/1,368명, 1건)으로 보고되었다. 그 중 약물유해반응을 발현율은 0.80%(11/1,368명, 12 건), '구갈'이 0.22%(3/1,368명, 3건), '복통', '불면', '상기능이상'이 각각 0.15%(2/1,368명, 2건), 그 외 '어지러움', '성욕감소', '제증증가'가 각각 0.07%(1/1,368명, 1건)으로 보고되었다.
- 보고된 이상반응을 기관별로 분류하면 다음과 같다.
 - 위장관계 : 구역, 변비, 구강건조증, 복통, 구토, 소화불량, 장염, 설사
 - 중추 및 말초신경계 : 두통, 어지러움, 감각이상, 마비, 추체외로장애, 편두통
 - 정신신경계 : 졸림, 불면증, 공격적 반응, 성욕 감소, 식욕부진, 환각
 - 호흡기계 : 기침, 천식, 호흡곤란
 - 대사 및 영양이상 : 제증증가
 - 전신이상 : 가늘 톱증, 발열
 - 근골격계 : 골절, 관절통
 - 생식기계 (남성) : 성기능 이상
 - 신설관계 : 두근거림, 고혈압
- 국내에서 시판 후 사용성적조사와 별도로 보고된 이상반응이 80명의 환자에서 88건이 있었으며, 구역 15건, 두통 14건, 어지 러움 9건, 졸음 8건, 위장장애 6건, 속쓰림 5건, 진전 4건, 구갈, 성욕감소, 식욕감소 각각 3건, 구강건조, 소화불량, 발한, 빈 뇨, 상기능이상, 신장장애 각각 2건 및 복부불쾌감, 불안, 발한증, 환시 각각 1건이 보고되었다. 이 중 두통, 빈뇨는 예상 하기 못한 이상반응이었다.

4. 일반적 주의

다음은 주의사항을 모든 SSRIs계(Selective Serotonin Re-uptake Inhibitors: 선택적 세로토닌 재흡수 억제제) 항우울제에 적용된다.

1) 위험성 불안

공황장애 환자 중 일부에서 항우울제 투여 시작 초기에 불안 증상의 증가가 경험될 수 있다. 이러한 위험성 반응은 일반적으로 치료 시작 후 처음 2주 이내에 나타나며, 불안 발생 가능성이 높은 환자에게는 위에 더 낮은 최초 투여용량을 사용하는 것이 권 장된다.

2) 간질발작

간질발작이 처음으로 나타난 환자 또는 발작 횟수가 증가한 경우(기존에 간질로 진단된 환자에서)에는 이 약의 투여를 중단해야 한다. SSRIs는 불안정형 간질 환자에는 투여를 피하고 조절 가능한 간질 환자의 경우에는 투여 후 면밀하게 관찰해야 한다.

3) 조증

SSRIs는 조증/조울증의 경향이 있는 환자에게는 주의하여 사용해야 한다. 조증 상태로 활성화된 환자의 경우에는 SSRIs의 투 여를 중단하여야 한다.

대조 임상시험에서 증명되지는 않았으나 양극성 장애를 가진 환자에서 우울증 삼화 기간에 항우울제를 사용 시 조증 또는 조울 증 증상을 촉진할 가능성이 있다. 따라서 항우울제 투여 전 자살, 양극성 장애 또는 우울증의 가족력을 포함한 자세한 정신과적 병력에 대해 확인하여 양극성 장애의 가능성이 있는지 신중하여야 한다.

4) 당뇨병

당뇨병 환자에게 SSRIs를 투여하는 경우 혈당 조절을 변경할 수 있다. 인슐린 및 경구용 혈당강화제의 용량을 조정해야 할 필 요가 있을 수 있다.

5) 자살

- 주요우울증을 가진 환자(성인, 소아)는 항우울제를 복용중이라도, 질환의 뚜렷한 호전이 있을 때까지 우울증상의 악화, 자 살 충동과 행동(자살 성향)의 위험도를 증가시킨다는 보고가 있다. 소아, 청소년 및 젊은 성인에게 이 약이나 다른 항우 울제 투여를 고려중인 외사는 임상적용 필요성이 위험성보다 높을지 항상 신중하게 고려해야만 한다. 단기간의 연구에서 25세 이상의 성인에게는 위약과 비교하였을 때 항우울제가 자살 성향의 위험도를 증가시키지 않았고, 65세 이상의 성인에서는 위약에 비해 항우울제에 의한 위험이 감소하였다.
- 주요우울증, 갑상선장애 또는 다른 정신과적 질환을 가진 소아, 청소년 및 젊은 성인(18~24세)에서 자살 생각 및 행동(자살 성향)의 위험도를 증가시킨다는 것을 나타내었다. 단기간의 연구에서는 25세 이상의 성인에서는 위약에 비해 항우울제에 사용 시 조증 또는 조울 증 증상을 촉진할 가능성이 있다. 따라서 항우울제 투여 전 자살, 양극성 장애 또는 우울증의 가족력을 포함한 자세한 정신과적 병력에 대해 확인하여 양극성 장애의 가능성이 있는지 신중하여야 한다.
- 국내에서 4년 동안 실시한 시판 후 사용성적조사결과 이상반응의 발현절대율은 인과관계와 상관없이 4.39%(60세/1,368세)로 보고되었다. '구역'과 '두통' 이 0.37%(5/1,368명, 5건)로 가장 많았고, '변비'와 '어지러움'이 0.29%(4/1,368명, 4건), '구강건조 증', '복통', '불면증', '제증증가'가 0.22%(3/1,368명, 3건), '발열', '구토', '소화불량', '장염', '감각이상', '기침', '상기능이상', '두근 거림'이 0.15%(2/1,368명, 2건), 그 외 '설사', '비비', '추체외로장애', '편두통', '성욕감소', '식욕부진', '환각', '천식', '호흡곤란', '골절', '관절염', '고혈압'이 각각 0.07%(1/1,368명, 1건)으로 보고되었다. 그 중 약물유해반응을 발현율은 0.80%(11/1,368명, 12 건), '구갈'이 0.22%(3/1,368명, 3건), '복통', '불면', '상기능이상'이 각각 0.15%(2/1,368명, 2건), 그 외 '어지러움', '성욕감소', '제증증가'가 각각 0.07%(1/1,368명, 1건)으로 보고되었다.

연령대	치료받은 환자 1,000명 당 자살성향 발생수에 있어서 항우울제-위약간의 차이
	항우울제 관련 증가
18	14배 많음
18-24	5배 많음
	항우울제 관련 감소
25-64	1배 적음
≥65	6배 적음

- 어떠한 약의 임상시험에서도 자살은 발생하지 않았다. 성인에서의 임상시험에서는 자살이 발생하였으나, 그 수는 자살에 대 한 약물의 영향에 대해 어떤 결론을 내릴 만큼 충분하지 않았다. 자살성향의 위험이 증가(건조, 여러날 이상) 사용에 까지 확장될 수 있는 지에 대해서는 알려져 있지 않다. 그러나, 우울증을 가진 성인을 대상으로 한 위약 대조의 지속적인 임 상시험으로부터 항우울제의 사용이 우울증의 재발을 지연시킬 수 있다는 충분한 근거가 있다.

- 가 2배로 증가하였다. 설태와 (in vitro) 시험에서 이 약은