

덱사메디 크림

(덱사메타손프로피오네이트)



(01)08806562048304

[원료약품 및 분량] 1g 중

- 유효성분 : 덱사메타손프로피오네이트(KP) 1mg
- 첨가제(보존제) : 벤질알코올(KP) 2mg
- 기타 첨가제 : 스테아릴알코올, 세탄올, 경질유동파라핀, 정제수, 소르비탄스테아레이트, 옥틸도데카놀, 폴리소르베이트80, 백색바셀린, 에데트산나트륨수화물, 카보머940

[성 상] 흰색 내지 유백색의 크림제

[효능·효과]

1. 습진 · 피부염(진행성 지장각피증, 만성단순태선, 일광피부염을 포함), 양진(가려움발진)군(구진두드러기를 포함), 발레쿨리데, 건선, 손 · 발바닥 농포증, 편평태선, 홍피증(홍색피부증), 만성원판상홍반, 양진(악물발진) · 증독진
2. 원형탈모증의 치료

[용법·용량] 보통 1일 2~3회 적량을 환부(질한 부위)에 도포한다(바른다).

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.
 - 1) 피부결핵, 단순포진, 수두, 대상포진, 중두진 환자(면역기능 억제작용에 의해 감염증을 악화시킬 수 있다)
 - 2) 이 약 또는 이 약 성분에 과민반응 및 그 병력이 있는 환자
 - 3) 고막 천공(돌림)이 있는 습진성 외이도(바깥귀)염 환자(천공(돌림)부위의 치유 지연 및 감염의 위험이 있다)
 - 4) 케양(베체트병 제외), 제2도 심재성(드러나지 않는) 이상의 화상, 동상 환자(조직수복, 육아형성을 억제하여 치유를 지연할 수 있다)
 - 5) 세균, 진균(곰팡이), 스피로헤타, 바이러스 피부 감염 환자(면역을 억제하여 감염증을 악화시킬 수 있다)
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
 - (1) 임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에 대해서는 대량 또는 장기간에 걸친 사용을 피한다.
 - (2) 피부에 장기간, 광범위하게 사용 시에는 수유를 하지 않는다.
 - 2) 소아
 - 소아에게 이 약의 장기간에 걸친 대량 사용 또는 밀봉봉대법에 의하여 발육장애를 가져올 수 있다. 지저귀도 밀봉봉대법과 같은 작용을 나타낼 수 있다.
 - 3) 고령자
 - 일반적으로 고령자에 사용 시 이상반응이 나타날 수 있으므로 대량 또는 장기간 광범위하게 밀봉법을 사용하는 경우 특히 주의한다.
3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 삼삼시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 피부 감염증 : 피부의 진균(곰팡이)성(칸디다증, 백선 등), 세균성(전염성 농가진(고름딱지증), 모낭염 등), 바이러스성 감염증이 나타날 수 있다(밀봉봉대법(ODT)의 경우 나타나기 쉽다). 이와 같은 증상이 나타날 경우에는 적절한 항진균제나 항균제 등을 병용하고 증상이 빨리 개선되지 않을

경우에는 사용을 중지한다.

- 2) 기타 피부 증상 : 장기연용(계속 복용)에 의해 스테로이드성 여드름(심상성 여드름(보통)여드름)과 비슷하나 백색의 면포가 다발하는 경향이 있다), 스테로이드성 피부(피부위축, 모세혈관확장), 스테로이드성 주사 · 입주위 피부염(입주위 때때로 안면 전체에 홍반(붉은 반점), 구진, 모세혈관확장, 가피, 인설(비늘, 껍질) 등이 생긴다), 어린이(魚鱗癬)양 피부변화, 자반(자주색반점), 다모, 색소탈색 등이 나타날 수 있다. 이러한 증상이 나타나는 경우에는 천천히 사용량을 줄여 코르티코이드를 함유하지 않은 약으로 바꾸어 사용한다. 드물게 가려움, 접촉피부염이 나타날 수 있다.
 - 3) 과민반응 : 피부의 자극감, 발진 등의 과민증상이 나타날 수 있으며 이러한 증상이 나타날 경우에는 사용을 중지한다.
 - 4) 뇌하수체 · 부신피질계 : 대량 또는 장기간에 걸친 광범위한 사용, 밀봉봉대법에 의해 뇌하수체 · 부신피질기능의 억제를 가져올 수 있으므로 주의한다.
 - 5) 눈 : 안검(눈꺼풀)부위에 사용 시 안압 상승, 녹내장을 일으킬 수 있으므로 주의한다. 대량 또는 장기간에 걸쳐 광범위하게 사용하거나, 특히 밀봉봉대법으로 사용할 경우 후방하 백내장, 녹내장 등이 나타날 수 있다.
4. 기타 이 약의 사용 시 주의할 사항
- 1) 피부 감염을 수반하는 습진, 피부염에는 사용하지 않는 것을 원칙으로 하지만 부득이한 경우에는 먼저 적절한 항균제(전신작용), 항진균제로 치료하거나 이들과의 병용을 고려한다.
 - 2) 대량, 장기간, 광범위하게 사용함으로써 코르티코이드 전신투여와 같은 증상이 나타날 수 있으므로 정기적으로 의사의 검진을 받는 것이 필요하다.
 - 3) 증상이 개선되지 않거나 증상이 악화되는 경우에는 사용을 중지한다.
 - 4) 증상이 개선되면 가능한 한 빠른 시일 내에 사용을 중지한다.
 - 5) 안과용으로 사용하지 않는다.
 - 6) 기초화장이나 면도 후에 사용하지 않는다.
5. 저장상의 주의사항
- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

[포장단위] 30g/튜브

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기간] 제조일로부터 36개월

[제조외곽지] (주)레고켈렉 / 경기도 안성시 원곡면 원당로 354

[제 조 자] 오스틴켈렉(주) / 경기도 안산시 단원구 성곡로146번길 20

- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.
- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다.
- ※ 작성일자 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)
- ※ 소비자상담전화 : 031-692-2900

작성일 : 2018. 03. 05. (Rev.0)