

뉴먼트

활성비타민 함유 근육경련 및
혈액순환 개선제

엠지플러스스 연질캡슐



[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

■ 유효성분 :

산화마그네슘(KP)(마그네슘으로서 210.48 mg)	349 mg
토코페롤아세테이트(KP)(비타민E로서 500 IU)	500 mg
벤조티아민(KP)(티아민염산염으로서 18.08 mg)	25 mg
리보플라빈(KP)	25 mg
피리독신염산염(KP)	50 mg
시아노코발라민(KP)	500 µg
γ-오리자놀(KP)	5 mg
마그네슘(100→1)(성구)	5 mg

- 첨가제(동물유래성분) : 젤라틴(소, 가축), 소산신젤라틴(소, 가축)
- 첨가제(식물유래성분) : 대두유(콩기름)
- 첨가제(타르산소) : 적색40호, 청색1호, 황색5호
- 기타첨가제 : 농글리세린, 레시틴, 백산, 산화티탄, 에틸비닐렌, 정제수, 폴리소르베이트80

[성상]

회백색의 유상 물질(겉을 상대 물질이 들어있는 적갈색의 장형 연질캡슐제

[효능·효과]

- 다음 종류의 비타민 E, B₁, B₂, B₆의 보급
- 유효제 및 - 임신·수유기 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하시 - 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
- 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족저마·수족냉증(손발이 차가움)
- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절염(요(허리)통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
- 각기
- 노의 피로
- 마그네슘결핍으로 인한 근육경련

[용법·용량] 만 12세 이상 및 성인 : 1일 2회, 1회 1캡슐 복용한다.

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 2) 만 12개월 미만의 젖먹이 3) 심한 증상의 신부전 환자 4) 대두유에 과민하거나 알레르기가 병력이 있는 환자 5) 콩 또는 땅콩에 과민한 환자 6) 임신한 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
1) 고지단백혈증, 당뇨병성고지혈증 및 해당지(이)증 등 지방대사 이상 환자 또는 지질상 유제를 신중히 투여해야 하는 환자 2) 이 약은 황색5호(산색)와 FCF, Sunset Yellow FCF를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기가 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
1) 인산염, 칼슘염, 경구약은, 복용하는 용 테트라사이클린계 제제, 제산제 2) 레보도파
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.
1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 3) 심장·순환기계기능 장애 환자 4) 신장(콩팥)장애 환자 5) 지반혈증 환자 6) 임부

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈)되지 않음, 구역, 구토, 붉은 변, 붉은 반점, 부전수축(심장박동 정지), 중추신경계 기능저하 2) 이 약의 투여에 의하여 생기가 예전보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다. 3) 에스트로겐을 포함한 경구 (먹는) 복용하는 용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전혈관 막힘성 소인이 있는 환자가 비타민D를 복용할 경우 혈전혈관 막힘증의 위험이 증가될 수 있다. 4) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기(長) 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다. 5) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다. 6) 대장투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨 혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다. 7) 항알도스테로이드, 트리인데린과 병용(함께 복용(사용))투여시 고칼혈증(혈당을 일으킬 수 있으므로 주의할 것) 8) 우발적으로 과량 복용한 경우 9) 1개월 정도 복용하고도 증상의 개선이 없을 경우

6. 일반적 주의

1) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장 지질치를 정기적으로 검사할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 존재하고 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

7. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것 2) 복용시 의사, 한의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상상에서 영향을 줄 수 있다. 4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용 직후에는 피할 것.

8. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

[사용기간] 제조일로부터 24개월

[포장단위] 10캡슐, 60캡슐, 120캡슐

[고객만족팀] 1588-2675

[판매처] JW 증의제약

JW증의제약 / 서울특별시 서초구 남부순로로 2477 JW타워

[제조자] Prime 한국프라임제약

한국프라임제약주 / 전라북도 완주군 봉동읍 완주산내로 100

- ※ 본 약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- ※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 따라, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.
- ※ 약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어와야 하며, 첨부문서를 약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 부작용 보고 : 한국 약품 안전 관리원(1644-6223)
- ※ 개정일자이후 변경된 허가사항 내용은 식약처 온라인 의약품사전 (<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인 하실 수 있습니다.

개정일자 : 2018. 06. 19.(Rev.01)