

■ **원료약품의 분량** 1정 중 • 유효성분 : 알긴산(BP) ... 200mg, 카르복시메틸셀룰로오스나트륨(KP) ... 100mg • 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 시트르산수화물, 오파드라이화이트(03B28796), 적색산화철, 침강탄산칼슘, 폴리에틸렌글리콜400, 폴리에틸렌글리콜6000, 히프로멜로오스2910 ■ **성상** 연분홍색의 장방형 필름코팅정제 ■ **효능·효과** 음식물 섭취 감소를 통한 체중감량의 보조요법 ■ **용법·용량** 1일 3회 2정씩 식전에 복용하고 필요에 따라서는 취침전에 추가로 2정 복용가능하다. 충분한 양의 물과 함께 복용하는 것이 좋다. 권장량을 최소 3~4주간 복용할 것이 권장된다. ■ **사용상의 주의사항** 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 이 약 및 이약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자 3) 유·소아 2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. 다른 약물과 상호작용을 방지하기 위해 다른 약과 동시에 복용하지 않는 것이 좋으며, 복용할 경우 30분~1시간의 간격을 두고 복용하는 것이 권장된다. 3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 1) 임부 및 수유부 2) 소화기 장애 환자 4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 이 약은 복부 팽만감, 구역, 변비 또는 설사가 발생할 수 있으며 이와 같은 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것. 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것. 5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 위산 농도가 저하된 경우 이 약의 포만효과가 감소하거나 소실될 수 있다. 6. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다. 2) 정해진 보관조건에서 보관하도록 하며, 유효기간이 지난 약은 복용해서는 안 된다. ■ **저장방법** 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

• 제조자 : (주)마더스제약 경상북도 경산시 진량읍 공단6로24길 18 • 제조의뢰자 : 이니스트바이오제약(주) 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 34-40

일반의약품

분류번호 : 399

체중감량 보조제

이니알론 정

(알긴산/카르복시메틸셀룰로오스나트륨)

300 tabs.

제품 출하 이후 변경된 내용은 자사 홈페이지(www.inistbio.com)를 통해서 확인하실 수 있습니다. 만약, 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염 및 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하시기 바랍니다. 본 제품이 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 식품의약품안전처 의약품전자민원창구 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하세요.

소비자상담전화 : 080-353-6500 (수신자부담)

INIST 이니스트바이오제약(주)

BIOPHARMA

최초작성연월일 2018. 04. 30
최종개정연월일 2018. 05. 10

제조
번호
사용
기한

42*15mm



(01)08806582040814