



항산화제를 함유한
고함량 기능성 활성비타민

벤포비백 정

셀레늄, UDCA, 아연, 코엔자임Q10
비타민B 8종 함유, 비타민D 1000 IU



체력저하



육체피로



눈의피로



구내염



근육통



신경통

일반의약품 (분류번호 : 319)

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

• 유효성분

벤포티아민(KP)	100mg
	(티아민염산염으로서 72.31mg)
리보플라빈(KP)	100mg
니코틴아미드(KP)	100mg
판토텐산칼슘(KP)	100mg
피리독신염산염(KP)	100mg
비오틴(USP)	0.1mg
폴산(KP)	0.1mg
시아노코발라민1000배산(KP)	100mg
	(시아노코발라민으로서 100μg)
이노시톨(KP)	100mg
콜린타르타르산염(DAB)	100mg
제피아스코르브산(별규)	104.2mg
	(아스코르브산으로서 100mg)
산화아연(KP)	31.2mg
	(아연으로서 24.96mg)
토코페롤아세테이트2배산(KP)	80mg
	(비타민E로서 40IU)
셀레늄함유건조효모(KP)	9.23mg
	(셀레늄으로서 4.98μg)
콜레칼시페롤농축물(분말형)(EP)	10mg
	(비타민D로서 1000IU)
산화마그네슘(KP)	30mg
	(마그네슘으로서 18mg)
감마오리자놀(KP)	10mg
유비데카레논(KP)	10mg
우르소데옥시콜산(KP)	10mg
• 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유)	
• 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 히드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 콜로이드성산화규소, 스테아르산마그네슘, 히프로멜로오스, 톱칠드갈색(29B061)	

[성상] 갈색의 장방형 필름코팅정제

[효능·효과]

1. 다음경우의 비타민 D, E, B1, B2, B6, C의 보급

• 육체피로 • 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시 • 임신·수유기 • 발육기 • 노년기

2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.

• 뼈, 이의 발육불량 • 구루병의 예방 • 각기 • 눈의피로 • 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

3. 아연의 보급

[용법·용량] 만 8세 이상 및 성인 : 1회 1정, 1일 1회 복용

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

(1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자 (2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 (3) 만 12개월 미만의 젖먹이 (4) 신장결석 환자 (5) 심한 증상의 신부전 환자 (6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactosemalabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

(1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 (2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

(1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 (2) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이 (3) 고옥살산노증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태) (4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 : 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다. (5) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자 (6) 심장, 순환기계기능 장애 환자 (7) 신장장애 환자 (8) 저단백혈증 환자 (9) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자 (10) 신장결석 병력이 있는 환자 (11) 임부

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부 문서를 소지할 것.

(1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 설사, 묽은변, 변비, 위부불쾌감, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 발진, 발적, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 피부염, 땀, 호흡시 약취, 탈모, 조급증, 저혈압, 폐부종 (2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다. (3) 예스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다. (4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다. (5) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다. (6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.

(7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다. (8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다. (9) 항알도스테로제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것. (10) 우발적으로 과량복용 한 경우 (11) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

(1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. (2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것. (3) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다. (4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사에 영향을 줄 수 있다. (5) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

6. 저장상의 주의사항

(1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것. (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기한] 제조일로부터 36개월

[소비자상담실] 02-6006-7014

[판매처] 광동제약(주) / 경기도 평택시 산단로 114

[제조자] 한국코러스(주) / 충청북도 제천시 강제로 30

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나, 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품일 경우에는 구입처에서 교환해드립니다.

※ 의약품을 사용하기 전에 반드시 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.

※ 의약품은 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하시고, 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

※ 자세한 의약품정보는 식품의약품안전처 온라인의약 도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 의약품 검색을 참고하여 주세요.

※ 부작용보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)