

활성형비타민B군이 보강된 고함량 멀티비타민 렛잇비

렛잇비는 활성형비타민B1을 100mg 고함량으로 함유하고,
현대인들이 결핍되기 쉬운 항산화성분(코큐텐, 셀레늄, 비타민C, E) 및 각종 영양소를 포함해
피로회복 효과 및 영양소 보충에 우수한 고함량 멀티비타민입니다.

특 장 점

1. 비타민B군 10종 함유, 활성형인 벤토타민(B1) 100mg함유로 생체내 이용율 8배 우수
2. 항산화 성분(코큐텐, 셀레늄, 비타민E, 비타민C) 및 UDCA, 마그네슘, 아연 등 필수 영양소 함유
3. 비타민D 1000IU로 일반의약품 일일 최대함량 함유
4. 하루 한 알로 복용편리

효능 · 효과



피로
몸이 나른하고
자도 자도 피로하신 분



근육통, 신경통
근육이 자주 뭉치고
결리는 분



눈의 피로
컴퓨터에 스마트폰까지
눈이 침침하고 피로하신 분



구내염
비싼 스케줄에 입 주위가 험고
인방이 자주 재발하시는 분

【원료약품 및 그 분량】 - 1정 중 -

【유효성분】

벤토타민(비타민B1)(KP) 100mg
(티아민염산염으로서72.31mg)
리보플라빈부타레이트(비타민B2)(KP) 12mg
(리보플라빈으로서8.88mg)
니코틴아미드(비타민B3)(KP) 100mg
파리독살포스페이트수화물(비타민B6)(KP) 5mg
판토텐산칼슘(비타민B5)(KP) 100mg
히드록시콜로인산염(비타민B12)(KP) 10.45μg
(히드록스코발라민으로서10μg)
α-비오틴(USP) 100μg

폴 산(엽산)(KP) 100μg
콜린타르타르산염(USP) 10mg
이노시톨(KP) 30mg
제피아스코르브산(비타민C)(별규) 100mg
(아스코르브산으로서95.96mg)
토코페롤아세테이트(비타민E)(KP) 40mg
(비타민으로서20IU)
클레시페롤과린(비타민D)(EP) 10mg
(비타민으로서1000IU)
셀레늄함유간조효소(별규) 25mg
(셀레늄으로서41.25μg)

산화마그네슘(KP) 30mg
(마그네슘으로서18mg)
산화아연(KP) 20mg
(아연으로서16mg)
유비데카논(KP) 5mg
γ-오리자놀(KP) 5mg
우르소데옥시콜산(UDCA)(KP) 10mg

【첨가제】

경질무수구산, 미결정셀룰로오스,
바일라미크론, 스테아르산마그네슘,
유당수화물,
저치환도트록시프로필셀룰로오스,
전분글리콜산나트륨,
탄산도관색(S2Y24),
탄산도클리어(S2C039),
히드록시프로필셀룰로오스

【효능·효과】

1. 다음 경우의 비타민 D, E, B1, B2, B6, C의 보급

- 육체피로, 임신수유기, 병중병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시, 발육기, 노년기

2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능효과는 다음과 같습니다.

- 뼈, 이의 발육불량, 구루병의 예방 - 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절염(요(허리)통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염),
구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염 - 각기, 눈의피로

3. 아연의 보급

【용법·용량】 만 12세 이상 및 성인: 1일 1회, 1회 1정 복용하십시오.

※ 비타민B군의 함량이 높아 빈 속에 복용 시 일시적으로 속쓰림, 미식거림 등이 있을 수 있으니 식사 후 바로 복용하세요.

【성상】 담황색의 장방형 필름코팅정



【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

1) 고칼슘혈증(hypercalcaemia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis: 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 3) 만 12개월 미만의 젖먹이 4) 신장결석 환자 5) 심한 증상의 신부전 환자 6) 이 약은 우당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 우당분해 효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

1) 인산염, 칼슘염, 경구먹는 복용하는용 테트라사이클린계 제제, 제산제 2) 레보도파
3. 다음과 같은 사람(경우는 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오.
1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria: 요중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태) 3) 일부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 ① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다 4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성(특정 부분에 나타나는대장염 등의 위장질환 환자 5) 신장수환기계기능 장애 환자 6) 신장(콩팥)장애 환자 7) 저단백혈증 환자 8) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자 9) 신장(콩팥)결석병력이 있는 환자 10) 임부
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.


1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 구역, 구토, 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 묽은 변, 식욕부진, 복부(배부분) 팽만감, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 피부염, 땀호흡시 악취, 탈모, 조골증, 위장관장애, 소화장애, 상복부(배부분)통증, 저혈압, 폐부종(부기) 2) 이 약의 투여에 의하여 생기가 예정보다 빨리지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다. 3) 에스트로겐을 포함한 경구먹는 복용하는용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘성 소인이 있는 환자가 비타민 D를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)의 위험이 증가될 수 있습니다. 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다. 5) 파라독시즘을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경장애의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다. 6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다. 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다. 8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부정(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 9) 알코올과 함께, 트리암테렌과 병용(함께 복용)하여 복용을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오. 10) 우발적으로 과량복용 한 경우 1) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우 5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

1) 정해진 용법용량을 잘 지켜십시오. 2) 각종 요점시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다. 3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상감사치에 영향을 줄 수 있습니다. 4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.

【저장상의 주의사항】



1
어린이의 손이 닿지 않는 곳에
보관하십시오.



2
직사광선을 피하고 열 수 있으면 습기가 적고
서늘한 곳에 밀폐하여(뚜껑을 꼭 닫아)
보관하십시오.



3
약품을 원래의 용기에서 꺼내서 다른 용기에 보관하는 것은 약품의오용(잘못)사용에
따른 사고 발생시 약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고
꼭 닫아 보관하십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 하십시오.

【포장단위】 60정/병, 120정(60정/병X2)

【사용기간】 제조일로부터 36개월입니다.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변색, 오염되었거나 손상된 의약품은
공정거래위원회 고시(소비자 분쟁해결기준)에 의거, 구입한 약국 및 의약품판매업자를 통해 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

※ 내부 포장에 파손되어 있으면 복용하지 마십시오.

제조사: **Prime 한국프라임제약** 한국프라임제약(주) / 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단9로 100

제조의회사: **대웅제약** (주)대웅제약 / 경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 35-44

※ 이 첨부문서 최종 개정 연월일 이후 변경된 내용은 대웅 홈페이지(www.daewoong.co.kr) 및 소비자상담 전화번호(080-550-8308~9)에서
확인할 수 있습니다.

※ 부작용보고 및 피해구제신청: 한국의약품안전관리원(1644-6223)

