

급·만성 기관지염 기침 치료제
레도론TM 정
(레보드로프록피진)

■ 원료약품 및 그 분량·1정 중

- 유효성분: 레보드로프록피진(LBP) 60mg
- 첨가제(동물유래성분): 규당수화물(소·우유)
- 기타 첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산메그네슘, 전분글리콜산니트름

■ 성상: 흰색의 원형 정제

■ 효능·효과

다음 질환에서의 기침: 급·만성 기관지염

■ 용법·용량

- 성인: 레보드로프록피진으로서 1회 60mg을 1일 3회
- 적어도 6시간 간격을 두고 경구투여한다.

증상에 따라 적절히 조절한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 기간지 점액 분비 증가 환자
- 3) 혈액성모기능이상(카르타게너중독군, 심모디삼온독증) 환자
- 4) 알부민은 결핍하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 5) 중증약간장애 환자
- 6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 중증 심부전 및 중증 심장부전 환자
- 2) 고령자
- 3) 만 2세 미만의 영아

3. 이상반응

- 1) 소화기계: 구역, 탄산증, 소화불량, 설사, 구토
- 2) 중추신경계: 피로, 기능치약, 반수, 혼수, 두통, 어지러움
- 3) 순환기계: 심계박진
- 4) 피부: 매우 드물게 알레르기 반응

4. 일반적 주의

드물게 반수상태가 초래되므로 운전이나 기계조작 시 주의하며, 특히 알코올과 병용 시 작용이 증대될 수 있다.

5. 상호작용

예민한 환자에게 진정제와 병용투여 시 주의한다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부에는 투여하지 않는다.

7. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나, 품질유지만에서 비합리하지 않으므로 주의한다.

■ 저장방법: 기밀용기, 실온(15~30℃)보관

■ 포장단위: 30정/병, 300정/병

※본 제약품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 의하여 엄격한 품질관리를 완료한 제품입니다. 사용기한이 지났거나 유통과정 중 변질, 변패 또는 오손된 제품이 있으면 사용하지 마시고, 구입한 약국이나 담당염증소에서 교환하시기 바랍니다.

※의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하시기 바랍니다.

※첨부문서에 기재되지 않은 이상반응이 나타날 경우, 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(drugsafe.or.kr)·의약품이상사례보고에 알려하시기 바랍니다.

※부작용을 피하구제 신청: 한국의약품안전관리원(0644-6223)

※제품 개발 시 또는 취급 시에 화재·폭발, 케이스에 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

※이 약은 의사 또는 치과의사의 처방에 의하여 복용할 수 있는 전문의약품입니다. 이 약의 올바른 복용법을 모르시거나 이 약 및 질병에 대한 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상담하시기 바랍니다.

“이 첨부문서 개정일자(19년 02월 18일)이후 변경된 내용은 www.kdpharma.co.kr나 02-576-6121, 3에서 확인할 수 있으며, 의약품 유통실명 및 기타 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<http://medrug.mfds.go.kr>)을 참조하시기 바랍니다.”

제조사: 글라파마(주)

충청북도 제천시 바이오텔러2로 93

제조의뢰·판매자: 경동제약(주)

경남·경기도 화성시 양감면 제약단지로 224-3

소비자상담실 전화번호: (02)576-6121, 3



경동제약주식회사

· 작성일자: 2019. 01. 22
개정번호: 19025