

【원료약품 및 분량】 1정 중

유효성분 : 알긴산(BP).....200.0mg
 카르복시메틸셀룰로오스나트륨(USP).....100.0mg
 기타첨가제 : 경질무수구산, 라우릴황산나트륨, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 시트르산수화물, 에탄올, 오파드라 이한색 (03B28796), 적색산화철, 정제수, 침강탄산칼슘, 포비돈, 폴리에틸렌글리콜400

【성상】 장방형의 연분홍색 필름코팅정제

【효능·효과】 음식물 섭취 감소를 통한 체중감량의 보조요법

【용법·용량】 1일 3회 2정씩 식전에 복용하고 필요에 따라서는 취침전에 추가로 2정 복용가능하다. 충분한 양의 물과 함께 복용하는 것이 좋다. 권장량을 최소 3~4주간 복용할 것이 권장된다. **【사용상의 주의사항】** 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 이 약 및 이약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자 3) 유·소아 2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. 다른 약물과 상호작용을 방지하기 위해 다른 약과 동시에 복용하지 않는 것이 좋으며, 복용 할 경우 30분~1시간의 간격을 두고 복용하는 것이 권장된다. 3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 1) 임부 및 수유부 2) 소화기 장애 환자 4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한

300정

알룬슬림정
Alloonslim Tab.

www.hutechs.co.kr

HUTECS

한국휴텍스제약(주)

우수약품제조관리기준

경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 99

KGMP 적격인증업체

일반의약품 조제용

한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 이 약은 복부 팽만감, 구역, 변비 또는 설사가 발생할 수 있으며 이와 같은 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것. 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것. 5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 위산 농도가 저하된 경우 이 약의 포만효과가 감소하거나 소실 될 수 있다. 6. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다. 2) 정해진 보관조건에서 보관 하도록 하며, 유효기간이 지난 약은 복용해서는 안된다.

【저장방법 및 사용기간】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관. 제조일로부터 36개월
 설명서 작성일 : 190219

제조회자 : 한국휴텍스제약(주)

경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 99

제 조 자 : 한국팩네티(주)

충청북도 천안시 서북구 성환읍 읍금3길 46



환경
 HITEC
 LDPE



(71408809-49104718)

제조번호 :

사용기간 :

HT-190219

47X10

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변태 또는 오손된 제품 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 본 제품에 대하여 자세한 정보를 원하시는 분은 소비자상담실 ☎031-377-7909로 문의하시기 바랍니다.