



아세틸란캡슐

(아세틸시스테인)

V.221004

※ 의약품을 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고 약과 함께 보관하십시오.

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

- 유효성분 : 아세틸시스테인(KP)..... 200.0mg
- 기타 첨가제 : 라우릴황산나트륨, 스테아르산하이드레이트, 옥수수전분, 캡슐(상, 하부 흰색)

[성상] 흰색의 분말이 충전된 상, 하부 흰색의 캡슐

[효능·효과]

다음 질환에서의 객담배출곤란 : 급·만성기관지염, 기관지천식, 후두염, 부비동염, 만성염증증

[용법·용량]

아세틸시스테인으로서 다음 용량을 식전에 소량의 물과 함께 복용한다.

1. 급성질환
 - 성인 : 1회 200mg 1일 3회
 - 소아 : 6~14세 1회 200mg 1일 2회
2. 만성질환
 - 성인 : 1회 200mg 1일 2회
 - 소아 : 6~14세 1회 100mg 1일 3회
3. 만성염증증
 - 소아 : 6세 이상 1회 200mg 1일 3회

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응 환자
- 2) 위·십이지장궤양 환자
- 3) 2세 미만 영아(젖먹이)

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 임부 : 임부에 대한 적절한 연구가 없으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 반드시 필요한 경우에만 투여한다.
- 2) 수유부 : 이 약이 모유로 분비되지 않더라도 많은 약들이 모유로 분비되므로 수유부에 투여할 경우에는 신중히 투여한다.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 소화기계 : 드물게 구역, 구토, 구내염(입안염), 가슴쓰림, 설사 등
- 2) 과민반응 : 드물게 두드러기, 가려움, 발진, 두통, 이명(귀울림), 기관지경련(특히 천식 환자) 등