

위통 | 속쓰림 | 소화불량

**겔포스 디엑스**

위산분비 억제제 + 제산 작용

일반의약품  
 등록기준코드  
 201902242

겔포스디엑스®는 제산제 3종과 위산분비억제제인 라니티딘염산염이 복합처방되어 있는 위장약으로 복용 시 빠른 제산작용으로 통증과 속쓰림, 소화불량은 신속하게 제거하고, 지속적인 위산분비 억제작용을 통해 그 효과를 지속적으로 나타냅니다.

원료 약물 및 그 분량 1정 중

유효성분

라니티딘염산염 (USP) ..... (라니티딘으로서 28.227 mg) ..... 31.5 mg  
 산화마그네슘 (KP) ..... 50 mg  
 수산화알루미늄산마그네슘 (KP) ..... 100 mg  
 규산알루미늄산마그네슘 (NF) ..... 125 mg  
 첨가제 (동등 유효성분) : 스테아르산마그네슘(소, 우지), 유당수화물(소, 우유)  
 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 경질무수규산, 크로스보메돈, 킬크, 오파드라이판(64-8-28920), 카르복시바인.

성상

흰색의 원형 필름코팅정입니다.

약리작용 및 특징

1. 빠른 제산작용  
 3가지 종류의 제산제가 배합되어 신속하게 산을 중 화시키므로 통증을 빠르게 없애줍니다.
2. 지속적인 산분비 억제작용  
 라니티딘염산염 함유된 라니티딘염산염 성분에 의해 지속적으로 산분비를 억제함으로 속쓰림, 소화불량, 위의 통증을 근본적으로 제거해 줍니다.

효능·효과

위통, 속쓰림, 소화불량, 구역

용법·용량

성인(15세 이상, 80세 미만) : 1회 2정씩 복용하여 복용 후 5시간 이상 지나도 증상이 완화되지 않으면 다시 2정을 복용하십시오. 단, 1일 2회(4정)를 넘지 않도록 하십시오.

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 다음 질환으로 치료받고 있는 환자 : 혈액질환, 신장질환, 위·십이지장질환, 천식·류마티스 등의 면역계질환(대체로 백혈구 감소나 혈소판 감소 등이 나타날 수 있습니다. 위·십이지장질환의 치료를 받고 있는 사람은 라니티딘이나 유사약이 처방되어 있을 가능성이 높기 때문에 중독복용에 조심할 필요가 있습니다.)
- 2) 다음 약물을 투여받고 있는 환자 : 스테로이드제, 항생물질, 항암제, 아플렉 항진균(곰팡이)제(대체로 백혈구감소나 혈소판감소 등이 나타날 수 있습니다. 위·십이지장질환의 치료를 받고 있는 사람은 라니티딘이나 유사약이 처방되어 있을 가능성이 높기 때문에 중독복용에 조심할 필요가 있습니다.)
- 3) 적혈구감소증, 혈소판감소증, 백혈구감소증 등의 혈액이상성의 병력이 있는 환자(혈구수의 감소가 증가될 수 있습니다.)
- 4) 히스타민 H<sub>2</sub>-수용체 길항제(억제제)에 과민증의 병력이 있는 사람
- 5) 소아(15세 미만) 및 고령자(노인)(80세 이상) : 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며 사용경험이 적습니다. 80세 이상의 고령자 노인에서는 신기능의 저하로 인해 혈중농도가 높아져 약효가 강하게 발현(드러날)될 수 있습니다.
- 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부 : 임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며, 라니티딘은 모유 중 이행되므로 수유부에 투여할 경우에는 수유하지 않도록 하십시오.
- 7) 특식요법을 받고 있는 환자

8) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당 결핍(분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 모도당-갈락토오스 흡수장애 (glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 또는 다른 약제를 복용 중인 환자 : 약물 상호작용에 의해 부작용의 발현(드러날) 및 효과의 감소가 나타날 수 있습니다.
- 2) 약물에 의한 과민증의 병력이 있는 사람
- 3) 고령자(노인)(65세 이상) : 80세 미만의 고령자(노인)에 대해서도 생리가능 차이에 의한 개인차가 있으므로 신중히 투여합니다.
- 4) 인위(무균)증, 기침 및 고열이 있는 환자  
 심각한 감염증의 오라가 있으며, 혈구감소 등의 혈액이상에 인정될 수 있습니다. 이러한 증상은 본 제의 복용에 의해 증상이 악화되거나 약의 부작용을 은폐시킬 수 있습니다.
- 5) 위인발염의 재증상자가 있는 환자
- 6) 복통(배가痛)이 지속되고 있는 환자 : 원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있습니다.

3. 부작용

본제의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 발현(드러날)될 수 있습니다. 이러한 경우에는 즉시 복용을 중지하고, 의사 또는 약사와 상담하십시오.

- 1) 알레르기 증상 발현 : 발적(종열되어 붉어짐), 가려움, 부종(부기), 변비, 설사, 구토, 두통, 어지러움, 근육통 등의 증상이 나타나는 경우(라니티딘염산염의 부작용 증상으로서 이들 증상이 알려지지 않고, 드물게 중독한 부작용을 일으키는 경우가 있습니다.)
- 2) 본제의 복용 후 즉시 가슴둔탁한 등과 함께 안색이 창백하게 되고 손발이 차가워지며, 식은땀, 구역질 등이 나타나는 경우
- 3) 고열을 동반한 발진, 발적(종열되어 붉어짐), 열에 의한 탈수 등 심한 증상이 전신피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우
- 4) 목의 통증, 발열, 관절염, 얼굴과 눈꺼풀의 안색이 하얗게 변함, 출혈이 쉽게 됨(지혈(잇몸)의 출혈, 비출혈(코피) 등)이 나타나는 경우
- 5) 항진

4. 일반적 주의

- 1) 3일간 복용하여도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 다른 질환이 있을 수 있으므로 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.
- 2) 2주년을 초과하여 연용(계속 복용)하지 마십시오.
- 3) 본제를 복용할 때에는 알콜음료는 삼가하지 마십시오(알콜 농도를 높일 수 있음).
- 4) 장래의 용량을 초과하여 복용한 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.
- 5) 기생충 효능 이외의 증상에는 복용하지 마십시오.
- 6) 장기 연용(계속 복용)을 하지 마십시오.
- 7) 신장(콩팥)병의 병력이 있는 환자는 복용 전에 의사 또는 약사와 상담하십시오.

5. 상호작용

- \* 본제에 함유된 제산제는 다음 약물들과 상호작용으로 흡수가 저해될 수 있습니다.  
 - 테트라사이클린계 항생물질(테트라사이클린 등) - 뉴클레오타이드 유사체(아미노글리코사이드 등)  
 - 테트라사이클린계 항생물질(테트라사이클린 등) - 뉴클레오타이드 유사체(아미노글리코사이드 등)
- \* 본제를 다른 위장약과 병용(함께 복용)하지 마십시오.  
 다른 위장약을 동시에 병용(함께 복용)하면 작용이 강하게 발현(드러날)되어 예기치 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.

6. 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부

임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며, 라니티딘은 모유 중으로 이행되므로 수유부에 투여한 경우에는 수유하지 않도록 주의하십시오.

7. 소아에 대한 투여 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않습니다(사용경험이 적습니다).

8. 고령자(노인)에 대한 투여(65세 이상)

80세 미만의 고령자(노인)에 대해서도 생리가능 차이에 의한 개인차가 있으므로 신중히 투여하십시오.

9. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선이나 고온을 피하고 습기가 적고 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

저장방법

기밀용기, 실온(10~30°C)보관

포장단위

20정

- \* 만약 구입 당시 사용(유효)기간이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오염되거나 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- \* 본 제품이 이상에 있을 경우 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
- \* 본 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지 [www.boryung.co.kr](http://www.boryung.co.kr) 또는 소비자상담실에서 확인할 수 있습니다.
- \* 약의 효능 용어 설명 및 기타 자세한 약의 효능정보는 의약품통합정보시스템([medrug.mfds.go.kr](http://medrug.mfds.go.kr))을 참조하시기 바랍니다.
- \* 본 약제 투여 목적은 복용 후 부작용(이상사례)이 발생된 경우 한국약물안전관제센터(1644-6223)으로 문의 및 보고하기 주시고, 돌발 기간에 의약품 부작용을 피해구제 신청을 하실 수 있습니다.
- \* 사용(유효)기간이 경과한 제품은 사용하지 마시기 바랍니다.

소비자상담실 수신자부담전화 : 080-708-8088

첨부문서 작성일자 : 2019년 04월 16일

**보령제약**

제조와 유통 및 판매자 : 보령제약(주) 경기도 안산시 단원구 능안로 107, 109  
 제조자 : (주)녹십자 중앙중독 응급센터 금강을 무로로 65번길 26