

빠르고 강력한 근육이완제

담엔썩^정

클로르록사존 250mg

아세트아미노펜 300mg

본 약은 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

[원료약품 및 그 분량] 1정 (685mg) 중

클로르록사존(KP)..... 250mg

아세트아미노펜(KP)..... 300mg

■ 첨가제: 미결정셀룰로오스, 히드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 스테아르산마그네슘, 히프록셀로오스, 폴리에틸렌글리콜6000, 텔크, 산화티탄

[성상] 흰색의 정방형 필름코팅정

[용법·용량] 성인: 1회2정, 1일4회까지 공복시를 피하여 복용한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

[효능·효과] 신경통, 근육통, 관절통, 요통, 골관절통, 건통, 근경련, 근경직증 근육의 이상 긴장을 수반하는 제 질환

[사용상의 주의사항]

1. 경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람에 의 아니 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사의 상의해야 한다. 이러한 사람이 해 약을 복용하면 간 손상이 유발될 수 있다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 증상을 주의할 것

이 약에는 아세트아미노펜이 함유되어 있다. 다른 아세트아미노펜 제제와 함께 복용하여 일일 최대용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제제와 함께 복용해서는 안 된다.

3. 다음 환자에는 투여하지 말 것

1) 클로르록사존에 과민증 환자 2) 아세트아미노펜에 과민증 환자 3) 지금까지 이 약에 의한 과민증상을 들은 발진, 발진, 가려움, 부종(특히 눈꺼풀, 입술 등), 호흡곤란을 일으킨 적이 있는 사람 4) 지금까지 이 약 또는 다른 진통제, 해열진통제를 사용하여 전신에 나타난 적이 있는 사람

4. 복용상 주의사항

1) 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담 할 것 - 이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종(특히 눈, 입술, 혀), 호흡곤란 등 과민증과 함께 알레르기 반응이 나타날 수 있다. 이러한 증상은, 특히, 알레르기 반응이 나타나는 경우 - 과민증 수반하여 발진, 발진, 화상모양 수포 등의 국한된 증상이 전신부위, 입 및 눈의 점막에 나타날 경우 - 전신에 나타난 경우 2) 비로보정제 약을 삼킬 경우 항응고제 및 알코올을 포함한 약제는 다량의 아세트아미노펜을 대시시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다. 알코올은 아세트아미노펜 과량투여의 간독성을 증가시킬 수 있다.

5. 다음 경우에는 신중히 투여할 것

1) 심한 간, 신장에 환자 2) 알레르기 환자 또는 약을 알레르기 가 있었던 환자

6. 부작용

1) 과민증: 두드러기, 발진, 가려움증과 같은 과민증이 나타나는 부위를 중지 한다. 드물게 알레르기성 피부 발진, 점상출혈, 반상출혈, 요변색 등이 나타날 수 있다. 매우 드물게 혈관신경성 부종 또는 아나필락시스증상이 나타날 수 있다. 2) 간장: 클로르록사존에 의해 간 손상이 나타날 수 있으므로 간기능 이상을 나타내는 부위를 중지한다. 3) 소화기: 때때로 위장장애가 나타날 수 있으며 드물게 위장출혈이 나타날 수 있다. 4) 정신장애: 때때로 졸음, 어지러움, 두통, 권태, 과도한 흥분이 나타날 수 있다.

7. 임부에 대한 투여

임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우 투여한다.

8. 상호작용

알코올이나 중추신경계억제제와 병용투여시 삼각작용이 나타날 수 있으므로 신중히 투여한다.

9. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 대로 습기가 적고 서늘한 곳에 밀봉하여 보관 할 것 3) 유효기간을 마치고 동량을 보존하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것

[저장방법] 기밀용기, 실온(15~30℃) 보관

[사용기한] 제조일로부터 36 개월

[포장단위] 10정/PTP포장

구입시 사용기간이 경과하였거나 변질 또는 오손된 제품은 약국, 병원, 의원, 도매상 개설자에 한하여 교환하여 드리오나 이와 같은 제품은 구입 유통 경로를 통해서 반송하여 주시기 바랍니다.

소비자 문의는 본사 마케팅팀 (수신자부담:080-549-0002)에서 상담해 드리며, 제조과정과 관련된 제품의 품질에 대한 문의사항은 책임공장 품질경영팀 (전화:080-332-0002)로 연락바랍니다.

제품 사용 후 부작용 (이상반응)이 발생한 경우, 한국의약품안전관리원 (1644-6223)에 문의 및 보고하여 주시기 바랍니다.

설명서작성년월일 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(www.jeils.co.kr) 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

설명서작성년월일 : 2019.05.21

제조의뢰 및 판매원 제일헬스사이언스주식회사

경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 7B동

제조원 ㈜레고켐켐약 경기도 안성시 원곡면 원당로 354