

전문 의약품

텔미암로정 40/5mg, 40/10mg, 80/5mg

V.190716

※ 의약품을 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고 약과 함께 보관하십시오.

[원료약품 및 그 분량]

텔미암로정 40/5mg : 1정중

■ 유효성분 : 텔미사르탄(EP)

암로디핀베실산염(USP)

■ 기타첨가제 : 수산화나트륨, 히드로클로로소, 무수인산수소칼슘, 메타규산알루미늄산화물, 치치한도히

트록시프로필셀룰로오스, 미결정셀룰로오스, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, D-만니톨, 크

로스포비돈, 클로이드스이산화규소, 스테아릴무마르산나트륨

텔미암로정 40/10mg : 1정중

■ 유효성분 : 텔미사르탄(EP)

암로디핀베실산염(USP)

■ 기타첨가제 : 수산화나트륨, 히드로클로로소, 무수인산수소칼슘, 메타규산알루미늄산화물, 치치한도히

트록시프로필셀룰로오스, 미결정셀룰로오스, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, D-만니톨, 크

로스포비돈, 클로이드스이산화규소, 스테아릴무마르산나트륨

텔미암로정 80/5mg : 1정중

■ 유효성분 : 텔미사르탄(EP)

암로디핀베실산염(USP)

■ 기타첨가제 : 수산화나트륨, 히드로클로로소, 무수인산수소칼슘, 메타규산알루미늄산화물, 치치한도히

트록시프로필셀룰로오스, 미결정셀룰로오스, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, D-만니톨, 크

로스포비돈, 클로이드스이산화규소, 스테아릴무마르산나트륨

[성상] 흰색 또는 미백색의 정방형 정제

[효능·효과] 암로디핀 또는 텔미사르탄 단독요법으로 협압이 적절하게 조절되지 않는 본태성 고혈압

[용법·용량] 이 약의 권장용량은 1일 1회 1정으로, 식사와 관계없이 물과 함께 복용한다. 가능하면 매일 같은 시간에 :

아침에 복용하는 것이 권장된다.

이 약을 투여하기 전에 개개의 성분(암로디핀 또는 텔미사르탄)으로 용량을 조절할 것이 권장되나, 다음과

같이 개개의 성분에 대한 협압이 조절되지 않는 경우 이 약으로 바로 전환하는 것을 고려할 수 있다.

- 40/5암로디그램 : 암로디핀 5밀리그램 또는 텔미사르탄 40밀리그램으로 협압이 적절하게 조절되지 않

는 환자에게 투여한다.

- 80/5밀리그램 : 암로디핀 5밀리그램 또는 이 약 40/5밀리그램으로 협압이 적절하게 조절되지 않는 환

자에게 투여한다.

- 40/10밀리그램 : 암로디핀 10밀리그램으로 협압이 적절하게 조절되지 않는 환자에게 투여한다.

○ 신장애환자 : 경증 및 중증도 신장애 환자인 경우 용량조절이 필요치 않으나, 중증의 신장애 환자인 경

우 낮은 용량으로 치료를 시작하는 것이 권장되며, 용량을 서서히 증가한다. 또한 혈청 칼륨 및 크레아

티닌 수치에 대한 주기적인 모니터링이 권장된다.

○ 신장애환자 : 경증 또는 중증증의 신장애 환자에 대한 텔미사르탄의 1일 투여량은 40밀리그램을 초과

하지 않아야 한다.

○ 고령자 : 75세 이상의 고령자인 경우, 암로디핀의 청소율이 감소되어 있으므로, 낮은 용량으로 치료를

시작하여, 용량을 서서히 증가한다.

○ 소아 : 만 18세 이하의 소아환자에 대한 안전성·유효성이 확립되어 있지 않아 이 약의 투여가 권장되

지 않는다.

[사용상의 주의사항]

1. 고혈압 이 약과 같이 레닌-안지오텐신계에 직접적으로 작용하는 약물을 임부에 투여하는 경우 자라나는 태아 또는 신장

아에게 병적 상태 및 사망을 일으킬 수 있다. 특히 임신 2기 3개월 및 3기 3개월 중의 이러한 약물의 사용은 저

혈압, 신장애 등에게 병상 저하를, 무뇌증, 가역적 또는 비가역적인 신부전 및 사망을 포함한 태아 또는 신장의 손상과 관련성이 있다. 태아의 신기능의 저하가 확인될 것으로 추정되는 양수과다증이 보고된 바 있으며, 양수과

다증은 태아의 사지연속, 두개연가형, 폐의 형성저하증과 관련성이 있다. 마취, 자궁내 성장 지연, 근육과열증

증이 보고된 바 있으나, 이 약 노출에 의한 것인지 여부는 명확하지 않다. 임상이 진단된 경우에는 가능한 빨리 이 약의 투여를 중단해야 한다.

2. 다른 환자에는 투여하지 말 것

1) 이 약의 주성분 또는 디하이드피리딘계 유도체에 과민증이 있는 환자

2) 임부(임신 2기 및 3기) 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인

3) 수유부 4) 담도폐쇄성 질환자 5) 중증의 신장애 환자 6) 중증의 대동맥판막질환 환자

7) 환자 8) 이 약의 첨가제에 대해 불내성 등의 유전적인 문제가 있는 환자

9) 알코올이나 중증도~중증의 신장애 환자(사구체여과율 60mL/min/1.73m²에서 알리스키렌 함유제제의 병용

3. 다른 환자에는 신중히 투여할 것

1) 혈압상 암도스테론증 환자 : 혈압상 암도스테론증 환자의 경우, 일반적으로 레닌-안지오텐신계를 저해하는 협

압강하제는 효과가 없으므로 이 약의 사용은 권장되지 않는다. 2) 동맥관 또는 순도관협착증 환자나 폐쇄성 비후

성 심근병증 환자 : 다른 혈관(인대와 마산가지로 동맥관 또는 순도관협착증 환자나 폐쇄성 비후성 심근병증 환

자의 경우, 특히 주의하여 한다. 3) 신장애 환자 : 암로디핀은 간에서 광범위하게 대사되며 텔미사르탄은 거의 대

부분 담즙으로 배설된다. 따라서 담즙 정체, 담도폐쇄성 질환이 있는 환자나 신장애 환자의 경우 간 정소를 감소

를 예상할 수 있다. 따라서 경증 또는 중증증의 간기능 장애 환자에는 주의하여 투여해야 하며, 1일 1회 텔미사르

탄 40밀리그램을 초과하지 않아야 한다. 4) 혈당성 위 또는 십이지장궤양 등 위장관계 질환 환자 : 텔미사르탄투

여시 위장관계 이상반응이 위약 투여시보다 더 자주 나타났다. 위장관 출혈이 임상시험에서 드물게 관찰된 바 있

으며 대부분 위장관 질환을 가진 환자에서 초기에 나타났다. 따라서 위장관계 질환자에게 이 약을 투여할 때는

주의하여야 한다. 5) 신질환과 고혈압 환자 : 좌우 방맥의 신동맥협착증이나 만성 신장만 기능하는 경우의 신동맥

협착증이 있는 환자를 레닌-안지오텐신-알도스테론계에 영향을 미치는 약물로 치료할 경우에는 중증의 저혈압이나

신부전의 위험이 증가된다. 양쪽 또는 한쪽의 신동맥협착증이 있는 환자에게 이 약을 투여할 경우 안지오텐신

전환효소(ACE) 저해제와 마찬가지로 혈장 크레아티닌 또는 혈중 요산질소의 상승이 예측된다. 6) 중증의 저혈압

환자 7) 투석을 해야 하는 신부전 환자 8) 고령자 9) 레닌-안지오텐신-알도스테론계(RAAS)의 이중차단·안지오텐

신신용제 차단제(ARB), ACE억제제, 또는 알리스키렌 등 레닌-안지오텐신-알도스테론계(RAAS)에 영향을 미

치는 다른 약제와의 병용은 권장되지 않는다.

4. 이상반응

1) 텔미사르탄과 암로디핀 복합제

1) 임상시험 : 텔미사르탄과 암로디핀의 병용투여는 1,200명 이상의 고혈압 환자들에서 그 안전성이 평가되

었다. 이 환자들 중 320명은 6개월 이상 이들 약물에 노출되었으며 120명은 1년 이상 노출되었다. 이상반

응은 전반적으로 경증으로 임상시험에 발현되었으며, 치료 중단이 필요한 경우는 드물었다.

위약 대조 요인 설정 임상 시험에서 2% 이상 발생한 이상반응으로 위약군(n=46)에 비해 암로디핀/텔미사

르탄 투여군(n=789)에서 더 높은 빈도로 발생한 이상반응은 다음과 같다.

표 1. 2% 이상 발현되었으며, 위약보다 발현율이 높은 이상반응

	암로디핀/텔미사르탄 병용투여군 (n=789)	위약군 (n=46)
말초부종	4.8%	0.0%
어지러움	3.0%	2.2%
가림성 저혈압*	6.3%	4.3%
지열	2.2%	0%

*가림성 저혈압 : 이완기 혈압 >10mmHg 감소 및/또는 수축기 혈압 >20mmHg 감소

또한 이 약을 투여받은 환자에서 1% 이상 발현된 다른 이상반응으로는 어지러움 (2.0% vs 2.2%, 위약

대비) 및 두통 (1.4% vs 4.3%, 위약 대비)이 있었다.

동 임상 시험에서 이 약을 투여받은 모든 치료 환자군의 2.2% 및 위약으로 투여받은 환자군의 4.3%에서

이상 반응으로 0% 이상 시험을 중단하였다. 이 약의 치료를 중단하게 된 가장 흔한 이유는 말초부종, 어

지러움 및 저혈압 (각각 0.5% 이하)이었다.

2) 국내 시험 후 조사 결과 : 국내에서 재사용을 위하여 6년 동안 610명을 대상으로 실시한 시험 후 조사 결

과, 이상사례의 발현율은 인과관계와 상관없이 3.28%/20/610명, 총 20건으로 보고되었다. 이 중 중대한

이상사례의 발현율은 0.49%/610명, 총 3건으로 간세포염, 뇌경색, 울혈성심부전 각 0.16%/610명, 1 건으로 보고되었다. 이

외에 인과관계와 상관없이 보고된 이상반응은 0.16%/610명, 총 1건으로 울혈성심부전 0.16%/610명, 1건이 보고되었다.

예상하지 못한 이상사례의 발현율은 인과관계와 상관없이 1.31%/610명, 총 8건으로 보고되었으며, 간세

포염증, 근육결핵증증, 뇌경색, 목통증, 비인두염, 상복부불쾌감, 상복부 통증, 체위성어지럼증 각

0.16%/610명, 1건으로 조사되었다. 이 중, 이 약과 인과관계로 배제할 수 없는 예상하지 못한 약물이상

반응 발현율은 0.33%/20/610명, 총 2건으로 상복부불쾌감, 체위성어지럼증 각 0.16%/610명, 1건이 보고

되었다.

2) 텔미사르탄 : 위약대조 임상시험에서 텔미사르탄을 투여한 환자에서 1% 이상 나타났으며 위약 투여환자보다

더 빈번하게 발현된 이상반응은 다음과 같다.

표 2. 1% 이상 발현되었으며, 위약보다 발현율이 높은 이상반응

	텔미사르탄 투여군 (n=1,455)	위약군 (n=380)
심기조 감염	7%	6%
요통	3%	1%
부비염	3%	2%
설사	3%	2%
인후염	1%	0%

또한 텔미사르탄을 투여받은 환자에서 1% 이상 발현된 다른 이상반응은 위약군과 유사한 빈도로 발생한 이상

반응은 인후염(약 2% 중후, 소화불량, 근육통, 요로감염, 복통, 두통, 어지러움, 통풍, 피로, 기침, 고혈압,

통풍, 구역 및 구토)이었다. 이외에 추가적으로 보고된 이상반응은 다음과 같다.

- 자율신경계 : 발기부전, 발반비 증가, 홍조

- 정신 : 알레르기, 발열, 다리 통증, 편두통

- 심혈관 : 두근거림, 의조성 부종, 협심증, 흉통, 맥, 다리부종, 비정상적인 ECG

- 순상신경계 : 불면증, 혼란, 편두통, 긴장, 감각이상, 혈수위권 수축, 감각저하

- 위장관 : 방귀, 변비, 위염, 구역, 구강건조, 치질, 위장염, 장염, 위식도 역류, 치통, 비특정 위장관질환

- 대사성 : 통풍, 고콜레스테롤혈증, 당뇨

- 근육격계 : 관절염, 관절염, 다리 저림

- 정신계 : 불면, 우울, 신경과민

- 내상기계 : 신장, 신근감염, 열성, 중이염

- 호흡기계 : 천식, 기관지염, 비염, 호흡곤란, 코출혈

- 피부 : 피부염, 발진, 습진, 가려움증

- 비뇨기계 : 잦은 배뇨, 방광염

- 일반계 : 뇌혈관질환

- 특수 감각 : 시각 이상, 결막염, 귀울음, 귀의 통증

- 초기 임상시험 도중 혈관 부종이 1건 보고되었다.

위약 대조 임상시험에서 다음과 같은 실험실적 검사치 이상이 보고되었다.

- 혈액요소질소 : 2g/dL 이상 감소한 환자(텔미사르탄 투여군에서 0.8%, 위약군에서 0.3% 보고되었다. 빈

혈로 인한 요염을 중단한 환자는 없었다.

- 크레아티닌 : 0.5mg/dL 이상 증가한 환자(텔미사르탄 투여군에서 0.4%, 위약군에서 0.3% 보고되었다.

텔미사르탄투여군 중 1명의 환자(가 크레아티닌 및 혈중 요소질소(blood urea nitrogen, BUN)의 증가로 투여를 중단하였다.

- 간효소 : 텔미사르탄투여군 중 일부 환자에서 간수치 상승이 보고되었다. 현저한 수치 상승은 위약군에서

더 높은 빈도로 발생하였다. 텔미사르탄 투여 환자 중 간기능 이상으로 인해 치료를 중단한 환자는 없었다.

추가적인 안전성 정보는 텔미사르탄 단일제 허가사항을 참조한다.

3) 암로디핀

가장 일반적으로 보고된 이상반응은 두통 및 부종이다. 용량의존적으로 보고된 이상반응 발현율은 다음과 같다.

표 3. 용량의존적으로 보고된 이상반응 발현율(이상반응

이상반응	암로디핀 2.5mg (n=275)	암로디핀 5.0mg (n=296)	암로디핀 10.0mg (n=268)	위약 (n=520)
부종	1.8%	3.0%	10.8%	0.6%
어지러움	1.1%	3.4%	3.4%	1.5%
홍조	0.7%	1.4%	2.6%	0.0%
두근거림	0.7%	1.4%	4.5%	0.6%

또한 위약대조 임상시험에서 암로디핀을투여받은 환자에서 1% 이상 발현된 다른 이상반응은 다음과 같다.

표 4. 위약대조 임상시험에서 1% 이상 발현된 이상반응

이상반응	암로디핀투여군 (n=1,730)	위약군 (n=1,250)
두통	7.3%	7.8%
피로	4.5%	2.8%
구역	2.9%	1.9%
복통	1.6%	0.3%
졸음	1.4%	0.6%

이외에도 추가적으로 보고된 이상반응 (0.1% ~ 1% 발현)은 다음과 같다.

- 심혈관계 : 부정맥 (상실성빈맥 및 심방세동 포함), 서맥, 흉통, 말초 허혈, 실신, 체위성 저혈압, 혈관염

- 중추 및 말초 신경계 : 말초신경병증, 감각이상, 말열, 혈소판

- 위장관 : 식욕부진, 변비, 소화불량, 삼킴장애, 설사, 방귀, 경련증, 구역, 체중증가, 체중감소

- 전신 : 알레르기 반응, 위독증, 요통, 작업불능(light flush), 편두통, 통증, 경직, 체중증가, 체중감소

- 근육격계 : 관절염, 관절염, 근육경직, 근육통

- 정신계 : 생기능 부전(설상 및 여성), 불면증, 신경과민, 우울, 비정상적인 꿈, 불안, 이인증

- 호흡기계 : 호흡곤란, 코출혈

- 피부 및 부속기관 : 혈관부종, 다형성홍반, 가려움증, 발진, 홍반성 발진, 반구진성 발진

- 특수 감각 : 시각 이상, 결막염, 복시, 안구 통증, 귀울음

- 비뇨기계 : 잦은 배뇨, 배뇨 장애, 뇨증

- 자율신경계 : 구강 건조, 발반비 증가

- 대사 및 영양 : 고혈압, 저혈

- 혈액 : 백혈구 감소증, 자색반증, 혈소판 감소증

- 혈액 : 백혈구 감소증, 자색반증, 혈소판 감소증

임상시험에서암로디핀 투여와 연관된 임상적으로 유의한 실험실적 검사 이상은 관찰되지 않았다.

암로디핀 투여 환자에서 0.1% 이하의 빈도로 보고된 다른 이상반응들은 다음과 같다. : 심부전, 맥박 불규칙,

주기의 수축, 피로, 발작, 가려움증, 피부 건조, 발모, 피부염, 근육 약화, 단일 수축, 조화운동불능, 과다근육긴

장증, 편두통, 병용부종, 무감동증, 조, 기억상실, 위권, 식욕 증가, 붉은 변, 비염, 배뇨 장애, 다뇨증, 이상 후

각, 미각 이상, 비정상적인 안구 조절, 눈마비증

추가적인 안전성 정보는 암로디핀 단일제 허가사항을 참조한다.

4) 시판 후 사용감염

텔미사르탄 또는 암로디핀의 시판 후 사용감염에서 보고된 이상반응은 다음과 같다.

- 텔미사르탄 : 가장 흔한 저발증으로 보고된 이상 반응은 두통, 어지러움, 두통, 두통, 구역, 구역, 복, 위, 부

통, 안면 부종, 하지 부종, 혈관부종(상지 경과 수반), 가려움증, 과민반응, 발한 증가, 흉부, 흉통, 심방세

동, 울혈성 심부전, 심근경색, 협압 상승, 고혈압 악화, 저혈압 (가림성 저혈압 포함), 고혈압혈증, 저혈당당

노 환자에서, 실신, 소화불량, 설사, 통풍, 요로 감염, 발기 부전, 요통, 복통, 근육 경련 (다리 경련 포함),

근육통, 서맥, 호산구증가증, 혈소판감소증, 요산 증가, 기능성 이상 및 간질환*, 급성 신부전을 포함하는 신

장역, 빈혈, CPK 상승, 아나필락시 반응, 혈중 통증 (간염 및 간조염 포함)이었다. 텔미사르탄을 포함하는

신용제 차단제(ARB)를 투여 받고 있는 환자들에서 드물게 혈관근육병증이 보고된 바 있다.

* 텔미사르탄의 간기능 이상 및 간질환 시판 후 이상반응은 이러한 이상반응이 발현될 것으로 예상되는 일

반 환자에서 대부분 발생하였다.

- 암로디핀 : 여성형 유방증이 드물게 보고되었으며 약과의 인과관계는 불확실했다. 혈당 및 간효소 수치 상

승 (대부분 쓸개즙 정체 또는 간염과 함께 나타남)이 암로디핀의 사용과 관련하여 보고되었으며 몇몇 사례

는 혈압이 필요할 정도로 중증이었다. 추체외로 장애, 백혈구 감소증, 혼란상태, 백혈구 피부염, 스티븐스-

존슨 증후군, 광과민 반응, 독성피부괴사증후군이 보고되었다 (빈도 불명).

5. 일반적 주의

1) 임신 : 임신 기간 중에 안지오텐신 II 수용체 길항제 투여를 시작해서는 안 된다. 만약 안지오텐신 II 수용체 길

항제의 지속적 치료가 필수적이지 않다면, 임신을 계획 중인 환자는 임부의 사용에 대해 안전성 프로파일의 확

립된 다른 고혈압 치료제로 대체하여야 한다. 임신이 진단된 경우에는 가능한 빨리 안지오텐신 II 수용체 길항

제의 치료를 중단하여 하며, 만약 적절하다면, 다른 치료제로 치료를 시작해야 한다.

2) 저혈압 : 혈액이나 염류가 부족한 환자 (예, 고혈압의 이뇨제로 치료 받고 있는 환자)와 같이 레닌-안지오텐신

시스템이 활성화된 환자들에서는 이 약의 치료를 시작한 후에 증후성 저혈압이 발생할 수 있다. 이러한 상태

는 이 약을 투여하거나 조정하거나 면밀한 의학적 감독 하에 이 약의 용량을 감소하여 치료를 시작하여야

한다. 저혈압이 발생한 경우 환자를 빈번히 눕히고 필요하면 생리 식염수를 정맥주사로 정맥 투여한다. 일시적

인 저혈압 반응은 암로디핀의 치료에 대한 급기 사상이 아니며, 일반적으로 일단 협압이 안정화되면 어려움 없

이 치료를 지속할 수 있다.

3) 고혈압혈증 : 텔미사르탄의 경우 레닌-안지오텐신-알도스테론계에 영향을 미치는 다른 약물로 치료할 때

특히 신장애 환자 및/또는 심부전 환자의 경우, 고혈압혈증이 일어날 수 있다. 위험이 있는 환자에 대해서 협

정 칼륨의 적절한 모니터링이 권장된다. 레닌-안지오텐신계에 영향을 미치는 다른 약물의 사용감염을 방

우, 칼륨투석상 노제, 칼륨보충제, 칼륨이 함유된 염 대용물 및 칼륨채상 상승시킬 수 있는 다른 약제(파

린 용액)의 병용에 의해 심한 저칼륨이 발생할 수 있으며 이 약과 RAAS에 작용하는 다른 약물을 병용투여

할 때 신장애 환자 및/또는 심부전 환자의 경우, 고혈압혈증이 발생할 수 있다. 위험이 있는 환자에 대해서 협

정 칼륨의 적절한 모니터링이 권장된다. 레닌-안지오텐신-알도스테론 시스템 저해에 대한 결

과로 신기능의 변화가 예상될 수 있다. 신기능이 레닌-안지오텐신-알도스테론 시스템 저해에 대한 결

과로 신기능의 변화가 예상될 수 있다. 신기능이 레닌-안지오텐신-알도스테론 시스템 저해에 대한 결

과로 신기능의 변화가 예상될 수 있다. 신기능이 레닌-안지오텐신-알도스테론 시스템 저해에 대한 결

과로 신기능의 변화가 예상될 수 있다. 신기능이 레닌-안지오텐신-알도스테론 시스템 저해에 대한 결

과로 신기능의 변화가 예상될 수 있다. 신기능이 레닌-안지오텐신-알도스테론 시스템 저해에 대한 결

과로 신기능의 변화