

슬림미니 정

- 300정 -

일반의약품
조제용

【원료약품 및 그 분량】 1정(596mg) 중

•유효성분 : 알긴산(NF) 200mg, 카르복시메틸셀룰로오스나트륨(USP)100mg
•기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 시트르산수화물, 이산화규소, 포비돈, 라우릴 황산나트륨, 침강탄산칼슘, 스테아르산마그네슘, 히프로멜로오스, 이소프레이GA II EKRPO1A 백색, 산화티탄, 프로필렌글리콜, 적색산화철

【성상】 분홍색의 장방형 필름코팅정제 【용법·용량】 1일 3회 2정씩 식전에 복용하고 필요에 따라서는 취침전에 추가로 2정 복용가능하다. 충분한 양의 물과 함께 복용하는 것이 좋다. 권장량을 최소 3-4주간 복용할 것이 권장된다. 【효능·효과】 음식을 섭취 감소를 통한 체중감량의 보조요법 【사용상의 주의사항】 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 이 약 및 이약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자 3) 유소아 2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. 다른 약물과 상호작용을 방지하기 위해 다른 약과 동시에 복용하지 않는 것이 좋으며, 복용할 경우 30분~1시간의 간격을

RpBio

알피 바이오

Tab.

SLIMMINI

두고 복용하는 것이 권장된다. 3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 1) 임부 및 수유부 2) 소화기 장애 환자 4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 이 약은 복부 팽만감, 구역, 변비 또는 설사가 발생할 수 있으며 이와 같은 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것. 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것. 5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 위산 농도가 저하된 경우 이 약의 포만효과가 감소하거나 소실될 수 있다. 6. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다. 2) 정해진 보관조건에서 보관하도록 하며, 유효기간이 지난 약은 복용해서는 안 된다.

【포장단위】 300정/병

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【소비자상담실】 02-2002-9715

【제조외뢰자】 (주)알피바이오(경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7)

【제조사】 (주)넥스팜코리아(충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 168-41)

※ 자세한 정보는 의약품안전나라(<http://nedrug.mfds.go.kr>)참조

제조번호:

사용기한:

40*20mm

11.7mm