

알카메틸정

일반의약품
300정

[원료약품 및 분량] 1정(596mg) 중

■ 유효 성분 : 알긴산(NF) 200mg
카르복시메틸셀룰로오스나트륨(USP) 100mg

■ 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 시트르산수화물, 이산화규소, 포비돈K-30, 라우릴황산나트륨, 침강탄산칼슘, 스테아르산마그네슘, 히프로멜로오스2910, 이스프레이GA II EKRPB01A 백색, 산화티탄, 프로필렌글리콜, 적색산화철

[효능 및 효과] 음식물 섭취 감소를 통한 체중감량의 보조요법

[용법·용량] 1일 3회 2정씩 식전에 복용하고 필요에 따라서는 취침전에 추가로 2정 복용가능하다. 충분한 양의 물과 함께 복용하는 것이 좋다. 권장량을 최소 3-4주간 복용할 것이 권장된다.

[성상] 분홍색의 장방형 필름코팅정제

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자 3) 유·소아

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

다른 약물과 상호작용을 방지하기 위해 다른 약과 동시에 복용하지 않는 것이 좋으며, 복용할 경우 30분~1시간의 간격을 두고 복용하는 것이 권장된다.

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 임부 및 수유부 2) 소화기 장애 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약은 복부 팽만감, 구역, 변비 또는 설사가 발생할 수 있으며 이와 같은 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것.

2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것.

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

2) 위산 농도가 저하된 경우 이 약의 포만효과가 감소하거나 소실될 수 있다.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 정해진 보관조건에서 보관하도록 하며, 유효기간이 지난 약은 복용해서는 안 된다.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기간] 제조일로부터 36개월

[포장단위] 300정/병

[소비자상담실] 063-853-8110

[제 조 자] (주)넥스팜코리아 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 168-41

[제조외주자] 한국신텍스제약(주) 전북 익산시 삼기면 산단오름길 106

제조번호:

사용기한:

40*20mm

11.7mm

개정일 20201216

조제용