

하도리정

V.210309

※ 의약품을 복용(사용)하기 전에 첨부 문서를 주의 깊게 읽으시고 약과 함께 보관하십시오.

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

■ 유효성분 : 진피(KP)	11.0mg
옥계(KP)	46.0mg
회향(KP)	12.0mg
옥두구(KP)	10.0mg
정향(KP)	6.0mg
고목(KP)	7.5mg
겐티아닌(KP)	7.5mg
침강탄산칼슘(KP)	66.5mg
탄산수소나트륨(KP)	312.5mg
합성구산알루미늄(KP)	136.7mg
탄산마그네슘(KP) ... 13.0mg (산화마그네슘으로서 5.46mg)	
디아스타제 · 프로테아제 · 셀룰라제2000II(KP) ...	20.0mg

■ 첨가제(동물유래) : 유당수화물(KP) 소/우유

■ 기타 첨가제 : 물엿, 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, L-멘톨, 전분글리콜산나트륨, 폴리에틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스, 히드로멜로오스

[성상] 백색의 장방형 필름코팅정

[효능·효과]

위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 체할, 구역, 구토, 위통, 신트림, 식욕감퇴(식욕부진), 소화불량, 과식, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감

[용법·용량]

만 15세 이상 : 1회 2정

1일 3회 식후 30분에 복용(사용)한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것.

- 1) 투석요법을 받고 있는 환자
- 2) 만 7세 이하의 어린이

3) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 테트라사이클린계 항생제

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 산정(콩팥)장에 환자
- 2) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
- 3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람

4. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약을 복용하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 경우
- 2) 2주정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 어린이 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여할 것
- 3) 나트륨 제한 식이를 하는 사람

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.

[포장단위] 10정/피티피, 10정/피티피(10정/PTP×10개입)

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기한] 외부 포장 참조

◆ 사용기한이 지난 제품은 복용하지 마시기 바랍니다.

◆ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여 주시기 바랍니다.

◆ 의약품의 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하시기 바랍니다.

◆ 최신의 정보로 변경된 내용은 지엘파마(주) 홈페이지(<https://www.glpharma.co.kr>)나 개발학술팀(☎080-850-3922)에서 확인할 수 있습니다.

◆ 본 의약품은 엄격한 품질관리(KGMP)를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 유효기간이 경과하였거나 변질 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

◆ 부작용 보고 및 피해구제신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223), 피해구제 제도 전용 상담번호(14-3330)

첨부문서 개정년월일 : 2021년 03월 09일

● 제조의뢰사 : 지엘파마(주) 경기도 안양시 만안구 시민대로 35

● 제조자 : 한솔신약(주) 충청북도 음성군 금왕읍 청평길 2-11