

효과빠른 변비약 자비웰정

정 300정

일반의약품

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

유효성분 :

수산화마그네슘(KP) 500mg

우르소데옥시콜산(KP) 10mg

노히엑스(EP) 100mg

(히드록시안트라센유도체(바바로인))으로서 20mg)

기타첨가제: 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 탭실드분홍색(11P712), 카르복시메틸셀룰로오스칼슘

[성 상] 분홍색의 타원형 필름코팅정제

[효능·효과] 변비, 변비에 따른 다음 증상의 완화: 식욕부진(식욕감퇴), 복부(배부분)팽만, 장내이상발효, 치질

[용법·용량] 1회 1정 성인(15세이상) 1일 3회, 11세~14세 1일 2회를 식전(식간(식사때와 식사때 사이))또는 식후)에 복용한다. 복용간격은 4시간 이상으로 한다. 다만, 초회(처음 복용)는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량(양을 늘림) 또는 감량(줄임)한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 급성복부질환(충수염, 장출혈, 궤양성 결장염 등) 환자 2) 장폐색(창자막힘) 환자

2. 이 약을 복용하는동안 다음의 약(식품)을 복용하지 말 것. 제산제 또는 우유섭취 후 1시간 이내

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 심한 복통(배 아픔) 또는 구역, 구토 환자 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성

3) 신장장애 환자 4) 다른 약물을 복용하고 있는 사람 5) 직장의 출혈 혹은 장부전의 병력이 있는 사람

* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만일 유통과정 중 변질 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다. * 소비자상담실 : 02-3413-3361 * 이 문안은(2021.03.21) 작성되었으며 이후로 변경된 내용 및 기타 자세한 의약품 정보는 성이바이오 홈페이지(www.sungyi.co.kr) 또는 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)-X의약품검색)에서 확인할 수 있습니다.

*제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국약품안전관리원(1644-6223)에 문의하여 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

Rev.01

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약을 복용함으로써 발진·충혈되어 붉어짐, 가려움, 심한 복통(배 아픔), 설사, 구토 등이 나타날 경우

2) 이 약을 복용함으로써 복부불쾌감, 경련이 일어날 경우 3) 1주 정도 투여하여도 변비의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의사항

1) 정해진 용법, 용량을 잘 지킬 것 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것

3) 장기간 계속 사용시 약물에 대한 내성이 증가하고 변비가 악화될 수 있으므로 1주일 이상 계속 사용해서는 안된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 변비의 원인을 조사할 것

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것. 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

[포장단위] 300정 / 병 [사용기간] 제조일로부터 36개월 [주의·부작용] [저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

제조사: **SUNGyi** Bio. 성이바이오(주) / 강원도 원주시 지정면 지래울로 184



HDPE 8 800724 000414



제조번호:

사용기한:

45mm X 14mm