

파모콤폴루정

V.21123

※ 의약품을 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고 약과 함께 보관하십시오.

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

- 유효성분 : 파모티딘(USP) 10mg
수산화마그네슘(KP) 165mg
침강탄산칼슘(KP) 800mg
- 첨가제(타르색소) : 황색203호, 청색2호, 청색1호
- 첨가제(동물유래) : 유당수화물(KP) 소/우유
- 기타 첨가제 : 스테아르산마그네슘, 오파드라이 녹색(03B41083), 옥수수전분, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 폴로이드성이산화규소

[성상] 연두색의 장방형 필름코팅정

[효능·효과] 위산과다 및 속쓰림과 관련된 가슴앓이의 경감

[용법·용량] 성인 및 만 15세 이상의 환자 : 이 약 1일 1회 1정을 복용한다. 24시간 안에 2정 이상을 복용하지 마십시오.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.
- 2) 이 성분 및 다른 H₂ 수용체 길항제(억제제)에 과민증이 있는 경우 사용하지 말 것
- 3) 복용에 어려움을 느낀다면 사용하지 말 것

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 1) 원인 불명의 체중 감소가 있는 환자 : 원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있다.
- 2) 복통이 지속되고 있는 환자 : 원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있다.
- 3) 신장(콩팥) 질환자 : 혈중 칼슘 농도를 측정할 것
- 4) 다른 약제를 복용중인 환자는 이 약을 복용하기 전에 의사 또는 약사와 상의할 것
제산제는 다른 처방약들과 상호작용을 일으킬 수 있다.

3. 부작용

- 1) 과민증 : 드물게 아나필락시스 반응이 나타날 수 있다.
- 2) 간장 : 드물게 효소이상(ALT)이 나타날 수 있다.
- 3) 소화기 : 때때로 구역과 설사가 나타날 수 있고, 드물게 변비, 식욕부진, 복부불 쾌감, 고창(복부팽만), 구토, 구갈(목마름) 등이 나타나는 경우가 있다.
- 4) 피부 : 드물게 발진, 가려움증, 덩마진(두드러기)이 나타날 수 있고, 예외적으로 다른 히스 타민-H₂ 길항제(억제제)와 마찬가지로 표피박리(벗겨짐)가 나타날 수 있다.
- 5) 기타 : 때때로 두통이 나타날 수 있고, 드물게 피로, 황달, 간염, 맥관신경증성 부종(부기), 관절통, 근육경련 등이 나타날 수 있다.

4. 일반적주의

- 1) 2주간 복용하여도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 다른 질환이 있을 수 있으므로 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것
- 2) 2주일을 초과하여 연용(계속 복용)하지 말 것
- 3) 정해진 용량을 초과하여 복용한 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것
- 4) 혈액투석환자에게 이 약과 인산염 결합제를 병용(함께 복용)할 경우 탄산칼슘 효능 손실 위험이 발생할 수 있다.