

일반의약품 정보

이 약을 사용하기 전 반드시 포장의 기재사항을 확인하세요

【유효성분】 1정 중

비사코딜(KP)	7 mg
도큐세이트나트륨(USP)	14 mg
우르소데옥시콜산(KP)	6 mg
노히엑스(EP)	50 mg
(히드록시안트라센유도체로서 9.0 mg)	

【효능 · 효과】

■ 변비 ■ 변비에 따른 다음 증상의 완화 : 식욕부진 (식욕감퇴), 복부(배부분)팽만, 장내이상발효, 치질

【용법 · 용량】 1일 1회 취침시 복용

- 만 15세 이상 : 1회 2정
- 만 11세 이상 ~ 만 15세 미만 : 1회 1과 1/3정

■ 만 7세 이상 ~ 만 11세 미만 : 1회 1정
다만, 초회(처음)는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량(양을 늘림) 또는 감량(줄임)

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1) 급성 복부(배부분)질환(중수염·장괴저·염, 장출혈, 궤양성 결장염 등) 환자 2) 장파색창자막염 환자 3) 만 7세 이하의 어린이 4) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다. 2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약·식품을 복용하지 말 것. 제산제 또는 우유 섭취 후 1시간 이내 3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 1) 심한 복통·배 아픔 또는 구역·구토 환자 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람 4) 직장의 출혈 혹은 장부전의 병력이 있는 사람 4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상급 시 가능한 한 이 참분서를 소지할 것. 1) 이 약을 복용함으로써 발진·충혈되어 붉어짐, 가려움, 심한 복통·배 아픔, 설사·구토 등이 나타날 경우 2) 이 약을 복용함으로써 복부(배부분)불쾌감, 경련이 일어날 경우 3) 1주 정도 투여하여도 변비의 개선이 없을 경우 5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것. 3) 반드시 필요한 경우 이외에는 만 10세 이하의 어린이는 복용을 피하는 것이 바람직하다. 4) 복용 시 정제를 씹지 말 것. 5) 장기간 계속 사용시 약물에 대한 내성이 증가하고 변비가 악화될 수 있으므로 1주일 이상 계속 사용해서는 안 된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 변비의 원인을 조사할 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 물 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것. ↓